

مدرستي معكم خطوة بخطوة للنجاح والتفوق



مدرسني
ال الكويتية
حمل التطبيق

مدرسني
ال الكويتية

اضغط هنا



نموذج الإجابة

دولة الكويت

وزارة التربية

التوجيه الفني العام للعلوم

امتحان الفترة الدراسية الثانية - العام الدراسي 2022-2023 م

المجال الدراسي : الكيمياء لصف الحادي عشر العلمي - الزمن : ساعتان

=====

تأكد أن عدد صفحات الامتحان (7) صفحات مختلفة (عدا صفحة الغلاف هذه)

يقع الامتحان في قسمين:

أولاً : الأسئلة الموضوعية (22 درجة) إجبارية

ويشمل السؤال الأول و الثاني

و المطلوب الإجابة عنهما بكمال جزئياتهما

ثانياً : الأسئلة المقالية (30 درجة)

وتشمل السؤال الثالث و الرابع و الخامس و السادس

و المطلوب الإجابة عن ثلاثة أسئلة فقط بكمال جزئياتها

الدرجة الكلية للامتحان 52 درجة



أولاً: الأسئلة الموضوعية (22) درجة

أجب عن السؤالين التاليين (الأول والثاني)

السؤال الأول: (أ) اختر الإجابة الصحيحة لكل من العبارات التالية وضع علامة (✓) في المربع المجاور لها: ($6 \times 1 = 6$)

1. طبقاً للتفاعل التالي: $\text{Fe} + \text{Pb}^{2+} \rightarrow \text{Pb} + \text{Fe}^{2+}$ تحدث عملية اختزال لأحد الأنواع التالية:

Pb

Fe^{2+}

Fe

Pb^{2+}

2. عدد التأكسد للنيتروجين في الأيون NO_2^- يساوي أحد ما يلي:

+3

+5

-3

-5

3. جميع ما يلي من وظائف الجسر الملحي للخلية الجلفانية ماعدا واحدا:

يعيد التوازن الكهربائي إلى نصف الخلية يغلق الدائرة الخارجية في الخلية الجلفانية

يسمح بعبور الأنيونات إلى نصف خلية الأنود يسمح بهجرة الكاتيونات إلى نصف خلية الكاثود

4. طبقاً للخلية الجلفانية ذات الرمز الاصطلاحي التالي:

$\text{Zn} / \text{Zn}^{2+}(1\text{M}) // \text{H}^+(1\text{M}) / \text{H}_2(1\text{atm}), \text{pt}$ فإن أحد ما يلي صحيح:

يحل الخارجيين محل الهيدروجين في مركباته الهيدروجين يختزل كاتيونات الخارجيين

يتآكسد غاز الهيدروجين Zn^{2+} عامل مؤكسد أقوى من H^+

5. إحدى الصيغ التركيبية المكثفة التالية تمثل مجموعة البيوتيل:

CH_3-CH_2-

CH_3-

$\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 -$

$\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 -$

6. جميع المركبات العضوية التالية تحتوي على نفس العدد من ذرات الهيدروجين ماعدا واحدا:

الإيثان

البروبان

-1 - بيوتاين

2 - بيوتاين




(ب) اكتب كلمة (صحيحة) بين القوسين المقابلين للعبارة الصحيحة وكلمة (خطأ) بين القوسين المقابلين للعبارة

(6 × 1 = 6)

الخطأ في كل مما يلى:

1. ينتج تيار كهربائي عند وضع شريحة من الخارصين في محلول كبريتات النحاس II. (خطأ) ص 31
2. عندما يكون نصف خلية الهيدروجين القياسية أندوا في خلية جلفانية فإن جهد اختزال القطب الآخر يكون موجبا. (صحيحة) ص 50
3. تتشابه شحنة الأنود في كل من الخلية الفولتية والاكترووليتية. (خطأ) ص 56
4. الصيغة العامة للألكانات هي C_nH_{2n+1} . (خطأ) ص 78
5. مركبات الميثان والإيثان والبروبان تعتبر متتالية متGANSE . (صحيحة) ص 80
6. تزداد درجة غليان الألكانات مستقيمة السلسلة بزيادة عدد ذرات الكربون . (صحيحة) ص 92



(2)

السؤال الثاني : (أ) اكتب بين القوسين الاسم أو المصطلح العلمي الذي تدل عليه كل من العبارات التالية :

(5 × 1 = 5) نموذج اجابة

1. وعاء يحتوى على شريحة مغمورة جزئياً في محلول إلكترولiti لأحد مركبات مادة الشريحة. ص33 (نصف الخلية)

2. النوع الذى يمثل أقوى عامل مؤكسد في السلسلة الالكتروكيميكائية. ص49 (عنصر الفلور)

3. أحد أنواع الخلايا الكتروكيميكائية وتستخدم لإحداث تغير كيميائى باستخدام طاقة كهربائية. ص56 (الخلية الالكترولiti)

4. علم الكيمياء الذى يهتم بدراسة المركبات التي تحتوى على عنصر الكربون. ص73 (الكيمياء العضوية)

5. مركبات عضوية تحتوى على الكربون والهيدروجين وعناصر أخرى مثل الهالوجينات، الأكسجين، النيتروجين. ص75 (المشتقات الهيدروكربونية)
-

(ب) أكمل الفراغات في الجمل والمعادلات التالية بما يناسبها علميا :


1. التفاعل التالي: $\text{ClO}^- \rightarrow \text{ClO}_3^-$ يمثل عملية أكسدة.

2. ناتج عملية الاختزال في التفاعل التالي: $2\text{H}_2\text{O}_2 \rightarrow 2\text{H}_2\text{O} + \text{O}_2$ هو H_2O .

3. عند تشغيل خلية جلفانية رمزها الاصطلاحي: $\text{Mg} / [\text{Mg}^{2+}] // [\text{Cd}^{2+}] / \text{Cd}$ تزداد كتلة قطب Cd . ص35

4. عندما يختزل الماء في عمليات التحليل الكهربائي يتتصاعد غاز الهيدروجين عند كاثود الخلية.

5. جزئ الألkin الذي يحتوى على (10) ذرات هيدروجين يكون عدد ذرات الكربون فيه يساوي 5. ص82



نموذج اجابة

ثانياً: الأسئلة المقالية (30) درجة

أجب عن ثلات أسئلة كاملة من الأسئلة الأربع التالية

$$(6 = 1\frac{1}{2} \times 4)$$

السؤال الثالث: (أ) علل لكل مما يلي :

ص47

1. يستخدم كل من الذهب والفضة والبلاتين في صناعة الحل.

لارتفاع جهود احتزالتها وانخفاض نشاطها الكيميائي أي أنها لا تميل للأكسدة فلا تتأثر بمكونات الهواء الجوي.

2. عند التحليل الكهربائي للماء المضاف له قطرات من حمض الكبريتيك المخفف يتآكسد الماء عند الأنود ولا تتآكسد أيونات الكبريتات.

لأن جهد احتزال الماء أقل من جهد احتزال أيونات الكبريتات.

ص79

3. درجة غليان الاوكتان أكبر من درجة غليان البنتان ذي السلسلة المستقيمة لكل منها.

لان الكتلة الجزيئية للأوكتان أكبر من البنتان

ص93


4. يمكن أن يتفاعل المركب 1 - بيوتين بالإضافة.

لأنه مركب غير مشبع يحتوي على رابطه تساهميه ثانويه بين ذرتى الكربون.

$$(4 = 4 \times 1)$$



(ب) أجب عن السؤال التالي : ص51

- أمامك رسم ل الخلية جلفانية رمزها الاصطلاحي:




المطلوب:

أ- أكتب التفاعلات التي حدثت في نصف الخلية:




ب- اكتب التفاعل الكلي لهذه الخلية:



ت- احسب جهد الخلية القياسي إذا علمت أن ($E^\circ_{\text{Sn}^{2+}/\text{Sn}} = -0.14 \text{ V}$, $E^\circ_{\text{Pb}^{2+}/\text{Pb}} = -0.13 \text{ V}$)

$$E^\circ_{\text{cell}} = (-0.13) - (-0.14) = +0.01 \text{ V}$$

جهد الخلية القياسي:



التجييه الفتي العام للعلوم

(4)



نموذج اجابة

$$(6 = 1 \times 6)$$

السؤال الرابع : (أ) قارن بين كل مما يلى :

خلية جلفانية رمزها الاصطلاحي $Mg / Mg^{2+} // Cu^{2+} / Cu$	عند تفريغ المركم الرصاصي	خلية جلفانية تفاعلها الكلى $Zn + Pb^{2+} \rightarrow Pb + Zn^{2+}$	وجه المقارنة
Mg^{2+} كاتيونات المغnesيوم ص 35	$PbSO_4 + 2e^-$ كبريتات الرصاص + $2e^-$ ص 38	Zn^{2+} كاتيونات الخارجيين ص 35	نواج الأكسدة عند الأنود
$\begin{array}{c} CH_3 \\ \\ CH_3 - CH - CH_2 - CH_3 \end{array}$	$CH_3 - C \equiv C - CH_2 - CH_3$	$CH_3 - CH = CH_2$	وجه المقارنة
2- ميثيل البيوتان ص 85	- بنتاين ص 90	بروبين ص 90	إسم المركب حسب نظام IUPAC

(4 درجات)

ص 25

(ب) أجب عن السؤال التالي :


معادلة الأكسدة والاختزال التالية غير موزونة:



والمطلوب: 1- تحديد كل من العامل المؤكسد والعامل المخترل.

2- وزن المعادلة السابقة بطريقة أنصاف التفاعلات (في الوسط الحمضي)

MnO_4^-	العامل المؤكسد هو:	$C_2O_4^{2-}$	العامل المخترل هو:	$2 \times \frac{1}{2}$
$MnO_4^- \rightarrow Mn^{2+}$		$C_2O_4^{2-} \rightarrow CO_2$		$2 \times \frac{1}{2}$
$5e^- + 8H^+ + MnO_4^- \rightarrow Mn^{2+} + 4H_2O$ 2 ×		$C_2O_4^{2-} \rightarrow 2CO_2 + 2e^-$ 5 ×		$5 \times \frac{1}{4}$
	$5 C_2O_4^{2-} \rightarrow 10 CO_2 + 10e^-$			$2 \times \frac{1}{4}$
	$10 e^- + 16 H^+ + 2 MnO_4^- \rightarrow 2 Mn^{2+} + 8 H_2O$			
	$16 H^+ + 5 C_2O_4^{2-} + 2 MnO_4^- \rightarrow 2Mn^{2+} + 8H_2O + 10CO_2$			$1 \times \frac{1}{4}$



السؤال الخامس : (أ) ماذا تتوقع أن يحدث في كل من الحالات التالية مع تفسير السبب؟ (4 × 1½ = 6)

نموذج اجابة

ص15

1. اللون الأزرق لمحلول مائي من كبريتات النحاس II عند غمر لوح خارصين فيه لفترة.
الحدث: يبيه اللون الأزرق للمحلول تدريجياً.

السبب: حدوث عملية اختزال لكاتيونات النحاس II Cu^{2+} الزرقاء إلى ذرات نحاس Cu بنية اللون فيقل تركيز
كاتيون النحاس II في المحلول المسئولة عن اللون الأزرق

$$\text{Cu}^{2+} + 2\text{e}^- \rightarrow \text{Cu}$$

2. عند كاثود خلية التحليل الكهربائي لمصهور كلوريد الصوديوم.
الحدث: يطفو / يتكون فاز الصوديوم.

السبب: بسبب اختزال كاتيونات الصوديوم

$$\text{Na}^+ + \text{e}^- \rightarrow \text{Na}$$


3. عند إضافة الماء إلى الإيثان من حيث الذوبان.
الحدث: لا يذوب في الماء.

السبب: لأن الإيثان مركب غير قطبي لا يذوب في الماء القطبي.

4. عند تفاعل مول واحد من الهيدروجين مع غاز الإيثاين في وجود النيكل كمادة محفزة عند درجة حرارة 200°C.

الحدث: تنكسر الرابطة التساهمية الثلاثية وتحول إلى رابطة تساهمية ثنائية/ وينتج غاز الإيثين. ص94

السبب: لحدوث تفاعل بالإضافة.



(4 = 4 × 1)

(ب) أجب عن السؤال التالي:

مستعيناً بالجدول المقابل الذي يمثل جزء من سلسلة جهود الاختزال القياسية، أجب عن الأسئلة التالية: ص47-49


نصف التفاعل	جهد الاختزال القياسي بالغولت
$\text{Mg}^{2+} + 2\text{e}^- \rightarrow \text{Mg}$	- 2.37
$\text{Zn}^{2+} + 2\text{e}^- \rightarrow \text{Zn}$	- 0.76
$2\text{H}^+ + 2\text{e}^- \rightarrow \text{H}_2$	0.000
$\text{Cu}^{2+} + 2\text{e}^- \rightarrow \text{Cu}$	+ 0.34
$\text{Ag}^+ + 1\text{e}^- \rightarrow \text{Ag}$	+ 0.80

1- أقوى العوامل المؤكسدة من هذه الأنواع هو Ag^+

2- أقوى العوامل المختزلة من هذه الأنواع هو Mg .

3- النوع الذي يختزل Cu^{2+} ولا يختزل Zn^{2+} هو H_2

4- التفاعل التالي: $2\text{Ag} + \text{Cu}^{2+} \rightarrow 2\text{Ag}^+ + \text{Cu}$
لا يحدث بشكل تلقائي.



(6)



السؤال السادس (أ) أكمل المخطط التالي مستعيناً بالمفاهيم الموجودة في المربع لتحقيق خريطة المفاهيم الموجودة:

$$(4 = 1 \times 4)$$

تمتلك قيم جهود اختزال سالبة - تمتلك قيم جهود اختزال موجبة - تمثل إلى فقد الإلكترونات
ص 47-49 تمثل إلى اكتساب الإلكترونات.



(ب) اختار من القائمة (ب) ما يناسب القائمة (أ) بوضع الرقم المناسب بين القوسين : (4 = 1 × 4)

القائمة (ب)	الرقم	القائمة (أ)	الرقم المناسب
$\text{Cu}_{(s)} / \text{Cu}^{2+}_{(aq)} // \text{Ag}^+_{(aq)} / \text{Ag}_{(s)}$	1	رمز اصطلاحي لخلية جلفانية يكون فيها قطب النحاس أنودا	(1)
$\text{Al}_{(s)} / \text{Al}^{3+}_{(aq)} / \text{Cu}^{2+}_{(aq)} / \text{Cu}_{(s)}$	2	رمز اصطلاحي لخلية جلفانية يكون فيها قطب الألومنيوم كاثودا	(3)
$\text{K}_{(s)} / \text{K}^+_{(aq)} // \text{Al}^{3+}_{(aq)} / \text{Al}_{(s)}$	3	ص 36	
C_2H_6	4	ص 78 مركب عضوي مشبع ويتفاعل بالاستبدال.	(4)
C_4H_6	5	ص 91 مركب عضوي غير مشبع وينتمي للألكاينات.	(5)
C_6H_6	6		

$$(2 = 1 \times 2)$$

(ج) وضح بالمعادلات الكيميائية الرمزية فقط ماذا يحدث في الحالات التالية :

ص 93

1. تفاعل مول من غاز الكلور مع الميثان.

$$\frac{1}{4} \times 4$$




2. إضافة مول واحد من كلوريد الهيدروجين إلى غاز الإيثانين.

$$\frac{1}{4} \times 2$$



$$\frac{1}{2}$$



انتهت الأسئلة

(7)

