


# مدرستي معكم خطوة بخطوة للنجاح والتفوق



مدرستي  
الكويتية  
حمل التطبيق



مدرستي  
الكويتية



اضغط هنا

التكامل غير المحدد  
Indefinite Integral

المجموعة A تمارين مقالية

(1) أثبت أن:  $F(x) = (3x + 2)^5 + 7$  هي مشتقة عكسية للدالة  $f(x) = 15(3x + 2)^4$ .

$$F'(x) = 5(3x + 2)^4(3) = 15(3x + 2)^4 = f(x)$$

(4)  $\int (x^5 - 6x + 3) dx$

$$\int (x^5 - 6x + 3) dx = \frac{x^6}{6} - 3x^2 + 3x + C$$

(6)  $\int \frac{1}{3} x^{-\frac{2}{3}} dx$

$$\int \frac{1}{3} x^{-\frac{2}{3}} dx = x^{\frac{1}{3}} + C$$

(8)  $\int \frac{x^4 - 27x}{x^2 - 3x} dx$

$$\int \frac{x^4 - 27x}{x^2 - 3x} dx = \int \frac{x^3 - 27}{x - 3} dx = \int (x^2 + 3x + 9) dx = \frac{x^3}{3} + \frac{3}{2}x^2 + 9x + C$$

(10)  $\int \frac{x-1}{\sqrt{x+1}} dx$

$$\int \frac{x-1}{\sqrt{x+1}} dx = \int \frac{(\sqrt{x}-1)(\sqrt{x}+1)}{\sqrt{x+1}} dx = \int (\sqrt{x}-1) dx = \frac{2}{3}x\sqrt{x} - x + C$$

(5)  $\int (3 - 6x^2) dx$

$$\int (3 - 6x^2) dx = 3x - 2x^3 + C$$

(7)  $\int \left( x^3 - \frac{1}{x^3} \right) dx$

$$\int \left( x^3 - \frac{1}{x^3} \right) dx = \int (x^3 - x^{-3}) dx = \frac{x^4}{4} + \frac{x^{-2}}{2} + C = \frac{x^4}{4} + \frac{1}{2x^2} + C$$

(9)  $\int (x-2)(2x+3) dx$

$$\int (x-2)(2x+3) dx = \int (2x^2 - x - 6) dx = \frac{2}{3}x^3 - \frac{x^2}{2} - 6x + C$$

(11)  $\int \frac{x - \sqrt{x}}{x} dx$

$$\int \frac{x - \sqrt{x}}{x} dx = \int \left( 1 - \frac{1}{\sqrt{x}} \right) dx = x - 2\sqrt{x} + C$$

$$(12) \int \frac{5+2x}{\sqrt{x}} dx$$

$$\int \frac{5+2x}{\sqrt{x}} dx = \int \frac{5}{\sqrt{x}} dx + \int 2\sqrt{x} dx = 10\sqrt{x} + \frac{4}{3}x\sqrt{x} + C$$

$$(13) \int \left(x + \frac{1}{x}\right)^2 dx$$

$$\int \left(x + \frac{1}{x}\right)^2 dx = \int \left(x^2 + 2 + \frac{1}{x^2}\right) dx = \frac{x^3}{3} - \frac{1}{x} + 2x + C$$

$$(14) \int (\sqrt[3]{x^2} + \sqrt[4]{x^3}) dx$$

$$\int (\sqrt[3]{x^2} + \sqrt[4]{x^3}) dx = \frac{3}{5}x^{\frac{5}{3}} + \frac{4}{7}x^{\frac{7}{4}} + C = \frac{3}{5}x\sqrt[3]{x^2} + \frac{4}{7}x\sqrt[4]{x^3} + C$$

(15) إذا كان  $F(x) = \int (3x^2 - 5) dx$  و كان  $F(2) = 3$ ، فأوجد  $F(x)$ .

$$F(x) = x^3 - 5x + C$$

$$F(2) = 3 \quad \therefore \quad C = 5 \quad \therefore \quad F(x) = x^3 - 5x + 5$$

مدرستي  
الكويتية

(16) إذا كان  $F(x) = \int (9x^2 - 4x + 5) dx$  و كان  $F(-1) = 0$ ، فأوجد  $F(x)$ .

$$F(x) = 3x^3 - 2x^2 + 5x + C$$

$$F(-1) = 0 \quad \therefore \quad C = 10 \quad \therefore \quad F(x) = 3x^3 - 2x^2 + 5x + 10$$

(17) هامش الدخل. افرض أنّ هامش الدخل عندما يباع  $x$  ألف وحدة هو:

$$\frac{dr}{dx} = 3x^2 - 6x + 12 \text{ (دينارًا لكل وحدة)}$$

أوجد دالة الدخل  $r(x)$  إذا كان  $r(0) = 0$

$$r(x) = x^3 - 3x^2 + 12x + C$$

$$r(0) = 0 \quad \therefore \quad r(x) = x^3 - 3x^2 + 12x$$

(18) ألقيت كرة إلى الأعلى بسرعة ابتدائية  $16 \text{ m/s}$  من سطح برج ارتفاعه  $115 \text{ m}$  عن سطح الأرض.

(a) في أي زمن  $t$  سوف تصل الكرة إلى أعلى ارتفاع؟

(b) في أي زمن  $t$  سوف تصل الكرة إلى الأرض؟ (علمًا أن عجلة جاذبية الأرض  $a(t) = 9.8 \text{ m/s}^2$ ).

(18) ليكن  $s$  ارتفاع الكرة فوق سطح الأرض عند الزمن  $t$ . نفرض أن  $s$  دالة في  $t$  قابلة للاشتقاق مرتين، ونرمز إلى سرعة

$$a = \frac{dv}{dt} = \frac{d^2s}{dt^2}, \quad v = \frac{ds}{dt} : a \text{ بالرمز } a \text{ وإلى عجلتها بالرمز } v$$

(a)  $a = -9.8$

$$a = \frac{dv}{dt} \implies -9.8 = \frac{dv}{dt}$$

$$v(t) = - \int 9.8 dt = -9.8t + C_1$$

$$16 = -9.8(0) + C_1$$

$$v(t) = -9.8t + 16$$

عندما تصل الكرة إلى أعلى ارتفاع، تكون  $v(t) = 0$ ، أي أن:

$$-9.8t + 16 = 0 \quad \therefore t = 1.63s$$

(b)  $s(t) = \int v(t) dt = \int (-9.8t + 16) dt = -4.9t^2 + 16t + C_2$

$$s(0) = 115 \quad \therefore C_2 = 115$$

$$s(t) = -4.9t^2 + 16t + 115$$

عندما تصل الكرة إلى الأرض يكون ارتفاعها  $s(t) = 0$ ، أي أن:

$$-4.9t^2 + 16t + 115 = 0 \quad \therefore t = 6.74s$$

## المجموعة B تمارين موضوعية

في التمارين (1-5)، ظلل الدائرة (a) إذا كانت العبارة صحيحة و (b) إذا كانت العبارة خاطئة.

(1)  $f(x) = x^{-3}$  هي مشتقة عكسية للدالة:  $f(x) = -3x^{-4}$

(2)  $\int (-x^{-3} + x - 1) dx = \frac{1}{2}x^{-2} + \frac{1}{2}x^2 - x + C$

(3)  $\int \frac{1}{x^2} dx = \frac{1}{x} + C$

(4) إذا كانت:  $f'(x) = \frac{1}{x^2} + x$ ، فإن:  $f(2) = 1$ ،  $f(x) = -\frac{1}{x} + \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{2}$

(5) إذا كانت:  $F(0) = 400$ ، فإن:  $F(x) = \int (3x^2 - 12x + 15) dx$ ،  $F(x) = x^3 + 6x^2 + 15x + 400$

(a) (b)

(a) (b)

(a) (b)

(a) (b)

(a) (b)

(6)  $\int \frac{4}{3} \sqrt[3]{t^2} dt =$

(a)  $\frac{3t^{\frac{5}{3}}}{5} + C$

(b)  $\frac{4t^{\frac{5}{3}}}{5} + C$

(c)  $\frac{4}{3} \sqrt[3]{t^5} + C$

(d)  $4 \sqrt[3]{t^5} + C$

(7)  $\int \left( \sqrt[3]{x^2} + \frac{1}{\sqrt[3]{x^2}} \right) dx =$

(a)  $\frac{3}{5} \sqrt[3]{x} (x^{\frac{4}{3}} + 5) + C$

(b)  $\frac{3}{5} x^{\frac{2}{3}} (x^{-\frac{2}{3}} + 5) + C$

(c)  $\frac{5}{3} \sqrt[3]{x} (x^{\frac{4}{3}} + 5) + C$

(d)  $\frac{5}{3} x^{\frac{4}{3}} (x^{\frac{2}{3}} + 5) + C$

(8) إذا كان:  $x = -1$ ،  $y = -5$ ،  $\frac{dy}{dx} = x^{-\frac{2}{3}}$  فإن  $y$  تساوي:

(a)  $-\frac{x^2}{3} - \frac{14}{3}$

(b)  $3x^{\frac{1}{3}} + 2$

(c)  $3x^{\frac{1}{3}} - 2$

(d)  $3x^{\frac{1}{3}}$

(9)  $\int \frac{2x+3}{\sqrt{x}} dx =$

(a)  $\frac{3}{4}x^{\frac{3}{2}} + \frac{3}{2}x^{\frac{1}{2}} + C$

(b)  $\frac{1}{3}x^{\frac{3}{2}} + 6x^{\frac{1}{2}} + C$

(c)  $\frac{4}{3}x^{\frac{3}{2}} + 6x^{\frac{1}{2}} + C$

(d)  $\frac{4}{3}x^{\frac{3}{2}} + \frac{1}{6}x^{\frac{1}{2}} + C$

(10)  $\int \sqrt{x}(2+x^2)dx =$

(a)  $\frac{4}{3}x^{\frac{3}{2}} + \frac{2}{7}x^{\frac{7}{2}} + C$

(b)  $\frac{3}{4}x^{\frac{3}{2}} + \frac{7}{2}x^{\frac{7}{2}} + C$

(c)  $\frac{1}{3}x^{\frac{3}{2}} + \frac{7}{2}x^{\frac{7}{2}} + C$

(d)  $\frac{4}{3}x^{\frac{3}{2}} + \frac{7}{2}x^{\frac{7}{2}} + C$

(11)  $\int \frac{2+\sqrt[3]{x^2}}{\sqrt{x}} dx =$

(a)  $x^{\frac{1}{2}} + \frac{6}{7}x^{\frac{7}{6}} + C$

(b)  $4x^{\frac{1}{2}} + \frac{6}{7}x^{\frac{7}{6}} + C$

(c)  $x^{\frac{1}{2}} + \frac{7}{6}x^{\frac{7}{6}} + C$

(d)  $4x^{\frac{1}{2}} + \frac{7}{6}x^{\frac{7}{6}} + C$

(12)  $\int \left( \frac{x^2 - 4x + 4}{x - 2} + 2 \right)^2 dx =$

(a)  $x^2 + C$

(b)  $2x + C$

(c)  $\frac{x^2}{2} + 2x + C$

(d)  $\frac{1}{3}x^3 + C$



## التكامل بالتعويض

### Integration by Substitution

#### المجموعة A تمارين مقالية

في التمارين (1-12)، استخدم التعويض المناسب لإيجاد التكامل.

$$(1) \int (2x-3)\sqrt{x^2-3x+5} dx$$

$$(2) \int (4x-5)^8 dx$$

$$(1) u = x^2 - 3x + 5, \quad du = (2x-3)dx$$

$$\int (2x-3)\sqrt{x^2-3x+5} dx = \int u^{\frac{1}{2}} du = \frac{2}{3}u^{\frac{3}{2}} + C = \frac{2}{3}(x^2-3x+5)^{\frac{3}{2}} + C$$

$$(2) u = 4x-5, \quad du = 4dx$$

$$\int (4x-5)^8 dx = \int \frac{1}{4}u^8 du = \frac{u^9}{36} + C = \frac{(4x-5)^9}{36} + C$$

school-kw.com

$$(3) \int (x+2)^3\sqrt{x^2+4x-1} dx$$

$$(3) u = x^2 + 4x - 1, \quad du = (2x+4)dx = 2(x+2)dx$$

$$\int (x+2)^3\sqrt{x^2+4x-1} dx = \int \frac{1}{2}u^{\frac{1}{2}} du = \frac{3}{8}u^{\frac{3}{2}} + C = \frac{3}{8}(x^2+4x-1)^{\frac{3}{2}} + C$$

$$(4) \int (x^2-1)\sqrt{x^3-3x+5} dx$$

$$(4) u = x^3 - 3x + 5, \quad du = (3x^2-3)dx = 3(x^2-1)dx$$

$$\int (x^2-1)\sqrt{x^3-3x+5} dx = \int \frac{1}{3}u^{\frac{1}{2}} du = \frac{2}{9}u^{\frac{3}{2}} + C = \frac{2}{9}(x^3-3x+5)^{\frac{3}{2}} + C$$

$$(5) \int (x^2 - 2x)(x^3 - 3x^2 + 4)^5 dx$$

$$(5) u = x^3 - 3x^2 + 4, \quad du = (3x^2 - 6x)dx = 3(x^2 - 2x)dx$$

$$\int (x^2 - 2x)(x^3 - 3x^2 + 4)^5 dx = \int \frac{1}{3}u^5 du = \frac{u^6}{18} + C = \frac{(x^3 - 3x^2 + 4)^6}{18} + C$$

$$(6) \int \frac{x^2}{\sqrt[3]{4+x^3}} dx$$

$$(6) u = 4 + x^3, \quad du = 3x^2 dx$$

$$\int \frac{x^2}{\sqrt[3]{4+x^3}} dx = \int x^2(4+x^3)^{-\frac{1}{3}} dx = \int \frac{1}{3}u^{-\frac{1}{3}} du = \frac{u^{\frac{2}{3}}}{\frac{2}{3}} + C = \frac{(4+x^3)^{\frac{2}{3}}}{2} + C$$

$$(7) \int \frac{dx}{\sqrt[3]{2-3x}}$$

$$(7) u = 2 - 3x, \quad du = -3dx$$

$$\int \frac{dx}{\sqrt[3]{2-3x}} = \int (2-3x)^{-\frac{1}{3}} dx = \int -\frac{1}{3}u^{-\frac{1}{3}} du = -\frac{u^{\frac{2}{3}}}{\frac{2}{3}} + C = -\frac{(2-3x)^{\frac{2}{3}}}{2} + C$$

$$(8) \int x(3x+2)^6 dx$$

$$(8) u = 3x+2, \quad du = 3dx, \quad x = \frac{u-2}{3}$$

$$\begin{aligned} \int x(3x+2)^6 dx &= \int \left(\frac{u}{3} - \frac{2}{3}\right)u^6 \times \frac{1}{3} du = \frac{1}{9} \left[ \frac{u^8}{8} - \frac{2u^7}{7} \right] + C \\ &= \frac{u^8}{72} - \frac{2u^7}{63} + C = \frac{(3x+2)^8}{72} - \frac{2(3x+2)^7}{63} + C \end{aligned}$$

$$(9) \int \frac{x}{\sqrt{1+3x}} dx$$

$$(9) u = 1 + 3x, \quad du = 3dx, \quad x = \frac{u}{3} - \frac{1}{3}$$

$$\begin{aligned} \int \frac{x}{\sqrt{1+3x}} dx &= \int x(1+3x)^{-\frac{1}{2}} dx = \int \left(\frac{u}{3} - \frac{1}{3}\right)u^{-\frac{1}{2}} \times \frac{1}{3} du = \frac{1}{9} \int (u^{\frac{1}{2}} - u^{-\frac{1}{2}}) du \\ &= \frac{2}{27}u^{\frac{3}{2}} - \frac{2}{9}u^{\frac{1}{2}} + C = \frac{2}{27}(1+3x)^{\frac{3}{2}} - \frac{2}{9}(1+3x)^{\frac{1}{2}} + C \end{aligned}$$

$$(10) \int x^2 \sqrt{x-1} dx$$

$$(10) u = x-1, \quad du = dx, \quad x^2 = (u+1)^2$$

$$\begin{aligned} \int x^2 \sqrt{x-1} dx &= \int (u+1)^2 \times u^{\frac{1}{2}} \times du = \int (u^{\frac{5}{2}} + 2u^{\frac{3}{2}} + u^{\frac{1}{2}}) du \\ &= \frac{2}{7} u^{\frac{7}{2}} + \frac{4}{5} u^{\frac{5}{2}} + \frac{2}{3} u^{\frac{3}{2}} + C = \frac{2}{7} (x-1)^{\frac{7}{2}} + \frac{4}{5} (x-1)^{\frac{5}{2}} + \frac{2}{3} (x-1)^{\frac{3}{2}} + C \end{aligned}$$

$$(11) \int x^3 \sqrt{x^2-2} dx$$

$$(11) u = x^2 - 2, \quad du = 2x dx, \quad x^2 = u + 2$$

$$\begin{aligned} \int x^2 \cdot x \sqrt{x^2-2} dx &= \frac{1}{2} \int (u+2) u^{\frac{1}{2}} du = \frac{1}{2} \int u^{\frac{3}{2}} du + \int u^{\frac{1}{2}} du \\ &= \frac{1}{5} (x^2-2)^{\frac{5}{2}} + \frac{2}{3} (x^2-2)^{\frac{3}{2}} + C \end{aligned}$$

$$(12) \int x^5 \sqrt[3]{x^3+1} dx$$

مدرستي  
الكويتية



$$u = x^3 + 1, \quad du = 3x^2 dx, \quad x^3 = u - 1$$

$$\begin{aligned} \int x^3 \cdot x^2 (x^3+1)^{\frac{1}{3}} dx &= \frac{1}{3} \int (u-1) \times u^{\frac{1}{3}} du = \frac{1}{3} \int u^{\frac{4}{3}} du - \frac{1}{3} \int u^{\frac{1}{3}} du \\ &= \frac{1}{7} (x^3+1)^{\frac{7}{3}} - \frac{1}{4} (x^3+1)^{\frac{4}{3}} + C \end{aligned}$$

## المجموعة B تمارين موضوعية

في التمارين (1-5)، ظلل الدائرة (a) إذا كانت العبارة صحيحة و (b) إذا كانت العبارة خاطئة.

(1)  $\int x(x^2 - 1)^{10} dx = \frac{1}{18}(x^2 - 1)^9 + C$  (a) (b)

(2)  $\int (x+1)\sqrt[3]{x^2+2x+3} dx = \frac{3}{8}\sqrt[3]{(x^2+2x+3)^4} + C$  (a) (b)

(3)  $\int \frac{dx}{\sqrt{3x-2}} = 2\sqrt{3x-2} + C$  (a) (b)

(4)  $\int (2x^2 - 1)(2x^3 - 3x + 4)^5 dx = \frac{1}{18}(2x^3 - 3x + 4)^6 + C$  (a) (b)

(5)  $\int x\sqrt[3]{x+2} dx = \frac{3}{7}(x+2)^{\frac{7}{3}} - \frac{3}{2}(x+2)^{\frac{4}{3}} + C$  (a) (b)

(6)  $\int x(x^2+2)^7 dx =$

(a)  $\frac{1}{16}(x^2+2)^8 + C$

(b)  $\frac{1}{4}(x^2+2)^8 + C$

(c)  $\frac{1}{12}(x^2+2)^6 + C$

(d)  $\frac{1}{3}(x^2+2)^6 + C$

(7)  $\int \frac{x-1}{\sqrt{x-1}} dx =$

(a)  $\frac{1}{3}(x-1)^{\frac{2}{3}} + C$

(b)  $\frac{2}{3}(x-1)^{\frac{3}{2}} + C$

(c)  $\frac{2}{3}(x-1)^{\frac{2}{3}} + C$

(d)  $\frac{3}{2}(x-1)^{\frac{2}{3}} + C$

(8)  $\int \frac{dx}{\sqrt[3]{3x+1}} =$

(a)  $\frac{2}{9}(3x+1)^{\frac{2}{3}} + C$

(b)  $\frac{2}{3}(3x+1)^{\frac{2}{3}} + C$

(c)  $2(3x+1)^{\frac{2}{3}} + C$

(d)  $\frac{1}{2}(3x+1)^{\frac{2}{3}} + C$

(9)  $\int \frac{(2+\sqrt{x})^{12}}{\sqrt{x}} dx =$

(a)  $\frac{13}{2}(2+\sqrt{x})^{13} + C$

(b)  $\frac{2}{13}(2+\sqrt{x})^{13} + C$

(c)  $\frac{1}{26}(2+\sqrt{x})^{13} + C$

(d)  $\frac{1}{22}(2+\sqrt{x})^{11} + C$

$$(10) \int \frac{(x+1)}{\sqrt[3]{x^2+2x+3}} dx =$$

a  $\frac{3}{4} \sqrt[3]{(x^2+2x+3)^2} + C$

b  $\frac{3}{2} \sqrt[3]{(x^2+2x+3)^2} + C$

c  $3 \sqrt[3]{(x^2+2x+3)^2} + C$

d  $\frac{3}{4} \sqrt[3]{x^2+2x+3} + C$

$$(11) \int \frac{x}{\sqrt{x+1}} dx =$$

a  $\frac{3}{2} \sqrt{(x+1)^3} - 2\sqrt{x+1} + C$

b  $\frac{2}{3} \sqrt{(x+1)^3} - \frac{1}{2} \sqrt{x+1} + C$

c  $\frac{2}{3} \sqrt{(x+1)^3} - 2\sqrt{x+1} + C$

d  $\frac{2}{3} \sqrt{(x+1)^3} + 2\sqrt{x+1} + C$


(12) إذا كانت:  $F(x) = \int (x+1)(2x^2+4x-1) dx$  ،  $F(-2) = \frac{9}{8}$  ، فإن:  $F(x)$  تساوي:

a  $\frac{1}{8}(2x^2+4x-1)^2 + \frac{5}{4}$

b  $\frac{1}{8}(2x^2+4x-1)^2 + 1$

c  $\frac{1}{4}(2x^2+4x-1)^2 + 1$

d  $4(2x^2+4x-1)^2 - 1$



## Integral of Trigonometric Functions

### المجموعة A تمارين مقالية

في التمارين (1-14)، أوجد قيمة التكامل.

$$(1) \int (\sec x \tan x + \sin x) dx$$

$$\int (\sec x \tan x + \sin x) dx = \sec x - \cos x + C$$

$$(3) \int \left( \frac{-1}{x^2} + 5 \sin 3x \right) dx$$

$$\int \left( -\frac{1}{x^2} + 5 \sin 3x \right) dx = \frac{1}{x} - \frac{5}{3} \cos 3x + C$$

$$(5) \int \cos^5 x \sin x dx$$

$$\int \cos^5 x \sin x dx = -\frac{\cos^6 x}{6} + C$$

$$(2) \int (\csc x \cot x + \sec^2 x) dx$$

$$\int (\csc x \cot x + \sec^2 x) dx = -\int -\csc x \cot x dx + \int \sec^2 x dx = -\csc x + \tan x + C$$

$$(4) \int \sin^4 x \cos x dx$$

$$\int \sin^4 x \cos x dx = \frac{\sin^5 x}{5} + C$$

$$(6) \int x^2 \sin(x^3 + 1) dx$$

$$\int x^2 \sin(x^3 + 1) dx = \frac{1}{3} \int 3x^2 \sin(x^3 + 1) dx = -\frac{1}{3} \cos(x^3 + 1) + C$$

$$(7) \int \frac{\sin x}{\cos^3 x} dx$$

$$\int \frac{\sin x}{\cos^3 x} dx = \int \sin x (\cos x)^{-3} dx = -\frac{(\cos x)^{-2}}{-2} + C = \frac{1}{2} \sec^2 x + C$$

$$(8) \int \sec^3 x \tan x dx$$

$$\int \sec^3 x \tan x dx = \int \sin x \times (\cos x)^{-4} dx = -\frac{(\cos x)^{-3}}{-3} + C = \frac{1}{3} \sec^3 x + C$$

$$(9) \int \csc^3 x \cot x \, dx$$

$$\int \csc^3 x \cot x \, dx = \int \cos x \times (\sin x)^{-4} \, dx = \frac{(\sin x)^{-3}}{-3} + C = -\frac{1}{3} \csc^3 x + C$$

$$(10) \int \sqrt{\cot x} \csc^2 x \, dx$$

$$\int \sqrt{\cot x} \csc^2 x \, dx = - \int \sqrt{\cot x} (-\csc^2 x) \, dx = -\frac{2}{3} \cot^{\frac{3}{2}} x + C$$

$$(11) \int \sqrt{\tan x} \sec^2 x \, dx$$

$$\int \sqrt{\tan x} \sec^2 x \, dx = \frac{2}{3} \tan^{\frac{3}{2}} x + C$$

$$(12) \int \sqrt{1 + \sin x} \cos x \, dx$$

$$\int \sqrt{1 + \sin x} \cos x \, dx = \frac{2}{3} (1 + \sin x)^{\frac{3}{2}} + C$$

school-kw.com



$$(13) \int \frac{dx}{(\sin^2 x) \sqrt{1 + \cot x}}$$

$$\int \frac{1}{(\sin^2 x) \sqrt{1 + \cot x}} \, dx = - \int \frac{-1}{\sin^2 x} (1 + \cot x)^{-\frac{1}{2}} \, dx = -2\sqrt{1 + \cot x} + C$$

$$(14) \int \frac{dx}{(\cos^2 x) \sqrt{1 + \tan x}}$$

$$\int \frac{1}{(\cos^2 x) \sqrt{1 + \tan x}} \, dx = \int \frac{1}{\cos^2 x} (1 + \tan x)^{-\frac{1}{2}} \, dx = 2\sqrt{1 + \tan x} + C$$

## المجموعة B تمارين موضوعية

في التمارين (1-5)، ظلل الدائرة (a) إذا كانت العبارة صحيحة و (b) إذا كانت العبارة خاطئة.

- (1)  $\int \sec^2 x dx = \tan x + C$  (a) (b)
- (2)  $\int \csc^2 x dx = \cot x + C$  (a) (b)
- (3)  $(F'(x) = \sec^2 x, F(\frac{\pi}{4}) = -1) \implies F(x) = \tan x + 2$  (a) (b)
- (4)  $(F'(x) = \cos x + \sin x, F(\pi) = 1) \implies F(x) = \sin x - \cos x$  (a) (b)
- (5)  $(F'(x) = \sec x \tan x, F(0) = 4) \implies F(x) = \sec x + 3$  (a) (b)

في التمارين (6-12)، ظلل رمز الدائرة الذال على الإجابة الصحيحة.

(6) الصورة العامة للمشتقة العكسية للدالة  $f$  حيث  $f(x) = 8 + \csc x \cot x$  هي:

- (a)  $F(x) = 8x + \csc x + C$  (b)  $F(x) = 8x - \cot x + C$
- (c)  $F(x) = 8x - \csc x + C$  (d)  $F(x) = 8x + \cot x + C$
- (7)  $\int \csc(5x) \cot(5x) dx =$  (b)  $\csc(5x) + C$
- (a)  $\frac{1}{5} \csc(5x) + C$  (d)  $-\frac{1}{5} \csc(5x) + C$
- (c)  $\frac{1}{5} \cot(5x) + C$
- (8)  $\int \sqrt[3]{\cot x} \csc^2 x dx =$  (b)  $-\frac{3}{4} \sqrt[3]{(\cot x)^4} + C$
- (a)  $\frac{3}{4} \sqrt[3]{(\cot x)^4} + C$  (d)  $3 \sqrt[3]{(\cot x)^4} + C$
- (c)  $-\frac{3}{4} \sqrt[4]{(\cot x)^3} + C$

(9) إذا كانت  $y_{\theta=0} = -3$  ،  $\frac{dy}{d\theta} = \sin \theta$  فإن  $y$  تساوي:

- (a)  $-\cos \theta$  (b)  $2 - \cos \theta$
- (c)  $-2 - \cos \theta$  (d)  $4 - \cos \theta$
- (10)  $\int \sec^5 x \tan x dx =$  (b)  $\frac{1}{5} \sec^6 x + C$
- (a)  $\frac{5}{3} \sec^5 x + C$  (d)  $-\frac{5}{3} \sec^5 x + C$
- (c)  $\frac{1}{5} \sec^5 x + C$

$$(11) \int \frac{\csc^2 x}{\sqrt[3]{2 + \cot x}} dx =$$

$$(a) \frac{3}{2}(2 + \cot x)^{\frac{2}{3}} + C$$

$$(c) -2\sqrt{2 + \cot x} + C$$

$$(b) -\frac{3}{2}(2 + \cot x)^{\frac{2}{3}} + C$$

$$(d) \frac{4}{3}(2 + \cot x)^{\frac{4}{3}} + C$$

$$(12) \int \frac{\sin(4x)}{\cos^5(4x)} dx =$$

$$(a) -\frac{1}{16} \cos^{-4}(4x) + C$$

$$(c) -\cos^{-4}(4x) + C$$

$$(b) \frac{1}{16} \cos^{-4}(4x) + C$$

$$(d) \cos^{-4}(4x) + C$$



## Exponential and Logarithmic Functions

### المجموعة A تمارين مقالية

في التمارين (1-15)، أوجد  $\frac{dy}{dx}$ .

(1)  $y = 7^x$

$$\frac{dy}{dx} = (\ln 7) \times 7^x$$

(4)  $y = 2e^x$

$$\frac{dy}{dx} = 2e^x$$

(7)  $y = e^{x^2-x+1}$

$$\frac{dy}{dx} = (2x-1)e^{x^2-x+1}$$

(10)  $y = e^{x^4-5}$

$$\frac{dy}{dx} = 4x^3 e^{x^4-5}$$

(13)  $y = \ln(x+2)$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{x+2}$$

(2)  $y = 5^{\sqrt{x+1}}$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\ln 5}{2\sqrt{x+1}} \times 5^{\sqrt{x+1}}$$

(5)  $y = e^{-x}$

$$\frac{dy}{dx} = -e^{-x}$$

(8)  $y = e^{2\sqrt{x}+3}$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{\sqrt{x}} e^{2\sqrt{x}+3}$$

(11)  $y = \ln(x^3)$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{3}{x}$$

(14)  $y = \ln(2 - \cos x)$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\sin x}{2 - \cos x}$$

(3)  $y = 8^{\tan x}$

$$\frac{dy}{dx} = (\ln 8)(\sec^2 x) \times 8^{\tan x}$$

(6)  $y = 3e^{\frac{x}{5}}$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{3}{5} e^{\frac{x}{5}}$$

(9)  $y = e^{\csc x}$

$$\frac{dy}{dx} = -\csc x \cot x \cdot e^{\csc x}$$

(12)  $y = \ln\left(\frac{1}{x^2}\right)$

$$(12) \frac{dy}{dx} = -\frac{2}{x}$$

(15)  $y = \ln(\ln x)$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{x \ln x}$$

في التمارين (16-27)، أوجد التكامل غير المحدد في كل مما يلي:

$$(16) \int e^{0.1x} dx$$

$$\frac{e^{0.1x}}{0.1} + C = 10e^{0.1x} + C$$

$$(18) \int (2x+1)e^{x^2+x+4} dx$$

$$e^{x^2+x+4} + C$$

$$(20) \int \left( e^{0.5x} + \frac{0.5}{x} \right) dx$$

$$\frac{1}{0.5} e^{0.5x} + 0.5 \ln|x| + C$$

$$(22) \int \frac{x+1}{x^2+2x+5} dx$$

$$\frac{1}{2} \ln|x^2+2x+5| + C$$

$$(24) \int \frac{x^2+1}{x} dx$$

$$\frac{x^2}{2} + \ln|x| + C$$

$$(26) \int (2\tan x - \csc^2 x) dx$$

$$-2 \ln|\cos x| + \cot x + C$$

$$(17) \int \frac{1}{x^2} e^{\frac{1}{x}} dx$$

$$-e^{\frac{1}{x}} + C$$

$$(19) \int (x^2-2)e^{x^3-6x} dx$$

$$\frac{1}{3} e^{x^3-6x} + C$$

$$(21) \int \frac{e^x}{e^x+1} dx$$

$$\ln(e^x+1) + C$$

$$(23) \int \frac{x^3-x}{x^4-2x^2} dx$$

$$\frac{1}{4} \ln|x^4-2x^2| + C$$

$$(25) \int \frac{2}{3x+1} dx$$

$$\frac{2}{3} \ln|3x+1| + C$$

$$(27) \int (\cot x + x^2) dx$$

$$\ln|\sin x| + \frac{x^3}{3} + C$$

## المجموعة B تمارين موضوعية

في التمارين (1-6)، ظلّل الدائرة (a) إذا كانت العبارة صحيحة و (b) إذا كانت العبارة خاطئة.

- |     |     |
|-----|-----|
| (a) | (b) |

(1) إذا كانت:  $y = 4^{x-2}$  فإن:  $\frac{dy}{dx} = 4x$

(2) إذا كانت:  $f(x) = e^{x^2}$  فإن:  $f'(x) = 2xe^{2x}$

(3) إذا كانت:  $g(x) = \ln(2x+2)$  فإن:  $g'(x) = \frac{1}{2x+2}$

(4) إذا كانت:  $y = x \ln x - x$  فإن:  $y' = \ln x$

(5)  $\int \frac{1}{2x} dx = \frac{\ln x}{2} + C$

(6)  $\int \frac{1}{3x+1} dx = \ln(3x+1) + C$

في التمارين (7-14)، ظلّل رمز الدائرة الدال على الإجابة الصحيحة.

(7) إذا كانت  $y = e^{-5x}$  فإن  $\frac{dy}{dx}$  تساوي:

- |                 |                |
|-----------------|----------------|
| (a) $e^{-5x}$   | (b) $-e^{-5x}$ |
| (c) $-5e^{-5x}$ | (d) $5e^{-5x}$ |

(8) إذا كانت  $y = x^2 e^x - x e^x$  فإن  $\frac{dy}{dx}$  تساوي:

- |                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| (a) $e^x(x^2+x-1)$ | (b) $e^x(x^2-x)$    |
| (c) $2x e^x - e^x$ | (d) $e^x(x^2+2x+1)$ |

(9) إذا كانت  $y = (\ln x)^2$  فإن  $\frac{dy}{dx}$  تساوي:

- |                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| (a) $\frac{\ln x}{x}$   | (b) $\frac{2 \ln x}{x}$   |
| (c) $\frac{x \ln x}{2}$ | (d) $\frac{2 \ln^2 x}{x}$ |

(10) إذا كانت  $y = \ln\left(\frac{10}{x}\right)$  فإن  $\frac{dy}{dx}$  تساوي:

- |                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| (a) $-\frac{10}{x}$ | (b) $\frac{10}{x}$ |
| (c) $\frac{1}{x}$   | (d) $-\frac{1}{x}$ |

(11) إذا كانت  $y = \ln(x^2+1)$  فإن  $\frac{dy}{dx}$  تساوي:

- |                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| (a) $\frac{x}{x^2+1}$  | (b) $\frac{2}{x^2+1}$   |
| (c) $\frac{2x}{x^2+1}$ | (d) $-\frac{2x}{x^2+1}$ |

$$(12) \int \frac{2x}{x^2+1} dx =$$

(a)  $2\ln(x^2+1)+C$

(b)  $\ln(x^2+1)+C$

(c)  $\frac{x^2}{x^2+1}+C$

(d)  $\frac{x}{\frac{1}{3}x^2+1}+C$

$$(13) \int \frac{e^x+e^{-x}}{2} dx =$$

(a)  $\frac{e^x-e^{-x}}{2}+C$

(b)  $\frac{e^x+e^{-x}}{2}+C$

(c)  $\frac{e^{-x}-e^x}{2}+C$

(d)  $\frac{e^{2x}-e^{-2x}}{2}+C$

$$(14) \int \frac{e^x}{e^x-4} dx =$$

(a)  $-\frac{1}{2}(e^x-4)+C$

(b)  $\ln|e^x-4|+C$

(c)  $-\ln|e^x-4|+C$

(d)  $\frac{1}{2}\ln|e^x-4|+C$

تمرن  
5-5

التكامل بالتجزئ

Integration by Parts

المجموعة A تمارين مقالية - school

في التمارين (1-14)، أوجد التكامل.

$$(1) \int x \cos(3x) dx$$

$$(2) \int x \sin(5x) dx$$

$$(1) \quad u = x \quad dv = \cos(3x) dx$$

$$du = dx \quad v = \frac{\sin(3x)}{3}$$

$$\begin{aligned} \int x \cos(3x) dx &= \frac{x}{3} \sin(3x) - \frac{1}{3} \int \sin(3x) dx \\ &= \frac{x}{3} \sin(3x) + \frac{1}{9} \cos(3x) + C \end{aligned}$$

$$(2) \quad u = x \quad dv = \sin(5x) dx$$

$$du = dx \quad v = -\frac{1}{5} \cos(5x)$$

$$\begin{aligned} \int x \sin(5x) dx &= -\frac{x}{5} \cos(5x) + \frac{1}{5} \int \cos(5x) dx \\ &= -\frac{x}{5} \cos(5x) + \frac{1}{25} \sin(5x) + C \end{aligned}$$

$$(3) \int x e^{x-3} dx$$

$$u = x, \quad dv = e^{x-3}$$

$$du = dx, \quad v = e^{x-3}$$

$$\int x e^{x-3} dx = x e^{x-3} - \int e^{x-3} dx = x e^{x-3} - e^{x-3} + C$$

$$(5) \int \ln \sqrt[4]{x} dx$$

$$u = \ln \sqrt[4]{x} = \ln x^{\frac{1}{4}} = \frac{1}{4} \ln x$$

$$du = \frac{1}{4x} dx$$

$$dv = dx, \quad v = x$$

$$\int \ln \sqrt[4]{x} dx = \frac{x}{4} \ln x - \int \frac{1}{4x} \times x dx = \frac{1}{4}(x \ln x - x) + C$$

$$(7) \int (2x+1) \ln(x+1) dx$$

$$\int (2x+1) \ln(x+1) dx = (x^2+x) \ln(x+1) + \frac{x^2}{2} + C$$

$$(u = \ln(x+1), \quad dv = (2x+1) dx \text{ (إرشاد)})$$

$$(9) \int \frac{\ln x}{\sqrt[3]{x}} dx$$

$$u = \ln x^2 = 2 \ln x, \quad du = \frac{2}{x} dx$$

$$dv = x^2 dx, \quad v = \frac{x^3}{3}$$

$$\int x^2 \ln x^2 dx = \frac{1}{3} x^3 \ln x^2 - \frac{2}{3} \int \frac{1}{x} \times x^3 dx = \frac{1}{3} x^3 \ln x^2 - \frac{2}{9} x^3 + C$$

$$(4) \int (x-5) e^{x-5} dx$$

$$\int (x-5) e^{x-5} dx = (x-6) e^{x-5} + C$$

$$(u = x-5, \quad dv = e^{x-5} dx \text{ (إرشاد)})$$

$$(6) \int \ln(2x-1) dx$$

$$u = \ln(2x-1), \quad du = \frac{2}{2x-1} dx$$

$$dv = dx, \quad v = x$$

$$\int \ln(2x-1) dx = x \ln(2x-1) - \int \frac{2x}{2x-1} dx = x \ln(2x-1) - \int \frac{2x-1+1}{2x-1} dx$$

$$= x \ln(2x-1) - \int \left(1 + \frac{1}{2x-1}\right) dx$$

$$= x \ln(2x-1) - x - \frac{1}{2} \ln(2x-1) + C$$

$$(8) \int \frac{\ln(x)}{x^2} dx$$

$$u = \ln x, \quad du = \frac{1}{x} dx$$

$$dv = \frac{1}{x^2} dx, \quad v = -\frac{1}{x}$$

$$\int \frac{1}{x^2} \ln x dx = \frac{-\ln x}{x} + \int \frac{1}{x^2} dx = \frac{-\ln x}{x} - \frac{1}{x} + C$$

$$(10) \int x^2 \ln x^2 dx$$

$$u = x^2 - 2x, \quad du = 2(x-1) dx$$

$$dv = \cos x dx, \quad v = \sin x$$

$$(11) \int (x^2 - 2x) \cos x \, dx$$

$$u = x^2 - 2x \quad du = 2(x - 1) \, dx$$

$$dv = \cos x \, dx \quad v = \sin x$$

$$\int (x^2 - 2x) \cos x \, dx = (x^2 - 2x) \sin x - 2 \int (x - 1) \sin x \, dx$$

$\int (x - 1) \sin x \, dx$  نستخدم القاعدة مرّة ثانية لإيجاد

$$u = x - 1 \quad du = dx$$

$$dv = \sin x \, dx \quad v = -\cos x$$

$$\int (x^2 - 2x) \cos x \, dx = (x^2 - 2x) \sin x - 2 \left[ -(x - 1) \cos x + \int \cos x \, dx \right]$$

$$= (x^2 - 2x - 2) \sin x + 2(x - 1) \cos x + C$$

$$(12) \int (x^2 + 3x) \sin x \, dx$$

$$u = x^2 + 3x \quad du = (2x + 3) \, dx$$

$$dv = \sin x \, dx \quad v = -\cos x$$

$$\int (x^2 + 3x) \sin x \, dx = -(x^2 + 3x) \cos x + \int (2x + 3) \cos x \, dx$$

$\int (2x + 3) \cos x \, dx$  نستخدم القاعدة مرّة ثانية لإيجاد

$$u = 2x + 3 \quad du = 2 \, dx$$

$$dv = \cos x \, dx \quad v = \sin x$$

$$\int (x^2 + 3x) \sin x \, dx = -(x^2 + 3x) \cos x + (2x + 3) \sin x - 2 \int \sin x \, dx$$

$$= -(x^2 + 3x - 2) \cos x + (2x + 3) \sin x + C$$

$$(13) \int x^2 e^{x+1} \, dx$$

$$u = x^2 \quad du = 2x \, dx$$

$$dv = e^{x+1} \, dx \quad v = e^{x+1}$$

$$\int x^2 e^{x+1} \, dx = x^2 e^{x+1} - \int 2x e^{x+1} \, dx$$

$\int x e^{x+1} \, dx$  نستخدم القاعدة مرّة ثانية لإيجاد

$$u = x \quad du = dx$$

$$dv = e^{x+1} \, dx \quad v = e^{x+1}$$

$$\int x^2 e^{x+1} \, dx = x^2 e^{x+1} - 2x e^{x+1} + 2 \int e^{x+1} \, dx = e^{x+1} (x^2 - 2x + 2) + C$$

$$(14) \int x^2 e^{2x-3} dx$$

$$u = x^2 \quad du = 2x dx$$

$$dv = e^{2x-3} dx \quad v = \frac{1}{2} e^{2x-3}$$

$$\int x^2 e^{2x-3} dx = \frac{x^2}{2} e^{2x-3} - \int x e^{2x-3} dx$$

نستخدم القاعدة مرّة ثانية لإيجاد  $\int x e^{2x-3} dx$

$$u = x \quad du = dx$$

$$dv = e^{2x-3} dx \quad v = \frac{1}{2} e^{2x-3}$$

$$\int x^2 e^{2x-3} dx = \frac{x^2}{2} e^{2x-3} - \left[ \frac{x}{2} e^{2x-3} - \int \frac{1}{2} e^{2x-3} dx \right]$$

$$= \frac{x^2}{2} e^{2x-3} - \frac{x}{2} e^{2x-3} + \frac{1}{4} e^{2x-3} + C = e^{2x-3} \left( \frac{x^2}{2} - \frac{x}{2} + \frac{1}{4} \right) + C$$

$$(15) \int (\ln(x))^2 dx$$

$$u = (\ln(x))^2 \quad du = 2 \frac{\ln(x)}{x} dx$$

$$dv = dx \quad v = x$$

$$\int (\ln(x))^2 dx = x(\ln(x))^2 - 2 \int \ln(x) dx$$

$$u = \ln x \quad du = \frac{dx}{x}$$

$$dv = dx \quad v = x$$

$$\int (\ln(x))^2 dx = x(\ln(x))^2 - 2 \left[ x \ln x - \int dx \right] = x(\ln(x))^2 - 2x \ln x + 2x + C$$

$$(16) \int e^{2x} \sin x dx$$

$$u = \sin x \quad dv = e^{2x} dx$$

$$du = \cos x dx \quad v = \frac{1}{2} e^{2x}$$

$$\int e^{2x} \sin x dx = \frac{1}{2} \sin x e^{2x} - \frac{1}{2} \int \cos x e^{2x} dx$$

نستخدم القاعدة مرّة ثانية فنحصل على:

$$u = \cos x \quad dv = e^{2x} dx$$

$$du = -\sin x dx \quad v = \frac{1}{2} e^{2x}$$

$$\int e^{2x} \sin x dx = \frac{1}{2} \sin x e^{2x} - \frac{1}{2} \left[ \frac{1}{2} \cos x e^{2x} + \frac{1}{2} \int e^{2x} \sin x dx \right]$$

$$= \frac{1}{2} \sin x e^{2x} - \frac{1}{4} \cos x e^{2x} - \frac{1}{4} \int e^{2x} \sin x dx$$

$$\frac{5}{4} \int e^{2x} \sin x dx = \frac{1}{2} \sin x e^{2x} - \frac{1}{4} \cos x e^{2x} \implies \int e^{2x} \sin x dx = \frac{2}{5} e^{2x} \sin x - \frac{1}{5} e^{2x} \cos x + C$$

$$(17) \int \sin(\ln x) dx$$

$$u = \sin(\ln x) \quad du = \frac{\cos(\ln x)}{x} dx$$

$$dv = dx \quad v = x$$

$$\int \sin(\ln x) dx = x \sin(\ln x) - \int \cos(\ln x) dx$$

نستخدم القاعدة مرة ثانية لإيجاد  $\int \cos(\ln x) dx$

$$u = \cos(\ln x) \quad du = -\frac{\sin(\ln x)}{x} dx$$

$$dv = dx \quad v = x$$

$$\int \sin(\ln x) dx = x \sin(\ln x) - [x \cos(\ln x)] + \int x \cdot \frac{\sin(\ln x)}{x} dx = x \sin(\ln x) - x \cos(\ln x) - \int \sin(\ln x) dx$$

$$\Rightarrow 2 \int \sin(\ln x) dx = x \sin(\ln x) - x \cos(\ln x)$$

$$\int \sin(\ln x) dx = \frac{x}{2} [\sin(\ln x) - \cos(\ln x)] + C$$

### المجموعة B تمارين موضوعية

في التمارين (1-5)، ظلل الدائرة (a) إذا كانت العبارة صحيحة و (b) إذا كانت العبارة خاطئة.

$$(1) \int x \cos(2x) dx = \frac{1}{2} x \sin(2x) + \frac{1}{4} \cos 2x + C$$

(a) (b)

$$(2) \int x \sin(\pi x) dx = -\frac{x}{\pi} \cos(\pi x) + \frac{1}{\pi^2} \sin(\pi x) + C$$

(a) (b)

$$(3) \int x e^{6x} dx = \frac{1}{6} x e^{6x} - \frac{1}{36} e^{6x} + C$$

(a) (b)

$$(4) \int x e^{-x} dx = -x e^{-x} + e^{-x} + C$$

(a) (b)

$$(5) \int x \sec^2 x dx = x \tan x - \ln |\sec x| + C$$

(a) (b)

في التمارين (6-11)، ظلّل رمز الدائرة الدال على الإجابة الصحيحة.

(6)  $\int (2x+1)\sin x \, dx$

(a)  $(2x+1)\cos x + 2\sin x + C$

(b)  $-(2x+1)\cos x + 2\sin x + C$

(c)  $-(x+1)\cos x - 2\sin x + C$

(d)  $(2x+1)\cos x - \sin x + C$

(7)  $\int x^2 \ln(x) \, dx =$

(a)  $\frac{1}{3}x^3 \ln(x) - \frac{x^3}{3} + C$

(b)  $\frac{1}{3}x^3 \ln(x) - \frac{x^3}{9} + C$

(c)  $\frac{1}{3}x^3 \ln(x) + \frac{x^3}{9} + C$

(d)  $-\frac{1}{3}x^3 \ln(x) - \frac{x^3}{9} + C$

في التمرينين (8-9)، إذا كان  $\int (2x+1)\ln x \, dx = uv - \int vdu$  فإن:

(8)  $uv =$

(a)  $(2x+1)\ln x$

(b)  $2x \ln x$

(c)  $\frac{2x+1}{2} \ln x$

(d)  $x(x+1)\ln x$

(9)  $\int vdu =$

(a)  $\frac{1}{2}x \ln x + C$

(b)  $\frac{1}{2}x^2 + x + C$

(c)  $(2x+1)\ln x + C$

(d)  $\frac{1}{3}x^3 + \frac{1}{2}x^2 + C$

في التمرينين (10-11)، إذا كان  $\int (3x-1)e^{3x+2} \, dx = uv - \int vdu$  فإن:

(10)  $uv =$

(a)  $(3x-1)e^{3x+2}$

(b)  $\frac{1}{3}(3x-1)e^{3x+2}$

(c)  $(3x-1)e^{x+2}$

(d)  $\frac{1}{3}(x-1)e^{3x+2}$


(11)  $\int vdu =$

(a)  $-\frac{1}{3}e^{3x+2} + C$

(b)  $-e^{3x+2} + C$

(c)  $\frac{1}{3}e^{3x+2} + C$

(d)  $e^{3x+2} + C$



تمرن  
5-6

التكامل باستخدام الكسور الجزئية

## Integration Using Partial Fractions

المجموعة A تمارين مقالية

في التمارين (1-4)، أوجد الكسور الجزئية لكل دالة  $f$  مما يلي ثم أوجد  $\int f(x)dx$ .

$$(1) f(x) = \frac{2}{(x-5)(x-3)}$$

$$(2) f(x) = \frac{1}{x^2+2x}$$

$$(1) f(x) = \frac{A_1}{x-5} + \frac{A_2}{x-3}$$

$$2 = A_1(x-3) + A_2(x-5)$$

مدرستي  
الكويتية

school-kw.com

$$\therefore f(x) = \frac{1}{x-5} - \frac{1}{x-3}$$

$$\int f(x)dx = \ln|x-5| - \ln|x-3| + C$$

$$(2) x^2+2x = x(x+2)$$

$$f(x) = \frac{A_1}{x} + \frac{A_2}{x+2}$$

$$1 = A_1(x+2) + A_2x$$

$$A_2 = -\frac{1}{2} \quad \therefore \text{عوض عن } x \text{ بـ } -2$$

$$A_1 = \frac{1}{2} \quad \therefore \text{عوض عن } x \text{ بـ } 0$$

$$\therefore f(x) = \frac{1}{2x} - \frac{1}{2(x+2)}$$

$$\int f(x)dx = \frac{1}{2}\ln|x| - \frac{1}{2}\ln|x+2| + C$$

$$(3) f(x) = \frac{-x+10}{x^2+x-12}$$

$$f(x) = \frac{A_1}{x-3} + \frac{A_2}{x+4}$$

$$-x + 10 = A_1(x+4) + A_2(x-3)$$

$$A_2 = -2 \quad \therefore \quad -4 \text{ بـ } x \text{ عن عوّض}$$

$$A_1 = 1 \quad \therefore \quad 3 \text{ بـ } x \text{ عن عوّض}$$

$$\therefore f(x) = \frac{1}{x-3} - \frac{2}{x+4}$$

$$\int f(x) dx = \ln|x-3| - 2 \ln|x+4| + C$$

$$(4) f(x) = \frac{12}{x^3 + 2x^2 - 3x}$$

$$f(x) = \frac{A_1}{x} + \frac{A_2}{x-1} + \frac{A_3}{x+3}$$

$$12 = A_1(x-1)(x+3) + A_2(x)(x+3) + A_3(x)(x-1)$$

مدرستي  
الكويتية

$$f(x) = \frac{-4}{x} + \frac{3}{x-1} + \frac{1}{x+3} \quad \text{h o o l - k w . c o m}$$

$$\int f(x) dx = -4 \ln|x| + 3 \ln|x-1| + \ln|x+3| + C$$

$$(5) \int \frac{x+17}{2x^2+5x-3} dx$$

$$2x^2 + 5x - 3 = (2x-1)(x+3)$$

$$\frac{x+17}{(2x-1)(x+3)} = \frac{A_1}{2x-1} + \frac{A_2}{x+3}$$


$$x+17 = A_1(x+3) + A_2(2x-1)$$

$$A_1 = 5 \quad \therefore \quad \frac{1}{2} \text{ بـ } x \text{ عن عوّض}$$

$$A_2 = -2 \quad \therefore \quad -3 \text{ بـ } x \text{ عن عوّض}$$

$$\int \frac{x+17}{2x^2+5x-3} dx = \int \left( \frac{5}{2x-1} - \frac{2}{x+3} \right) dx$$

$$= \frac{5}{2} \ln|2x-1| - 2 \ln|x+3| + C$$



$$(6) \int \frac{-6x+25}{x^3-6x^2+9x} dx$$

$$x^3-6x^2+9x = x(x^2-6x+9) = x(x-3)^2$$

$$\frac{-6x+25}{x^3-6x^2+9x} = \frac{A_1}{x} + \frac{A_2}{(x-3)} + \frac{A_3}{(x-3)^2}$$

$$\therefore -6x+25 = A_1(x-3)^2 + A_2x(x-3) + A_3x$$

$$A_3 = \frac{7}{3} \quad \therefore \text{عوض عن } x \text{ بـ } 3$$

$$A_1 = \frac{25}{9} \quad \therefore \text{عوض عن } x \text{ بـ } 0$$

عوض في المعادلة عن  $A_1 = \frac{25}{9}$  و  $A_3 = \frac{7}{3}$  ولتكن  $x = 1$  لإيجاد قيمة  $A_2$ .

$$\therefore A_2 = -\frac{25}{9}$$

$$\frac{-6x+25}{x^3-6x^2+9x} = \frac{25}{9x} - \frac{25}{9(x-3)} + \frac{7}{3(x-3)^2}$$

$$\int \frac{-6x+25}{x^3-6x^2+9x} dx = \frac{25}{9} \ln|x| - \frac{25}{9} \ln|x-3| - \frac{7}{3} \times \frac{1}{(x-3)} + C$$

$$(7) \int \frac{3x^2-4x+3}{x^3-3x^2} dx$$

مدرستي  
الكويتية



$$x^3-3x^2 = x^2(x-3) \quad \text{school-kw.com}$$

$$\frac{3x^2-4x+3}{x^3-3x^2} = \frac{A_1}{x} + \frac{A_2}{x^2} + \frac{A_3}{x-3}$$

$$\therefore 3x^2-4x+3 = A_1x(x-3) + A_2(x-3) + A_3x^2$$

$$A_2 = -1 \quad \therefore \text{عوض عن } x \text{ بـ } 0$$

$$A_3 = 2 \quad \therefore \text{عوض عن } x \text{ بـ } 3$$

عوض في المعادلة عن  $A_2 = -1$  و  $A_3 = 2$  ولتكن  $x = 1$  لإيجاد قيمة  $A_1$ .

$$\therefore A_1 = 1$$

$$\frac{3x^2-4x+3}{x^3-3x^2} = \frac{1}{x} - \frac{1}{x^2} + \frac{2}{x-3}$$

$$\int \frac{3x^2-4x+3}{x^3-3x^2} dx = \ln|x| + \frac{1}{x} + 2 \ln|x-3| + C$$

$$(8) \int \frac{x^2 + 3x + 2}{(x-3)^2} dx$$

$$\frac{x^2 + 3x + 2}{(x-3)^2} = 1 + \frac{9x-7}{(x-3)^2}$$

$$\frac{9x-7}{(x-3)^2} = \frac{A_1}{x-3} + \frac{A_2}{(x-3)^2}$$

$$9x-7 = A_1(x-3) + A_2$$

عوض عن  $x$  بـ 3  $\therefore A_2 = 20$

عوض عن  $A_2$  بـ 20 ولتكن  $x = 1$  لإيجاد قيمة  $A_1$ .

$$\therefore A_1 = 9$$

$$\frac{x^2 + 3x + 2}{(x-3)^2} = 1 + \frac{9}{x-3} + \frac{20}{(x-3)^2}$$

$$\int \frac{x^2 + 3x + 2}{(x-3)^2} dx = x + 9 \ln|x-3| - \frac{20}{x-3} + C$$

$$(9) \int \frac{2x^2 + x + 3}{x^2 - 1} dx$$

$$\frac{2x^2 + x + 3}{x^2 - 1} = 2 + \frac{x+5}{x^2-1}$$

$$\frac{x+5}{x^2-1} = \frac{A_1}{x-1} + \frac{A_2}{x+1}$$

$$x+5 = A_1(x+1) + A_2(x-1)$$

عوض عن  $x$  بـ 1  $\therefore A_1 = 3$

عوض عن  $x$  بـ -1  $\therefore A_2 = -2$

$$\frac{2x^2 + x + 3}{x^2 - 1} = 2 + \frac{3}{x-1} - \frac{2}{x+1}$$

$$\int \frac{2x^2 + x + 3}{x^2 - 1} dx = \int \left( 2 + \frac{3}{x-1} - \frac{2}{x+1} \right) dx$$

$$= 2x + 3 \ln|x-1| - 2 \ln|x+1| + C$$



مدرستي

الكويتية

school-kw.com

$$(10) \int \frac{x^3 - 2}{x^2 + x} dx$$

$$\frac{x^3 - 2}{x^2 + x} = x - 1 + \frac{x - 2}{x^2 + x}$$

$$\frac{x - 2}{x^2 + x} = \frac{A_1}{x} + \frac{A_2}{x + 1}$$

$$x - 2 = A_1(x + 1) + A_2x$$

$A_1 = -2$  ∴ عوّض عن  $x$  بـ 0

$A_2 = 3$  ∴ عوّض عن  $x$  بـ -1

$$\frac{x^3 - 2}{x^2 + x} = x - 1 - \frac{2}{x} + \frac{3}{x + 1}$$

$$\int \frac{x^3 - 2}{x^2 + x} dx = \frac{x^2}{2} - x - 2 \ln|x| + 3 \ln|x + 1| + C$$

$$(11) \int \frac{x^4 - 2x^3 + x^2 + 2x - 1}{x^2 - 2x + 1} dx$$

مدرستي  
الكويتية



$$\frac{x^4 - 2x^3 + x^2 + 2x - 1}{x^2 - 2x + 1} = x^2 + \frac{2x - 1}{x^2 - 2x + 1}$$

$$\frac{2x - 1}{(x - 1)^2} = \frac{A_1}{x - 1} + \frac{A_2}{(x - 1)^2}$$

$$2x - 1 = A_1(x - 1) + A_2$$

$A_2 = 1$  ∴ عوّض عن  $x$  بـ 1

$A_1 = 2$  ∴ عوّض عن  $A_2$  بـ 1 ولنكن  $x = 0$

$$\frac{x^4 - 2x^3 + x^2 + 2x - 1}{x^2 - 2x + 1} = x^2 + \frac{2}{x - 1} + \frac{1}{(x - 1)^2}$$

$$\int \frac{x^4 - 2x^3 + x^2 + 2x - 1}{x^2 - 2x + 1} dx = \frac{x^3}{3} + 2 \ln|x - 1| - \frac{1}{(x - 1)} + C$$

$$f(x) = \frac{2x^4 - 5x^3 - 7x^2 + 32x - 28}{x^3 - 2x^2 - 4x + 8} \text{، لئأخذ، (12)}$$

(a) اكتب  $f(x)$  على صورة  $q(x) + \frac{r(x)}{h(x)}$ ، حيث درجة  $r(x)$  أصغر من درجة  $h(x)$ .

(b) أوجد الكسور الجزئية للحدودية النسبية  $\frac{r(x)}{h(x)}$ .

(c) أوجد  $\int f(x) dx$ .

$$(12) (a) f(x) = \frac{(x-2)(2x^3 - x^2 - 9x + 14)}{(x-2)^2(x+2)} = \frac{2x^3 - x^2 - 9x + 14}{x^2 - 4}$$

$$= 2x - 1 + \frac{-x + 10}{(x-2)(x+2)}$$

$$(b) \frac{-x + 10}{(x-2)(x+2)} = \frac{A_1}{x-2} + \frac{A_2}{x+2} = \frac{2}{x-2} - \frac{3}{x+2}$$

$$(c) f(x) = 2x - 1 + \frac{2}{x-2} + \frac{-3}{x+2}$$

$$\int f(x) dx = x^2 - x + 2 \ln|x-2| - 3 \ln|x+2| + C$$

مدرستي

الكويتية

المجموعة B تمارين موضوعية

school.kw.com

في التمارين (1-4)، ظلل الدائرة (a) إذا كانت العبارة صحيحة و (b) إذا كانت العبارة خاطئة.

$$(1) \int \frac{4dx}{(x+3)(x+7)} = \ln|x+3| + \ln|x+7| + C$$

(a)

(b)

$$(2) \int \frac{-6dx}{x^2 + 3x} = -2 \ln|x+3| + 2 \ln|x| + C$$

(a)

(b)

(3) الدالة،  $f(x) = \frac{4x-11}{2x^2-x-3}$  على صورة كسور جزئية هي:  $f(x) = \frac{3}{x+1} - \frac{2}{2x-3}$  (a) (b)

(4) للحدودية النسبية،  $\frac{x^2-x+2}{x^3-2x^2+x}$  ثلاثة كسور جزئية. (a) (b)

(5)  $\int \frac{6}{x^2-9} dx =$

(a)  $\ln|x+3| - \ln|x-3| + C$

(b)  $\ln(x-3) - \ln(x+3) + C$

(c)  $\ln|x+3| + \ln|x-3| + C$

(d)  $\ln|x-3| - \ln|x+3| + C$

(6)  $\int \frac{7x-7}{x^2-3x-10} dx =$

(a)  $4\ln|x+2| + 3\ln|x-5| + C$

(b)  $3\ln|x+2| + 2\ln|x-5| + C$

(c)  $4\ln|x-5| + 3\ln|x+2| + C$

(d)  $4\ln|x-5| - 3\ln|x+2| + C$

(7) الدالة النسبية،  $f(x) = \frac{x}{x^2-4}$  على صورة كسور جزئية هي  $f(x)$  تساوي:

(a)  $\frac{1}{x-2} + \frac{1}{x+2}$

(b)  $\frac{1}{2(x-2)} + \frac{1}{2(x+2)}$

(c)  $\frac{1}{x-2} - \frac{1}{x+2}$

(d)  $\frac{1}{2(x-2)} - \frac{1}{2(x+2)}$

(8)  $\int \frac{2x^2-4x+3}{x^2-1} dx =$

(a)  $2 + 2\ln|x-1| - \frac{9}{2}\ln|x+1| + C$

(b)  $\frac{1}{2}\ln|x-1| - \frac{9}{2}\ln|x+1| + C$

(c)  $2x + \frac{1}{2}\ln|x-1| - \frac{9}{2}\ln|x+1| + C$

(d)  $x + \frac{1}{2}\ln|x-1| - 9\ln|x+1| + C$

(9)  $\int \frac{3x^2+2x}{x^2-4} dx =$

(a)  $4\ln|x-2| - 2\ln|x+2| + C$

(b)  $3x + 2\ln|x-2| - 2\ln|x-2| + C$

(c)  $3x + 4\ln|x-2| - 2\ln|x+2| + C$

(d)  $3x + 4\ln|x-2| + 2\ln|x+2| + C$

(10)  $\int \frac{x^3+2}{x^2-x} dx =$

(a)  $\frac{x^2}{2} + 3\ln|x-1| + 2\ln|x| + C$

(b)  $\frac{x^2}{2} - x + 3\ln|x-1| + 2\ln|x| + C$

(c)  $\frac{x^2}{2} - 3\ln|x-1| + 2\ln|x| + C$

(d)  $\frac{x^2}{2} + x + 3\ln|x-1| - 2\ln|x| + C$

المجموعة A تمارين مقالية

في التمارين (1-7)، أوجد:

(1)  $\int_{-1}^1 3x(x-4) dx$

(2)  $\int_0^2 (x+1)^2 dx$

(3)  $\int_0^4 \frac{x^2-1}{x+1} dx$

$\int_{-1}^1 (3x^2 - 12x) dx = [x^3 - 6x^2]_{-1}^1 = 2$

$\int_0^2 (x^2 + 2x + 1) dx = \left[ \frac{x^3}{3} + x^2 + x \right]_0^2 = \frac{26}{3}$

$\int_0^4 \frac{(x-1)(x+1)}{(x+1)} dx = \int_0^4 (x-1) dx = \left[ \frac{x^2}{2} - x \right]_0^4 = 4$

(4)  $\int_0^{\frac{\pi}{3}} \cos 3x dx$

(5)  $\int_1^4 \frac{8-x^4}{2x^2} dx$

(6)  $\int_0^1 x\sqrt{x} dx$

$\int_0^{\frac{\pi}{3}} \cos 3x dx = \frac{1}{3} \sin 3x \Big|_0^{\frac{\pi}{3}} = \frac{1}{3} [\sin \pi - \sin 0] = 0$

$\int_1^4 \left( \frac{4}{x^2} - \frac{x^2}{2} \right) dx = \left( -\frac{4}{x} \right) \Big|_1^4 + \left( \frac{x^3}{6} \right) \Big|_1^4 = -\frac{15}{2}$

$\int_0^1 x \cdot x^{\frac{1}{2}} dx = \int_0^1 x^{\frac{3}{2}} dx = \left[ \frac{x^{\frac{5}{2}}}{\frac{5}{2}} \right]_0^1 = \frac{2}{5}$

(7)  $\int_1^2 \left( 3e^x + \frac{5}{x} \right) dx$

$[3e^x + 5 \ln|x|]_1^2 = 3(e^2 - e) + 5 \ln 2$

في التمارين (8-10)، أوجد:

(8)  $\int_{-1}^3 |x-2| dx$

(9)  $\int_{-1}^1 |x^3| dx$

(10)  $\int_{-2}^3 (x|x|+3) dx$

(8)  $\int_{-1}^2 (-x+2) dx + \int_2^3 (x-2) dx = \left[ -\frac{x^2}{2} + 2x \right]_{-1}^2 + \left[ \frac{x^2}{2} - 2x \right]_2^3 = 5$

(9)  $\int_{-1}^0 -x^3 dx + \int_0^1 x^3 dx = -\frac{x^4}{4} \Big|_{-1}^0 + \frac{x^4}{4} \Big|_0^1 = \frac{1}{2}$

(10)  $\int_{-2}^0 (-x^2+3) dx + \int_0^3 (x^2+3) dx = \left[ -\frac{x^3}{3} + 3x \right]_{-2}^0 + \left[ \frac{x^3}{3} + 3x \right]_0^3 = \frac{64}{3}$

في التمارين (11-13)، دون حساب قيمة التكامل أثبت أن:

$$(11) \int_{-4}^2 (x^2 + 2x - 8) dx \leq 0$$

$$x^2 + 2x - 8 = (x - 2)(x + 4)$$

$$x_1 = -4, \quad x_2 = 2$$


$x$		-4		2	
$x^2 + 2x - 8$	+	0	-	0	+

$$\therefore x^2 + 2x - 8 \leq 0 \quad \therefore \forall x \in [-4, 2]$$

$$\int_{-4}^2 (x^2 + 2x - 8) dx \leq 0$$

$$(12) \int_{-1}^0 (x^3 - 5x^2 - 6x) dx \geq 0$$

$$x^3 - 5x^2 - 6x = x(x^2 - 5x - 6) = x(x + 1)(x - 6)$$



$$x^3 - 5x^2 - 6x \geq 0 \quad \forall x \in [-1, 0]$$

$$\int_{-1}^0 (x^3 - 5x^2 - 6x) dx \geq 0$$

$$(13) \int_0^1 (x^2 - 3x + 7) dx \geq \int_0^1 (4x - 5) dx$$

$$f(x) = x^2 - 3x + 7$$

$$g(x) = 4x - 5$$

$$f(x) - g(x) = x^2 - 7x + 12 = (x - 3)(x - 4)$$

$x$		0		1		3		4	
$f(x) - g(x)$	+	0	-	0	+				

$$f(x) - g(x) \geq 0 \quad \forall x \in [0, 1]$$

$$\int_0^1 (f(x) - g(x)) dx \geq 0 \implies \int_0^1 f(x) dx \geq \int_0^1 g(x) dx$$

$$\int_0^1 (x^2 - 3x + 7) dx \geq \int_0^1 (4x - 5) dx$$

مدرستي  
الكويتية  
school-kw.com



في التمارين (14-15)، استعن برسم بيان الدوال لإيجاد:

$$(14) \int_{-3}^3 \sqrt{9-x^2} dx$$

$$y = \sqrt{9-x^2} \quad \therefore y^2 = 9-x^2 \quad \therefore y^2+x^2 = 9$$


وهي معادلة دائرة مركزها نقطة الأصل ونصف قطرها 3 وحدات.

والدالة  $y = \sqrt{9-x^2}$  تمثل معادلة النصف العلوي للدائرة.

$$\therefore \int_{-3}^3 \sqrt{9-x^2} dx$$

$\therefore$  مساحة المنطقة المظللة تساوي:

$$= \frac{1}{2} \pi (3)^2 = \frac{9}{2} \pi$$



مدرستي

الكويتية

school-kw.com

في التمارين (14-15)، استعن برسم بيان الدوال لإيجاد:

$$(15) \int_{-5}^0 -\sqrt{25-x^2} dx$$


$$y = -\sqrt{25-x^2} \quad \therefore y^2 = 25-x^2 \quad \therefore y^2+x^2 = 25$$

وهي معادلة دائرة مركزها نقطة الأصل ونصف قطرها 5 وحدات.

والدالة  $y = -\sqrt{25-x^2}$  تمثل معادلة النصف السفلي للدائرة.

$$\int_{-5}^0 -\sqrt{25-x^2} dx = -A$$

$$= -\frac{1}{4} \pi (5)^2 = -\frac{25}{4} \pi$$



في التمارين (16–19)، استخدم التعويض المناسب لحساب التكامل.

$$(16) \int_0^3 \frac{dx}{(1+x)^2}$$

$$(17) \int_e^6 \frac{dx}{x \ln x}$$

$$(18) \int_1^e \frac{\ln^6 x}{x} dx$$

$$(19) \int_{-1}^3 \frac{x dx}{x^2 + 1}$$

$$(16) u = 1 + x, \quad du = dx$$

$$\int_0^3 \frac{dx}{(1+x)^2} = \int_1^4 \frac{1}{u^2} du = -\frac{1}{u} \Big|_1^4 = \frac{3}{4}$$

$$(17) u = \ln x, \quad du = \frac{dx}{x}$$

$$x = e, \quad u = 1$$

$$x = 6, \quad u = \ln 6$$

$$\int_1^{\ln 6} \frac{du}{u} = [\ln |u|]_1^{\ln 6} = \ln(\ln 6)$$

$$(18) u = \ln x, \quad du = \frac{dx}{x}$$

$$\int_1^e \frac{(\ln x)^6}{x} dx = \int_0^1 u^6 du = \left[ \frac{u^7}{7} \right]_0^1 = \frac{1}{7}$$

$$(19) u = x^2 + 1, \quad du = 2x dx$$

$$x = -1 \implies u = 2, \quad x = 3 \implies u = 10$$

$$\int_{-1}^3 \frac{x dx}{x^2 + 1} = \frac{1}{2} \int_2^{10} \frac{du}{u} = \frac{1}{2} [\ln |u|]_2^{10} = \frac{1}{2} \ln 5$$



مدرستنا

الكويت

school - k w . c o m

$$(20) \int_0^{\frac{\pi}{2}} x \sin x \, dx$$

$$u = x, \quad du = dx$$

$$dv = \sin x \, dx, \quad v = -\cos x$$

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} x \sin x \, dx = -x \cos x \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} + \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos x \, dx = [\sin x]_0^{\frac{\pi}{2}} = 1$$

$$(21) \int_0^{\pi} x \cos 3x \, dx$$

$$u = x, \quad du = dx$$

$$dv = \cos 3x \, dx, \quad v = \frac{1}{3} \sin 3x$$

$$\int_0^{\pi} x \cos 3x \, dx = \frac{x}{3} \sin 3x \Big|_0^{\pi} - \int_0^{\pi} \frac{1}{3} \sin 3x \, dx = \left[ \frac{1}{9} \cos 3x \right]_0^{\pi} = -\frac{2}{9}$$

$$(22) \int_1^3 x^3 \ln x \, dx$$

$$u = \ln x, \quad du = \frac{dx}{x}$$

$$dv = x^3, \quad v = \frac{x^4}{4}$$

$$\int_1^3 x^3 \ln x \, dx = \frac{x^4}{4} \ln x \Big|_1^3 - \int_1^3 \frac{x^3}{4} \, dx = \frac{81}{4} \ln 3 - \left[ \frac{x^4}{16} \right]_1^3 = \frac{81}{4} \ln 3 - 5$$

مدرستي  
الكويتية



$$(23) \int_0^{\frac{\pi}{2}} e^{2x} \cos x \, dx$$

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} e^{2x} \cos x \, dx$$

$$u = \cos x, \quad dv = e^{2x} \, dx$$

$$du = -\sin x \, dx, \quad v = \frac{1}{2} e^{2x}$$

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} e^{2x} \cos x \, dx = \frac{1}{2} [e^{2x} \cos x]_0^{\frac{\pi}{2}} + \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} e^{2x} \sin x \, dx$$

$$= -\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} e^{2x} \sin x \, dx$$

نطبق القاعدة مرّة ثانية على التكامل المحدد:

$$u = \sin x, \quad dv = e^{2x} \, dx$$

$$du = \cos x \, dx, \quad v = \frac{1}{2} e^{2x}$$

فيكون:

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} e^{2x} \cos x \, dx = -\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \left[ \left( \frac{1}{2} e^{2x} \sin x \right) \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} - \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} e^{2x} \cos x \, dx \right]$$

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} e^{2x} \cos x \, dx = -\frac{1}{2} + \frac{1}{4} e^{\pi} - \frac{1}{4} \int_0^{\frac{\pi}{2}} e^{2x} \cos x \, dx \implies \int_0^{\frac{\pi}{2}} e^{2x} \cos x \, dx = \frac{e^{\pi}}{5} - \frac{2}{5}$$

$$(24) \int_{-1}^1 \frac{4}{x^2-4} dx$$

$$\frac{4}{x^2-4} = \frac{A_1}{(x-2)} + \frac{A_2}{(x+2)}$$

$$4 = A_1(x+2) + A_2(x-2)$$

عوض عن  $x$  بـ  $-2$  ∴  $A_2 = -1$

عوض عن  $x$  بـ  $2$  ∴  $A_1 = 1$

$$\frac{4}{x^2-4} = \frac{1}{x-2} - \frac{1}{x+2}$$

$$\int_{-1}^1 \frac{4}{x^2-4} dx = [\ln|x-2| - \ln|x+2|]_{-1}^1 = -2 \ln 3$$

$$(25) \int_{-2}^0 \frac{5x-1}{x^2+2x-3} dx$$

مدرستي

الكويتية

$$x^2+2x-3 = (x-1)(x+3)$$

$$\frac{5x-1}{x^2+2x-3} = \frac{A_1}{x-1} + \frac{A_2}{x+3}$$

$$5x-1 = A_1(x+3) + A_2(x-1)$$



عوض عن  $x$  بـ  $-3$  ∴  $A_2 = 4$

عوض عن  $x$  بـ  $1$  ∴  $A_1 = 1$

$$\frac{5x-1}{x^2+2x-3} = \frac{1}{x-1} + \frac{4}{x+3}$$

$$\int_{-2}^0 \frac{5x-1}{x^2+2x-3} dx = [\ln|x-1| + 4 \ln|x+3|]_{-2}^0 = 3 \ln 3$$

$$(26) \int_1^3 \frac{x^2}{(x+1)^2} dx$$

$$(26) \frac{x^2 + 2x + 1}{-2x - 1} \sqrt{\frac{x^2}{x^2 + 2x + 1}}$$

$$\frac{x^2}{(x+1)^2} = 1 + \frac{-2x-1}{(x+1)^2}$$

$$\frac{-2x-1}{(x+1)^2} = \frac{A_1}{x+1} + \frac{A_2}{(x+1)^2}$$

$$-2x-1 = A_1(x+1) + A_2$$

عوض عن  $x$  بـ  $-1$  ،  $A_2 = +1$

عوض عن  $x$  بـ  $0$  مع قيمة  $A_2$  نجد  $A_1 = -2$

$$\frac{x^2}{(x+1)^2} = 1 + \frac{-2}{x+1} + \frac{1}{(x+1)^2}$$

$$\int_1^3 \frac{x^2}{(x+1)^2} dx = \int_1^3 \left[ 1 - \frac{2}{x+1} + \frac{1}{(x+1)^2} \right] dx = \left[ x - 2 \ln|x+1| - \frac{1}{x+1} \right]_1^3 = \frac{9}{4} - 2 \ln 2$$

$$\int_1^3 \frac{x^2}{(x+1)^2} dx$$

$$u = x + 1 \rightarrow du = dx$$

$$x = u - 1$$

$$\int_1^3 \frac{x^2}{(x+1)^2} dx = \int_2^4 \frac{(u-1)^2}{u^2} du$$

$$= \int_2^4 \frac{(u^2 - 2u + 1)}{u^2} du$$

$$= \int_2^4 \left( 1 - \frac{2}{u} + \frac{1}{u^2} \right) du$$

$$= \left[ u - 2 \ln|u| - \frac{1}{u} \right]_2^4$$

$$= \left( 4 - 2 \ln 4 - \frac{1}{4} \right) - \left( 2 - 2 \ln 2 - \frac{1}{2} \right)$$

$$= \frac{9}{4} - 2 \ln 2$$

مدرستي

الكويتية

school-kw.com



حل آخر

## المجموعة B تمارين موضوعية

في التمارين (1-7)، ظلل الدائرة (a) إذا كانت العبارة صحيحة و (b) إذا كانت العبارة خاطئة.

- (1)  $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 x dx - \int_{\frac{\pi}{2}}^0 \cos^2 x dx = \frac{\pi}{2}$   a  b
- (2)  $\int_{-3}^{-2} (|x| + x + 5) dx = -2$   a  b
- (3)  $\int_{-1}^1 (|x|)^3 dx = -\frac{1}{2}$   a  b
- (4)  $\int_0^1 12(3x - 2)^3 dx = -15$   a  b
- (5)  $\int_{-1}^1 \frac{1}{\pi} \sqrt{1 - x^2} dx = 1$   a  b
- (6)  $\int_2^3 f(x) dx + \int_3^5 f(x) dx - \int_5^2 f(x) dx = 0$   a  b
- (7)  $\int_2^4 f(x) dx + \int_4^2 g(x) dx = 0$   a  b

مدرستي  
الكويتية

في التمارين (8-12)، ظلل رمز الدائرة الدال على الإجابة الصحيحة.

(8) إذا كان:  $\int_3^{-1} g(x) dx = 2$ ،  $\int_{-1}^3 f(x) dx = 4$ ، فإن  $\int_{-1}^3 (2f(x) + 3g(x) + 1) dx$  تساوي:


- (a) 18  (b) -6  (c) 6  (d) 12
- (9)  $\int_{\sqrt{2}}^{\sqrt{18}} \sqrt{2} dx =$   a 2  b  $2\sqrt{2}$   c 4  d 8
- (10)  $\int_{-1}^1 (1 - |x|) dx =$   a 1  b -1  c 0  d  $\frac{1}{2}$
- (11)  $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} (\sin x + \cos x) dx =$   a 4  b 2  c 0  d  $\pi$

(12) لتكن:  $f(x) = x^2 + 5$ ، فإن  $\int_{-a}^a f(x) dx > 0$  لكل قيم  $a$  تنتمي إلى:

- (a)  $\mathbb{R} - \mathbb{R}^-$   (b)  $\mathbb{R} - \mathbb{R}^+$   (c)  $\mathbb{R}^-$   (d)  $\mathbb{R}^+$

في التمارين (13-15)، لديك قائمتان، اختر من القائمة (2) ما يناسب كل تمرين من القائمة (1) لتحصل على عبارة صحيحة.

إذا كان بيان الدالة  $f$  كما في الشكل المقابل، فإن:



(2)	(1)
(a) 6	(d) $\int_{-4}^3 f(x) dx$ (13) يساوي:
(b) 5	(b) مساحة المنطقة المحددة بمنحنى الدالة $f$ ومحور السينات هي:
(c) 0	(c) $\int_{-4}^{-1} (f(x) + \frac{1}{6}) dx$ (15) يساوي:
(d) 3	

## مدرستي

### اختبار الوحدة الخامسة

#### الكويتية

(1) أثبت أن:  $F(x) = \frac{1}{3}\sqrt{(2x^2 + 6x + 5)^3} + 8$  هي مشتقة عكسية للدالة  $f(x) = (2x + 3)\sqrt{2x^2 + 6x + 5}$ .

(2) إذا كان:  $F(x) = \int (3x^2 - 2x) dx$  وكان:  $F(2) = 6$ ، فأوجد  $F(x)$ .

$$(1) F'(x) = \frac{1}{3} \cdot \frac{3}{2} (2x^2 + 6x + 5)^{\frac{1}{2}} (4x + 6) = (2x + 3)\sqrt{2x^2 + 6x + 5} = f(x)$$

$$(2) F(x) = x^3 - x^2 + C$$

$$F(2) = 6 \quad ; \quad C = 2$$

$$F(x) = x^3 - x^2 + 2$$

$$(3) \int (x+2)\sqrt{x^2+4x+7} dx$$

$$(4) \int \frac{2x-1}{(x^2-x+7)^5} dx$$

$$(3) \frac{1}{2} \int (2x+4)(x^2+4x+7)^{\frac{1}{2}} dx = \frac{(x^2+4x+7)^{\frac{3}{2}}}{3} + C$$

$$(4) \int (2x-1)(x^2-x+7)^{-5} dx = \frac{(x^2-x+7)^{-4}}{-4} + C = \frac{-1}{4(x^2-x+7)^4} + C$$

$$(5) \int x^2 \sqrt[3]{x-3} dx$$

$$(6) \int x^3 \sqrt{x^2-8} dx$$

$$(5) u = x-3, \quad x^2 = (u+3)^2, \quad du = dx$$

$$\begin{aligned} \int x^2 \sqrt[3]{x-3} dx &= \int (u+3)^2 \cdot u^{\frac{1}{3}} du = \int (u^{\frac{5}{3}} + 6u^{\frac{4}{3}} + 9u^{\frac{1}{3}}) du \\ &= \frac{3u^{\frac{8}{3}}}{8} + \frac{18u^{\frac{7}{3}}}{7} + \frac{27}{4}u^{\frac{4}{3}} + C = \frac{3(x-3)^{\frac{8}{3}}}{8} + \frac{18(x-3)^{\frac{7}{3}}}{7} + \frac{27}{4}(x-3)^{\frac{4}{3}} + C \end{aligned}$$

$$(6) u = x^2 - 8, \quad x^2 = u + 8, \quad du = 2x dx \implies x dx = \frac{1}{2} du$$

$$\begin{aligned} \int x^3 \sqrt{x^2-8} dx &= \int x^2 \sqrt{x^2-8} (x dx) \\ &= \frac{1}{2} \int (u+8)u^{\frac{1}{2}} du = \frac{1}{2} \int (u^{\frac{3}{2}} + 8u^{\frac{1}{2}}) du = \frac{u^{\frac{5}{2}}}{5} + \frac{8u^{\frac{3}{2}}}{3} + C \\ &= \frac{(x^2-8)^{\frac{5}{2}}}{5} + \frac{8(x^2-8)^{\frac{3}{2}}}{3} + C \end{aligned}$$

$$(7) \int \frac{x+1}{\sqrt[3]{x+1}} dx$$

$$(8) \int \frac{\cos x}{\sin^3 x} dx$$

$$(7) \int \frac{x+1}{\sqrt[3]{x+1}} dx = \int \frac{(\sqrt[3]{x+1})(\sqrt[3]{x^2 - \sqrt[3]{x+1}})}{(\sqrt[3]{x+1})} dx \\ = \int (x^{\frac{2}{3}} - x^{\frac{1}{3}} + x) dx = \frac{3}{5}x^{\frac{5}{3}} - \frac{3}{4}x^{\frac{4}{3}} + x + C$$

$$(8) \int \cos x (\sin x)^{-3} dx = \frac{(\sin x)^{-2}}{-2} + C = -\frac{1}{2 \sin^2 x} + C$$

$$(9) \int \sin x \sqrt[3]{\cos^2 x} dx$$

$$(10) \int \sec^7 x \tan x dx$$

$$(9) -\int -\sin x (\cos x)^{\frac{2}{3}} dx = \frac{3 \cos x^{\frac{5}{3}}}{5} + C$$

$$(10) \int \sec^7 x \tan x dx = \int \sec^6 x (\tan x \cdot \sec x dx)$$

$$u = \sec x \quad , \quad du = \tan x \sec x dx$$

$$\int \sec^6 x (\tan x \sec x dx) = \int u^6 du = \frac{\sec^7 x}{7} + C$$

$$(11) \int (e^{3x} + \frac{4}{2x-1}) dx$$

$$(12) \int \frac{1}{\sqrt{x}} e^{\sqrt{x}} dx$$

$$(11) \frac{1}{3} \int 3e^{3x} dx + \frac{1}{2} \int \frac{2}{2x-1} dx = \frac{1}{3} e^{3x} + \frac{1}{2} \ln|2x-1| + C$$

$$(12) 2 \int \frac{1}{2\sqrt{x}} e^{\sqrt{x}} dx = 2 e^{\sqrt{x}} + C$$

$$(13) \int \frac{x^2 - 4x}{x^3 - 6x^2 + 1} dx$$

$$(14) \int \frac{e^{2x} + x}{e^{2x} + x^2 + 3} dx$$

$$(13) \frac{1}{3} \int \frac{3x^2 - 12}{x^3 - 6x^2 + 1} dx = \frac{1}{3} \ln|x^3 - 6x^2 + 1| + C$$

$$(14) \frac{1}{2} \int \frac{2e^{2x} + 2x}{e^{2x} + x^2 + 3} dx = \frac{1}{2} \ln|e^{2x} + x^2 + 3| + C$$

$$(15) \int (x^2 - 4) \cos x dx$$

$$(16) \int \ln(3x + 2) dx$$

$$(15) \int (x^2 - 4) \cos x dx = \int x^2 \cos x dx - 4 \int \cos x dx = \int x^2 \cos x dx - 4 \sin x + C_1$$

في التكامل:  $\int x^2 \cos x dx$   
نأخذ:

$$u = x^2 \quad dv = \cos x dx$$

$$du = 2x dx \quad v = \sin x$$

$$\int x^2 \cos x dx = x^2 \sin x - 2 \int x \sin x dx$$

school-kw.com

$$\int x^2 \cos x dx = x^2 \sin x + 2x \cos x - 2 \sin x + C_2$$

$$\int (x^2 - 4) \cos x dx = x^2 \sin x + 2x \cos x - 6 \sin x + C$$



نستخدم القاعدة مرة ثانية لنجد  $\int x \sin x dx$

$$(16) u = \ln(3x + 2) \implies du = \frac{3}{3x + 2} dx$$

$$dv = dx \implies v = x$$

$$\int \ln(3x + 2) dx = x \ln(3x + 2) - \int \frac{3x}{3x + 2} dx = x \ln(3x + 2) - \int \frac{3x + 2 - 2}{3x + 2} dx$$

$$= x \ln(3x + 2) - x + \frac{2}{3} \ln|3x + 2| + C$$

$$(17) \int 3x e^{2x+1} dx$$

$$(17) u = 3x \quad dv = e^{2x+1} dx$$

$$du = 3 dx \quad v = \frac{1}{2} e^{2x+1}$$

$$\int 3x e^{2x+1} dx = \frac{1}{2} \cdot 3x e^{2x+1} - \frac{3}{2} \int e^{2x+1} dx$$

$$\int 3x e^{2x+1} dx = \frac{3}{2} x e^{2x+1} - \frac{3}{4} e^{2x+1} + C$$

$$\int 3x e^{2x+1} dx = \left( \frac{3}{2} x - \frac{3}{4} \right) e^{2x+1} + C$$

$$(18) \int x^2 e^{2x-1} dx$$

$$(18) u = x^2 \quad du = 2x dx$$

$$dv = e^{2x-1} dx \quad v = \frac{1}{2} e^{2x-1}$$

$$\int x^2 e^{2x-1} dx = \frac{x^2}{2} e^{2x-1} - \int x e^{2x-1} dx$$

$$u = x \quad du = dx$$

$$dv = e^{2x-1} dx \quad v = \frac{1}{2} e^{2x-1}$$

$$\int x^2 e^{2x-1} dx = \frac{x^2}{2} e^{2x-1} - \frac{x}{2} e^{2x-1} + \int \frac{1}{2} e^{2x-1} dx = e^{2x-1} \left( \frac{x^2}{2} - \frac{x}{2} + \frac{1}{4} \right) + C$$

$$(19) \int \frac{x^2 - 3x}{x^2 - 3x - 28} dx$$

$$(19) \frac{x^2 - 3x - 28 + 28}{x^2 - 3x - 28} = 1 + \frac{28}{x^2 - 3x - 28}$$

$$x^2 - 3x - 28 = (x-7)(x+4)$$

$$\frac{28}{x^2 - 3x - 28} = \frac{A_1}{x-7} + \frac{A_2}{x+4}$$

$$28 = A_1(x+4) + A_2(x-7)$$

$$A_2 = -\frac{28}{11} \quad \therefore \text{عوض عن } x \text{ بـ } -4$$

$$A_1 = \frac{28}{11} \quad \therefore \text{عوض عن } x \text{ بـ } 7$$

$$\frac{x^2 - 3x}{x^2 - 3x - 28} = 1 + \frac{28}{11(x-7)} - \frac{28}{11(x+4)}$$

$$\int \frac{x^2 - 3x}{x^2 - 3x - 28} dx = x + \frac{28}{11} \ln|x-7| - \frac{28}{11} \ln|x+4| + C$$



مدرستي  
الكويتية

www.madrastati.com

نستخدم القاعدة مرة ثانية

$$(20) \int \frac{x^4 + 2x^2 + 6x}{x^3 + 4x^2 + 4x} dx$$

$$(20) \frac{x^4 + 2x^2 + 6x}{x^3 + 4x^2 + 4x} = \frac{x(x^3 + 2x + 6)}{x(x^2 + 4x + 4)} = \frac{x^3 + 2x + 6}{x^2 + 4x + 4}$$

$$\frac{x^3 + 2x + 6}{x^2 + 4x + 4} = x - 4 + \frac{14x + 22}{(x+2)^2}$$

(باستخدام القسمة المطولة)

$$\frac{14x + 22}{(x+2)^2} = \frac{A_1}{x+2} + \frac{A_2}{(x+2)^2}$$

$$14x + 22 = A_1(x+2) + A_2$$

عوض عن  $x = -2$  نحصل على  $A_2 = -6$

نضع  $A_2 = -6$  ونأخذ  $x = 0$  نحصل على  $A_1 = 14$

$$\int \frac{x^4 + 2x^2 + 6x}{x^3 + 4x^2 + 4x} dx = \frac{x^2}{2} - 4x + 14 \ln|x+2| + \frac{6}{x+2} + C$$

في التمارين (21-26)، أوجد:

$$(21) \int_1^e \frac{1}{x} dx$$

$$(23) \int_0^5 |2x - 5| dx$$

$$(22) \int_{-1}^1 2x \sin(1 - x^2) dx$$

$$(21) [\ln|x|]_1^e = \ln e - \ln 1 = 1$$

$$(22) - \int_{-1}^1 -2x \sin(1 - x^2) dx = [\cos(1 - x^2)]_{-1}^1 = 0$$

$$(23) \int_0^{\frac{5}{2}} (-2x + 5) dx + \int_{\frac{5}{2}}^5 (2x - 5) dx = [-x^2 + 5x]_0^{\frac{5}{2}} + [x^2 - 5x]_{\frac{5}{2}}^5 = \frac{25}{2}$$

$$(24) \int_{-6}^0 -\sqrt{36 - x^2} dx$$

$$(24) y = -\sqrt{36 - x^2} \therefore y^2 = 36 - x^2 \therefore y^2 + x^2 = 36$$

وهي معادلة دائرة مركزها نقطة الأصل ونصف قطرها 6 وحدات.

والدالة  $y = -\sqrt{36 - x^2}$  تمثل النصف السفلي للدائرة.

$\therefore$  مساحة المنطقة المظللة تساوي:

$$\int_{-6}^0 -\sqrt{36 - x^2} dx$$

$$= \frac{1}{4} \pi (6)^2 = 9\pi \text{ units}^2$$

$$(25) \int_3^5 \frac{x^2 - 3}{x^2 - 3x + 2} dx$$

$$(25) \frac{x^2 - 3}{x^2 - 3x + 2} = 1 + \frac{3x - 5}{x^2 - 3x + 2}$$

$$\frac{3x - 5}{x^2 - 3x + 2} = \frac{A_1}{(x - 2)} + \frac{A_2}{(x - 1)}$$

$$3x - 5 = A_1(x - 1) + A_2(x - 2)$$

(باستخدام القسمة المطولة)

$$A_2 = 2 \quad \therefore \text{عوض عن } x \text{ بـ } 1$$

$$A_1 = 1 \quad \therefore \text{عوض عن } x \text{ بـ } 2$$

$$\frac{x^2 - 3}{x^2 - 3x + 2} = 1 + \frac{1}{x - 2} + \frac{2}{x - 1}$$

$$\int \frac{x^2 - 3}{x^2 - 3x + 2} dx = [x + \ln|x - 2| + 2 \ln|x - 1|]_3^5 = 2 + \ln 3 + 2 \ln 2$$

$$(26) \int_1^3 \frac{x^3 - 2x^2 + 2}{x^3 + 6x^2 + 9x} dx$$

$$(26) \frac{x^3 - 2x^2 + 2}{x^3 + 6x^2 + 9x} = 1 + \frac{-8x^2 - 9x + 2}{x(x + 3)^2}$$

$$\frac{-8x^2 - 9x + 2}{x(x + 3)^2} = \frac{A_1}{x} + \frac{A_2}{x + 3} + \frac{A_3}{(x + 3)^2}$$

$$-8x^2 - 9x + 2 = A_1(x + 3)^2 + A_2x(x + 3) + A_3x$$

(باستخدام القسمة المطولة)

$$A_1 = \frac{2}{9} \quad \therefore \text{عوض عن } x \text{ بـ } 0$$

$$A_3 = \frac{43}{3} \quad \therefore \text{عوض عن } x \text{ بـ } -3$$

$$A_2 = -\frac{74}{9} \quad \therefore \text{عوض عن } x \text{ بـ } 1 \text{ ولتكن } \frac{43}{3} \text{ بـ } A_3 \text{ وعن } \frac{2}{9} \text{ بـ } A_1$$

$$\frac{x^3 - 2x^2 + 2}{x^3 + 6x^2 + 9x} = 1 + \frac{2}{9x} - \frac{74}{9(x + 3)} + \frac{43}{3(x + 3)^2}$$

$$\int_1^3 \frac{x^3 - 2x^2 + 2}{x^3 + 6x^2 + 9x} dx = \left[ x + \frac{2}{9} \ln|x| - \frac{74}{9} \ln|x + 3| - \frac{43}{3(x + 3)} \right]_1^3$$

$$= 2 + \frac{2}{9} \ln 3 + \frac{43}{36} - \frac{74}{9} (\ln 6 - \ln 4)$$

$$= \frac{115}{36} + \frac{2}{9} \ln 3 - \frac{74}{9} (\ln 6 - \ln 4)$$


في التمارين (27-29)، دون حساب قيمة التكامل أثبت أن:

$$(27) \int_2^5 (-x^2 + 7x + 8) dx \geq 0$$

$$(28) \int_{-4}^{-2} (x^2 + 7x + 10) dx \leq 0$$


$$(29) \int_{-5}^{-4} (x^2 + 13x + 9) dx \leq \int_{-5}^{-4} (5x - 6) dx$$

$$(27) -x^2 + 7x + 8 = (x + 1)(-x + 8)$$



$$\therefore \int_2^5 (-x^2 + 7x + 8) dx \geq 0$$

$$(28) x^2 + 7x + 10 = (x + 2)(x + 5)$$




$$\therefore \int_{-4}^{-2} (x^2 + 7x + 10) dx \leq 0$$

$$(29) f(x) = x^2 + 13x + 9$$

$$g(x) = 5x - 6$$

$$f(x) - g(x) = x^2 + 8x + 15$$

$$f(x) - g(x) = (x + 3)(x + 5)$$



$$f(x) - g(x) \leq 0 \quad \forall x \in [-5, -4]$$

$$\therefore \int_{-5}^{-4} (f(x) - g(x)) dx \leq 0 \implies \int_{-5}^{-4} f(x) dx \leq \int_{-5}^{-4} g(x) dx$$

$$\implies \int_{-5}^{-4} (x^2 + 13x + 9) dx \leq \int_{-5}^{-4} (5x - 6) dx$$



## تمارين إثرائية

في التمرينين (1-2)، ارسم بيانيًا الدالة على الفترة المعطاة، ثم أوجد:


(a) تكامل الدالة على الفترة.

(b) المساحة للمنطقة بين المنحني ومحور السينات.

(1)  $y = -x^2 + 5x - 4$ ,  $[0, 2]$

(2)  $y = x^2 - 4x$ ,  $[0, 5]$

(a)  $\int_0^2 (-x^2 + 5x - 4) dx = \left[ -\frac{x^3}{3} + \frac{5x^2}{2} - 4x \right]_0^2 = -\frac{2}{3}$



(b)  $A = \int_0^1 (x^2 - 5x + 4) dx + \int_1^2 (-x^2 + 5x - 4) dx$   
 $= \left[ \frac{x^3}{3} - \frac{5}{2}x^2 + 4x \right]_0^1 + \left[ -\frac{x^3}{3} + \frac{5}{2}x^2 - 4x \right]_1^2 = 3 \text{ units square}$

school - kw . com


(3)  $\frac{dy}{dx} = x^2 \ln x$

$u = \ln x$        $du = \frac{dx}{x}$

$dv = x^2 dx$        $v = \frac{x^3}{3}$

$\int x^2 \ln x dx = \left( \frac{x^3}{3} \right) \ln x - \int \frac{x^2}{3} dx = \frac{x^3}{3} \ln x - \frac{x^3}{9} + C$

(a)  $\int_0^5 (x^2 - 4x) dx = \left[ \frac{x^3}{3} - 2x^2 \right]_0^5 = -\frac{25}{3}$



(b)  $A = \int_0^4 (-x^2 + 4x) dx + \int_4^5 (x^2 - 4x) dx$   
 $= \left[ -\frac{x^3}{3} + 2x^2 \right]_0^4 + \left[ \frac{x^3}{3} - 2x^2 \right]_4^5 = 13 \text{ units square}$

في التمرينين (3-4)، أوجد قيمة  $y$ .

(4)  $\frac{dy}{d\theta} = \csc \theta \cot \theta$

$\int \cos \theta \cdot (\sin \theta)^{-2} d\theta = -\frac{1}{\sin \theta} + C$

(5) أوجد المشتقة العكسية لـ  $y$  باستخدام القيمة الابتدائية:  $y'(0) = 4$  ,  $y(0) = 1$  ,  $\frac{d^2y}{dx^2} = 2 - 6x$

$$(5) \frac{dy}{dx} = 2x - 3x^2 + C_1$$

$$y'(0) = 4 \quad \therefore \quad C_1 = 4$$

$$\frac{dy}{dx} = 2x - 3x^2 + 4$$

$$y = x^2 - x^3 + 4x + C_2$$

$$y(0) = 1 \quad \therefore \quad C_2 = 1$$

$$y = x^2 - x^3 + 4x + 1$$

(6) تكلفة الطباعة. يتكلف طبع 25 نسخة من إحدى الأوراق 50 دينارًا، ولطبع  $x$  نسخة تعطى التكلفة الحديثة بالعلاقة  $\frac{dc}{dx} = \frac{2}{\sqrt{x}}$  دينارًا كويتيًّا لكل نسخة.

أوجد التكلفة الكليَّة لطبع 2 500 نسخة.

$$(6) C(x) = \int \frac{2}{\sqrt{x}} dx = 4\sqrt{x} + C_1$$

$C(x)$  = التكلفة

$x$  = عدد النسخات

$$\therefore C = (25) = 50 \implies 50 = 4\sqrt{25} + C_1 \implies C_1 = 30$$

$$C(x) = 4\sqrt{x} + 30$$

$$C(2500) = 4\sqrt{2500} + 30 = 230$$

مدرستي  
الكويتية  
school - kw . com



التكلفة: 230 دينارًا

في التمرينين (7-8)، أوجد التكامل:

$$(7) \int x^3 e^x dx$$

$$(7) \begin{aligned} u &= x^3 & du &= 3x^2 dx \\ dv &= e^x dx & v &= e^x \end{aligned}$$

$$\int x^3 e^x dx = x^3 e^x - 3 \int x^2 e^x dx$$

$$u = x^2 \quad du = 2x dx$$

$$dv = e^x dx \quad v = e^x$$

$$\int x^3 e^x dx = x^3 e^x - 3x^2 e^x + 6 \int x e^x dx$$

$$u = x \quad du = dx$$

$$dv = e^x dx \quad v = e^x$$

$$\begin{aligned} \int x^3 e^x dx &= x^3 e^x - 3x^2 e^x + 6x e^x - 6 \int e^x dx \\ &= e^x (x^3 - 3x^2 + 6x - 6) + C \end{aligned}$$

$$(8) \int x^3 \ln x dx$$

نستخدم القاعدة مرَّة ثانية

نستخدم القاعدة مرَّة ثالثة

$$(8) \int x^3 \ln x \, dx$$

$$(8) \quad u = \ln x \quad du = \frac{dx}{x}$$

$$dv = x^3 dx \quad v = \frac{x^4}{4}$$

$$\int x^3 \ln x \, dx = \frac{x^4}{4} \cdot \ln x - \int \frac{x^3}{4} dx = \frac{x^4}{4} \ln x - \frac{x^4}{16} + C$$

(9) استخدم الكسور الجزئية لتوجد التكاملات التالية:

$$(a) \int \frac{x-2}{2x^2-5x+3} dx$$

$$(b) \int \frac{x^2-9}{(2x+1)(x^2+10x+25)} dx$$

$$(c) \int \frac{x^4+3x^2-7}{(x-1)(x^2+5x-6)} dx$$

$$(9) (a) \quad 2x^2 - 5x + 3 = (2x-3)(x-1)$$

$$\frac{x-2}{2x^2-5x+3} = \frac{A_1}{2x-3} + \frac{A_2}{x-1}$$

$$x-2 = A_1(x-1) + A_2(2x-3)$$

عوض عن  $x = 1$   $\therefore A_2 = 1$

عوض عن  $x = \frac{3}{2}$   $\therefore A_1 = -1$

$$\frac{x-2}{2x^2-5x+3} = \frac{-1}{2x-3} + \frac{1}{x-1}$$

$$\int \frac{x-2}{2x^2-5x+3} dx = -\frac{1}{2} \ln|2x-3| + \ln|x-1| + C$$

$$(b) \quad x^2 + 10x + 25 = (x+5)^2$$

$$\frac{x^2-9}{(2x+1)(x^2+10x+25)} = \frac{A_1}{2x+1} + \frac{A_2}{x+5} + \frac{A_3}{(x+5)^2}$$

$$x^2-9 = A_1(x+5)^2 + A_2(2x+1)(x+5) + A_3(2x+1)$$

عوض عن  $x = -5$   $\therefore A_3 = -\frac{16}{9}$

عوض عن  $x = -\frac{1}{2}$   $\therefore A_1 = -\frac{35}{81}$

عوض عن  $A_2 = \frac{58}{81}$   $\therefore x = 0$  ولتكن  $-\frac{35}{81}$   $\rightarrow A_2$  و  $-\frac{16}{9}$   $\rightarrow A_3$

$$\frac{x^2-9}{(2x+1)(x+5)^2} = \frac{-35}{81(2x+1)} + \frac{58}{81(x+5)} - \frac{16}{9(x+5)^2}$$

$$\int \frac{x^2-9}{(2x+1)(x+5)^2} dx = -\frac{35}{162} \ln|2x+1| + \frac{58}{81} \ln|x+5| + \frac{16}{9(x+5)} + C$$

$$(c) \quad \frac{x^4+3x^2-7}{(x-1)(x^2+5x-6)} = x-4 + \frac{30x^2-50x+17}{(x-1)^2(x+6)}$$

(باستخدام القسمة المطولة)

$$\frac{30x^2-50x+17}{(x+6)(x-1)^2} = \frac{A_1}{x+6} + \frac{A_2}{x-1} + \frac{A_3}{(x-1)^2}$$

$$30x^2-50x+17 = A_1(x-1)^2 + A_2(x-1)(x+6) + A_3(x+6)$$

عوض عن  $x = 1$   $\therefore A_3 = -\frac{3}{7}$

عوض عن  $x = -6$   $\therefore A_1 = \frac{1397}{49}$

عوض عن  $A_2 = \frac{73}{49}$   $\therefore x = 0$  ولتكن  $-\frac{3}{7}$   $\rightarrow A_3$  و  $\frac{1397}{49}$   $\rightarrow A_1$


$$\frac{x^4+3x^2-7}{(x-1)(x^2+5x-6)} = x-4 + \frac{1397}{49(x+6)} + \frac{73}{49(x-1)} - \frac{3}{7(x-1)^2}$$

$$\int \frac{x^4+3x^2-7}{(x-1)(x^2+5x-6)} dx = \frac{x^2}{2} - 4x + \frac{1397}{49} \ln|x+6| + \frac{73}{49} \ln|x-1| + \frac{3}{7(x-1)} + C$$

في التمرينين (10-11) استعن برسم بيان الدوال لايجاد:

$$(10) \int_{-1}^1 \sqrt{4-x^2} dx$$

$$(11) \int_{-4}^4 \left(\frac{1}{\pi} - x\right) \sqrt{16-x^2} dx$$



لايجاد التكامل المحدد:  $\int_{-1}^1 \sqrt{4-x^2} dx$

نفترض:  $x = 2 \cos \theta \implies dx = -2 \sin \theta d\theta$

عند  $x = -1$  تكون  $\theta = \frac{2\pi}{3}$  ؛ عند  $x = 1$  تكون  $\theta = \frac{\pi}{3}$


لذا:

$$\int_{-1}^1 \sqrt{4-x^2} dx = \int_{\frac{2\pi}{3}}^{\frac{\pi}{3}} (\sqrt{4-4\cos^2\theta})(2\sin\theta d\theta)$$

$$= \int_{\frac{2\pi}{3}}^{\frac{\pi}{3}} 4\sin^2\theta d\theta = 2 \int_{\frac{2\pi}{3}}^{\frac{\pi}{3}} (1 - \cos 2\theta) d\theta = \frac{2\pi}{3} + \sqrt{3}$$

حل آخر

$$\cos \theta = \frac{1}{2} \implies \theta = \frac{\pi}{3}$$



قياس زاوية القطاع الدائري (ABC) هو أيضًا  $\frac{\pi}{3}$

فتكون مساحته تساوي  $\frac{1}{2} \times \frac{\pi}{3} (2)^2$

أي أن مساحة (ABC)  $\frac{2\pi}{3}$

مساحة كل مثلث  $\frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{1}{2} \times 1 \times \sqrt{3}$

مساحة المثلثين  $\sqrt{3} = 2 \times \frac{\sqrt{3}}{2}$

المساحة الإجمالية  $\frac{2\pi}{3} + \sqrt{3}$

$$\int_{-1}^1 \sqrt{4-x^2} dx = \frac{2\pi}{3} + \sqrt{3}$$

$$(11) \int_{-4}^4 \left(\frac{1}{\pi} - x\right) \sqrt{16 - x^2} dx$$

$$\begin{aligned} (11) \int_{-4}^4 \frac{1}{\pi} \sqrt{16 - x^2} dx - \int_{-4}^4 x \sqrt{16 - x^2} dx \\ = \frac{1}{\pi} \int_{-4}^4 \sqrt{16 - x^2} dx + \frac{1}{2} \int_{-4}^4 -2x \sqrt{16 - x^2} dx \\ = \frac{1}{\pi} \left(\frac{1}{2}\right) (\pi) (4)^2 + \frac{1}{2} \times \frac{2}{3} [(16 - x^2)^{\frac{3}{2}}]_{-4}^4 = 8 + \frac{1}{3}(0) = 8 \end{aligned}$$

$$(12) \int_0^2 \frac{2x+3}{x^2+5x+4} dx$$

$$(12) x^2 + 5x + 4 = (x+1)(x+4)$$

$$\frac{2x+3}{x^2+5x+4} = \frac{A_1}{x+1} + \frac{A_2}{x+4}$$

$$2x+3 = A_1(x+4) + A_2(x+1)$$

$$A_1 = \frac{1}{3} \quad \therefore \text{عوض عن } x \text{ بـ } -1$$

$$A_2 = \frac{5}{3} \quad \therefore \text{عوض عن } x \text{ بـ } -4$$

$$\frac{2x+3}{x^2+5x+4} = \frac{1}{3(x+1)} + \frac{5}{3(x+4)}$$

$$\int \frac{2x+3}{x^2+5x+4} dx = \left[ \frac{1}{3} \ln|x+1| + \frac{5}{3} \ln|x+4| \right]_0^2 = \frac{1}{3} \ln 3 + \frac{5}{3} \ln 6 - \frac{5}{3} \ln 4 = 2 \ln 3 - \frac{5}{3} \ln 2$$

$$(13) \int_1^2 \frac{x^3 - 6x^2 + 3}{x^3 - 6x^2 + 9x} dx$$

$$(13) \frac{x^3 - 6x^2 + 3}{x^3 - 6x^2 + 9x} = 1 + \frac{-9x + 3}{x^3 - 6x^2 + 9x}$$

(باستخدام القسمة المطولة)

$$x^3 - 6x^2 + 9x = x(x-3)^2$$

$$\frac{-9x + 3}{x(x-3)^2} = \frac{A_1}{x} + \frac{A_2}{x-3} + \frac{A_3}{(x-3)^2}$$

$$-9x + 3 = A_1(x-3)^2 + A_2x(x-3) + A_3x$$

$$A_1 = \frac{1}{3} \quad \therefore \text{عوض عن } x \text{ بـ } 0$$

$$A_3 = -8 \quad \therefore \text{عوض عن } x \text{ بـ } 3$$

$$A_2 = -\frac{1}{3} \quad \therefore \text{عوض عن } A_1 \text{ بـ } \frac{1}{3} \text{ وعن } A_3 \text{ بـ } -8 \text{ ولتكن } x = 1$$

$$\frac{x^3 - 6x^2 + 3}{x^3 - 6x^2 + 9x} = 1 + \frac{1}{3x} - \frac{1}{3(x-3)} - \frac{8}{(x-3)^2}$$

$$\int_1^2 \frac{x^3 - 6x^2 + 3}{x^3 - 6x^2 + 9x} dx = \left[ x + \frac{1}{3} \ln|x| - \frac{1}{3} \ln|x-3| + \frac{8}{x-3} \right]_1^2 = -3 + \frac{2}{3} \ln 2$$

$$(14) \int_3^5 x^3 \sqrt{x^2 - 4} dx$$

$$(14) \int_3^5 x^3 \sqrt{x^2 - 4} dx = \int_3^5 x^2 \sqrt{x^2 - 4} (x dx)$$

$$u = x^2 - 4 \implies du = 2x dx$$

$$x^2 = u + 4$$


$$\frac{1}{2} \int_5^{21} (u+4)u^{\frac{1}{2}} du = \frac{1}{2} \int_5^{21} u^{\frac{3}{2}} du + 2 \int_5^{21} u^{\frac{1}{2}} du = \frac{1}{5} [u^{\frac{5}{2}}]_5^{21} + \frac{4}{3} [u^{\frac{3}{2}}]_5^{21} = \frac{581}{5} \sqrt{21} - \frac{35}{3} \sqrt{5}$$

في التمرينين (15-16)، دون حساب قيمة التكامل أثبت أن:

$$(15) \int_0^2 (-x^2 + 9x - 18) dx \leq 0$$

$$(16) \int_{-1}^2 (x^2 + 13x + 15) dx \geq \int_{-1}^2 (3x - 6) dx$$


$$(15) -x^2 + 9x - 18 = (-x + 6)(x - 3)$$



$$\therefore \int_0^2 (-x^2 + 9x - 18) dx \leq 0$$

$$(16) f(x) - g(x) = x^2 + 13x + 15 - 3x + 6 = x^2 + 10x + 21$$

$$f(x) - g(x) = (x + 3)(x + 7)$$



$$f(x) - g(x) \geq 0 \quad \forall x \in [-1, 2]$$

$$\int_{-1}^2 (f(x) - g(x)) dx \geq 0$$

$$\therefore \int_{-1}^2 f(x) dx \geq \int_{-1}^2 g(x) dx$$

$$\therefore \int_{-1}^2 (x^2 + 13x + 15) dx \geq \int_{-1}^2 (3x - 6) dx$$

$$\therefore \int_{-1}^2 f(x) dx \geq \int_{-1}^2 g(x) dx$$

$$\therefore \int_{-1}^2 (x^2 + 13x + 15) dx \geq \int_{-1}^2 (3x - 6) dx$$



## المساحات في المستوي Areas in the Plane

### المجموعة A تمارين مقالية

(1) أوجد مساحة المنطقة المحددة بمنحنى الدالة  $f(x) = 8x^3$  ومحور السينات والمستقيمين  $x = 1$  ,  $x = 3$

$$(1) A = \int_1^3 8x^3 dx = 2x^4 \Big|_1^3 = 160 \text{ units square}$$

(2) أوجد مساحة المنطقة المحددة بمنحنى الدالة  $f(x) = x^2 - 5x$  ومحور السينات.

$$(2) A = \int_0^5 (-x^2 + 5x) dx = \left[ -\frac{x^3}{3} + \frac{5}{2}x^2 \right]_0^5 = \frac{125}{6} \text{ units square}$$

(3) أوجد مساحة المنطقة المحددة بمنحنى الدالة  $f(x) = 12 - x^2$  ومحور السينات.

$$(3) A = \int_{-2\sqrt{3}}^{2\sqrt{3}} (12 - x^2) dx = \left[ 12x - \frac{x^3}{3} \right]_{-2\sqrt{3}}^{2\sqrt{3}} = 32\sqrt{3} \text{ units square}$$

في التمارين (4-6)، أوجد مساحة المنطقة المحددة بمنحنى الدالة  $f$  ومحور السينات في الفترة المحددة:

$$(4) f(x) = x^2 - x - 6 , [-3, 2]$$

$$(4) A = \int_{-3}^{-2} (x^2 - x - 6) dx + \int_{-2}^2 (-x^2 + x + 6) dx = \left[ \frac{x^3}{3} - \frac{x^2}{2} - 6x \right]_{-3}^{-2} + \left[ -\frac{x^3}{3} + \frac{x^2}{2} + 6x \right]_{-2}^2 = \frac{43}{2} \text{ units square}$$

$$(5) f(x) = x^3 - 6x , [0, 3]$$

(5)  $f(x) = 0$  يتقاطع منحنى الدالة مع محور السينات إذا كان:

$$\Rightarrow x(x^2 - 6) = 0 \Rightarrow x = -\sqrt{6} , x = 0 , x = \sqrt{6} \quad \text{فيكون:}$$

$$A = \int_0^{\sqrt{6}} (-x^3 + 6x) dx + \int_{\sqrt{6}}^3 (x^3 - 6x) dx = \left[ -\frac{x^4}{4} + 3x^2 \right]_0^{\sqrt{6}} + \left[ \frac{x^4}{4} - 3x^2 \right]_{\sqrt{6}}^3 = \frac{45}{4} \text{ units square}$$

$$(6) f(x) = \cos 2x, \left[-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}\right]$$

$$A = \int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}} \cos 2x dx - \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} \cos 2x dx = \left[\frac{1}{2} \sin 2x\right]_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}} - \left[\frac{1}{2} \sin 2x\right]_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} = \frac{3}{2} \text{ units square}$$

(7) أوجد مساحة المنطقة المحددة بمنحنى الدالة  $f(x) = 4x - x^2$  ومنحنى الدالة  $g(x) = 5 + x^2$  والمستقيمين  $x = 0$  ,  $x = 2$  علماً بأن منحنىي الدالتين  $f, g$  غير متقاطعين.

$$(7) A = \int_0^2 (x^2 + x^2 - 4x + 5) dx = \int_0^2 (2x^2 - 4x + 5) dx = \left[2\frac{x^3}{3} - 2x^2 + 5x\right]_0^2 = \frac{22}{3} \text{ units square}$$

(8) أوجد مساحة المنطقة المحددة بالمنحنيين  $f(x) = x$  ,  $g(x) = \sqrt[3]{x}$  والمستقيمين  $x = 1$  ,  $x = 8$ .

$$(8) A = \int_1^8 (x - \sqrt[3]{x}) dx = \left[\frac{x^2}{2} - \frac{3}{4}x^{\frac{4}{3}}\right]_1^8 = \frac{81}{4} \text{ units square}$$

(9) أوجد مساحة المنطقة المحددة بمنحنى الدالة  $f(x) = 2x^2$  ومنحنى الدالة  $g(x) = 3 - x$  والمستقيمين  $x = 0$  ,  $x = 3$ .

school - kw . com

(9) حل  $3 - x = 2x^2$  , إذا تقاطع المنحنيات عند  $x = 1$

$$A = \int_0^1 (3 - x - 2x^2) dx + \int_1^3 (2x^2 - 3 + x) dx$$

$$= \left[3x - \frac{x^2}{2} - \frac{2}{3}x^3\right]_0^1 + \left[\frac{2}{3}x^3 - 3x + \frac{x^2}{2}\right]_1^3 = \frac{103}{6} \text{ units square}$$

(10) أوجد مساحة المنطقة بين المنحنى  $f(x) = 3 - x^2$  والمستقيم  $g(x) = -1$


(10) تقاطع المنحنيات عند  $x = \pm 2$

استخدم التناظر:

$$A = 2 \int_0^2 (3 - x^2 + 1) dx = 2 \int_0^2 (4 - x^2) dx$$

$$= 2 \left[4x - \frac{1}{3}x^3\right]_0^2 = 2 \left[\left(8 - \frac{8}{3}\right) - 0\right]$$

$$= \frac{32}{3} \text{ units square}$$



حل آخر

$$f(x) > g(x)$$

$$A = \int_{-2}^2 (f(x) - g(x)) dx = \int_{-2}^2 (3 - x^2 + 1) dx$$

$$= \left[3x - \frac{x^3}{3} + x\right]_{-2}^2 = \left(6 - \frac{8}{3} + 2\right) - \left(-6 + \frac{8}{3} - 2\right) = \frac{32}{3} \text{ units square}$$

في التمارين (11-13)، أوجد مساحة المنطقة المحددة بالمنحنيات التالية:

(11)  $f(x) = x^2 - 2$  ,  $g(x) = 2$

(12)  $f(x) = 2x - x^2$  ,  $g(x) = -2x$

(13)  $f(x) = 7 - 2x^2$  ,  $g(x) = x^2 + 4$

(11) حل  $x^2 - 2 = 2$  ;  $x^2 = 4$  ، إذا تقاطع المنحنيات عند  $x = \pm 2$

$$A = \int_{-2}^2 [2 - (x^2 - 2)] dx = \int_{-2}^2 (4 - x^2) dx = \left[ 4x - \frac{1}{3}x^3 \right]_{-2}^2 = \left( 8 - \frac{8}{3} \right) - \left( -8 + \frac{8}{3} \right) = \frac{32}{3} \text{ units square}$$

(12) حل  $2x - x^2 = -2x$  ;  $4x - x^2 = 0$

إذا، تقاطع المنحنيات عند  $x = 0$  ،  $x = 4$

$$A = \int_0^4 (4x - x^2) dx = \left[ 2x^2 - \frac{1}{3}x^3 \right]_0^4 = \frac{32}{3} \text{ units square}$$

(13) حل  $7 - 2x^2 = x^2 + 4$  ;  $x^2 = 1$  ، إذا تقاطع المنحنيات عند  $x = \pm 1$

$$A = \int_{-1}^1 [(7 - 2x^2) - (x^2 + 4)] dx = \int_{-1}^1 (-3x^2 + 3) dx = 3 \int_{-1}^1 (1 - x^2) dx$$

$$= 3 \left[ x - \frac{1}{3}x^3 \right]_{-1}^1 = 3 \left[ \frac{2}{3} - \left( -\frac{2}{3} \right) \right] = 4 \text{ units square}$$

### المجموعة B تمارين موضوعية

school-kw.com

في التمارين (1-5)، ظلّل (a) إذا كانت العبارة صحيحة و (b) إذا كانت العبارة خاطئة.

(1) مساحة المنطقة المحددة بمنحنى الدالة  $f$  ومحور السينات

والمستقيمين  $x = a$  ،  $x = b$  هي:  $\int_a^b f(x) dx$

(a) (b)

(2) مساحة المنطقة المحددة بمنحنى الدالة  $f$ :  $f(x) = 4 - x^2$

ومحور السينات في  $[-2, 2]$  هي:  $2 \int_0^2 f(x) dx$

(a) (b)

(3) إذا كانت:  $f(x) \leq 0 \quad \forall x \in [a, b]$  فإن مساحة المنطقة المحددة

بمنحنى الدالة  $f$  ومحور السينات في  $[a, b]$  هي:  $\int_b^a f(x) dx$

(a) (b)

(4) إذا كان منحنى الدالة  $f$ :  $f(x) = x^2 - 2x - 3$  يقطع محور السينات عند  $x = -1$  ،  $x = 3$ .

(a) (b)

فإن مساحة المنطقة المحددة بمنحنى الدالة  $f$  ومحور السينات هي:  $A = \int_{-1}^3 f(x) dx$

(5) مساحة المنطقة المحددة بمنحنى الدالة  $f$ :  $f(x) = |x|$  ومحور السينات.

(a) (b)

في الفترة  $[-2, 2]$  هي: 2 وحدة مساحة



## حجوم الأجسام الدورانية Volumes of Revolution Solids

### المجموعة A تمارين مقالية

في التمارين (1-8)، أوجد حجم الجسم الناتج من دوران المنطقة المستوية دوراً كاملة حول محور السينات والمحددة بكل من المستقيمات والمنحنيات التالية:

(1)  $y_1 = x^2$  ,  $y_2 = 0$  ,  $x = 2$  ,  $x = 0$

$$V = \int_0^2 \pi x^4 dx = \left[ \pi \frac{1}{5} x^5 \right]_0^2 = \frac{32\pi}{5} \text{ units cube}$$

الحجم:

(2)  $y_1 = \frac{1}{x}$  ,  $y_2 = 0$  ,  $x = 1$  ,  $x = 4$

$$V = \pi \int_1^4 \frac{1}{x^2} dx = \pi \left[ -\frac{1}{x} \right]_1^4 = \frac{3\pi}{4} \text{ units cube}$$

الحجم:

## مدرستي

(3)  $y_1 = \sqrt{1-x^2}$  ,  $y_2 = 0$  الكويتية

$$V = \pi \int_{-1}^1 (1-x^2) dx = 2\pi \left[ x - \frac{x^3}{3} \right]_0^1 = \frac{4\pi}{3} \text{ units cube}$$



(4)  $y_1 = x^2 + 1$  ,  $y_2 = x + 3$

(4) نقاط التقاطع عند  $x = -1$  ,  $x = 2$

$$V = \pi \int_{-1}^2 [(x+3)^2 - (x^2+1)^2] dx = \pi \int_{-1}^2 (-x^4 - x^2 + 6x + 8) dx$$

$$= \pi \left[ -\frac{x^5}{5} - \frac{x^3}{3} + 3x^2 + 8x \right]_{-1}^2 = \frac{117\pi}{5} \text{ units cube}$$

(5)  $y_1 = \sec x$  ,  $y_2 = \sqrt{2}$  ,  $-\frac{\pi}{4} \leq x \leq \frac{\pi}{4}$

(5) تمتد المنطقة المظللة من  $x = -\frac{\pi}{4}$  إلى  $x = \frac{\pi}{4}$

$$V = \pi \int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}} (2 - \sec^2 x) dx = \pi [2x - \tan x]_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}} = \pi^2 - 2\pi \text{ units cube}$$

$$(6) \quad y_1 = x + 1, \quad y_2 = x - 1, \quad x = 1, \quad x = 4$$

(6) تمتد المنطقة المظللة من  $x = 1$  إلى  $x = 4$

$$V = \pi \int_1^4 ((x+1)^2 - (x-1)^2) dx = \pi \int_1^4 4x dx = [2\pi x^2]_1^4 = 30\pi \text{ units cube}$$

$$(7) \quad y_1 = x, \quad y_2 = 1, \quad x = 0$$

(7) تمتد المنطقة المظللة من  $x = 0$  إلى  $x = 1$

$$V = \pi \int_0^1 (1 - x^2) dx = \pi \left[ x - \frac{x^3}{3} \right]_0^1 = 2\frac{\pi}{3} \text{ units cube}$$

$$(8) \quad y_1 = \sqrt{x}, \quad y_2 = 0, \quad x = 4$$

(8) تمتد المنطقة المظللة من  $x = 0$  إلى  $x = 4$

$$V = \pi \int_0^4 x dx \Rightarrow V = \pi \left[ \frac{x^2}{2} \right]_0^4 = 8\pi \text{ units cube}$$

school-kw.com

(9) باستخدام التكامل المحدد استنتج الصيغة التي تعطي حجم مخروط دائري قائم ارتفاعه  $h$  (وحدة طول) وطول نصف قطر قاعدته  $r$  (وحدة طول) من دوران منطقة مستوية مستوية دورة كاملة حول محور السينات. (إرشاد: استخدم الدالة  $f : f(x) = \frac{r}{h}x$  في الفترة  $[0, h]$ )

$$(9) \quad V = \pi \int_0^h \left( \frac{r}{h}x \right)^2 dx = \pi \frac{r^2}{h^2} \int_0^h x^2 dx = \pi \frac{r^2}{h^2} \left[ \frac{x^3}{3} \right]_0^h$$

$$V = \pi \frac{r^2}{h^2} \times \frac{h^3}{3} = \frac{1}{3} \pi r^2 h \text{ units cube}$$

## المجموعة B تمارين موضوعية

في التمارين (1-4)، ظلّل (a) إذا كانت العبارة صحيحة و (b) إذا كانت العبارة خاطئة.

(1) حجم المجسم الناتج من دوران دورة كاملة حول محور السينات للمنطقة المحددة بمنحنى

(a) (b)  $V = \pi \int_8^1 (\sqrt[3]{x})^2 dx$  هو: الدالة  $f(x) = \sqrt[3]{x}$  في الفترة  $[1, 8]$

(2) حجم المجسم الناتج من دوران دورة كاملة حول محور السينات للمنطقة المحددة بمنحنى

(a) (b)  $V = \pi \int_0^4 4x dx - \pi \int_0^1 4x dx$  هو: الدالة  $f(x) = 2\sqrt{x}$  في الفترة  $[1, 4]$

(3) حجم المجسم الناتج من دوران دورة كاملة حول محور السينات للمنطقة المحددة بمنحنى

(a) (b)  $V = \pi \int_0^2 (x - \frac{1}{2}x^2) dx$  هو: الدالة  $f(x) = x$  ومنحنى الدالة  $g(x) = \frac{1}{2}x^2$

(4) حجم المجسم الناتج من دوران دورة كاملة حول محور السينات للمنطقة المحددة بمنحنى

(a) (b) الدالة  $f(x) = x^3$  ومنحنى الدالة  $g(x) = 8$  و  $x = 0$  يساوي حجم المجسم الناتج

(a) (b) من دوران دورة كاملة حول محور السينات لمنحنى الدالة  $f$  ومنحنى الدالة  $h: h(x) = -8$ ،  $x = 0$

في التمارين (5-12)، ظلّل رمز الدائرة الدال على الإجابة الصحيحة.

(5) حجم المجسم الناتج من دوران دورة كاملة حول محور السينات للمنطقة المحددة بمنحنى

الدالة  $f: f(x) = 3$  ومحور السينات في الفترة  $[-1, 1]$  بالوحدات المكعبة هو:

(a)  $6\pi$


(b) 18

(c)  $18\pi$

(d)  $81\pi$

30

(6) المنطقة المظللة  $S = S_1 \cup S_2$  حيث  $S_1$  منطقة مثلثة،  $S_2$  منطقة ربع دائرة كما هو موضح بالشكل.



حجم المجسم الناتج من دوران دورة كاملة حول محور السينات للمنطقة  $S$  بالوحدات المكعبة يساوي:

(a)  $\frac{40}{3}\pi$

(b)  $4 + 2\pi$

(c)  $\frac{16}{3}\pi$

(d)  $8\pi$

(7) حجم المجسم الناتج من دوران دورة كاملة حول محور السينات للمنطقة المحددة بمنحنى الدالة

$y = -\sqrt{4-x^2}$  بالوحدات المكعبة هو:

(a)  $4\pi$

(b)  $6\pi$

(c)  $\frac{16}{3}\pi$

(d)  $\frac{32}{3}\pi$

(8) حجم الجسم الناتج من دوران دورة كاملة حول محور السينات للمنطقة المحددة بين منحنى الدالة  $f(x) = \frac{1}{x}$  والمستقيمات  $x=1$  ,  $x=2$  ,  $y=0$  هو،

- (a)  $\pi \text{ units}^3$       (b)  $\frac{\pi}{3} \text{ units}^3$       (c)  $\frac{\pi}{2} \text{ units}^3$       (d)  $\frac{\pi}{4} \text{ units}^3$

(9) حجم الجسم الناتج من دوران دورة كاملة حول محور السينات للمنطقة المحددة بين منحنى الدالة  $f(x) = \sqrt{x+1}$  ومحور السينات والمستقيمين  $x=3$  ,  $x=-1$  بالوحدات المكعبة هو،

- (a)  $8\pi$       (b)  $7\pi$       (c)  $8$       (d)  $\frac{5}{2}\pi$

(10) حجم الجسم الناتج من دوران دورة كاملة حول محور السينات للمنطقة المحددة بالمستقيمتين  $y=-2$  ,  $x=0$  ومنحنى الدالة  $f(x) = -\sqrt{x}$  بالوحدات المكعبة هو،

- (a)  $4\pi$       (b)  $16\pi$       (c)  $8\pi$       (d)  $2\pi$

(11) حجم الجسم الناتج من دوران دورة كاملة حول محور السينات للمنطقة المحددة بين المنحنين

- (a)  $\int_0^4 \left(x - \frac{x^2}{2}\right)^2 dx$       (b)  $\pi \int_0^4 \left(\frac{x^2}{4} - x\right) dx$       (c)  $\int_0^4 \left(x - \frac{x^2}{4}\right) dx$       (d)  $\pi \int_0^4 \left(x - \frac{x^2}{4}\right) dx$

(12) حجم الجسم الناتج من دوران دورة كاملة حول محور السينات للمنطقة المحددة بين منحنى  $y = \sqrt{x}$  ومنحنى  $x = 2y$  هو،

- (a)  $\frac{64\pi}{15} \text{ units}^3$       (b)  $\frac{32\pi}{15} \text{ units}^3$       (c)  $\frac{64\pi}{5} \text{ units}^3$       (d)  $\frac{8\pi}{3} \text{ units}^3$

## طول قوس ومعادلة منحنى دالة

### Arc Length and Equation of Function Curve

#### المجموعة A تمارين مقالية

(1) أوجد طول القوس من منحنى الدالة  $f$ ،  $f(x) = 5 + 2\sqrt{x^3}$  في الفترة  $[0, \frac{1}{3}]$ .

(2) أوجد طول القوس من منحنى الدالة  $f$ ،  $f(x) = \frac{1}{3}(7 + 4x)^{\frac{3}{2}}$  في الفترة  $[1, \frac{5}{4}]$ .

(3) أوجد طول القوس من منحنى الدالة  $f$ ،  $f(x) = \frac{1}{6}x^3 + \frac{1}{2x}$  في الفترة  $[1, 2]$ .

(1)  $f'(x) = 3x^{\frac{1}{2}}$

$$L = \int_0^{\frac{1}{3}} \sqrt{1 + (3x^{\frac{1}{2}})^2} dx = \int_0^{\frac{1}{3}} \sqrt{1 + 9x} dx = \frac{2}{27} [(1 + 9x)^{\frac{3}{2}}]_0^{\frac{1}{3}} = \frac{14}{27} \text{ units}$$

(2)  $f'(x) = 2(7 + 4x)^{\frac{1}{2}}$

$$L = \int_1^{\frac{5}{4}} \sqrt{1 + 4(7 + 4x)} dx = \int_1^{\frac{5}{4}} \sqrt{29 + 16x} dx = \left[ \frac{(29 + 16x)^{\frac{3}{2}}}{24} \right]_1^{\frac{5}{4}}$$

$$L = \frac{343 - 135\sqrt{5}}{24} \approx 1.714 \text{ units}$$

(3)  $f'(x) = \frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{2x^2}$

$$L = \int_1^2 \sqrt{1 + \left(\frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{2x^2}\right)^2} dx = \int_1^2 \sqrt{\left(\frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{2x^2}\right)^2} dx = \int_1^2 \left(\frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{2x^2}\right) dx$$

$$L = \left[ \frac{1}{6}x^3 - \frac{1}{2x} \right]_1^2 = \frac{17}{12} \text{ units}$$

(4) أوجد معادلة منحنى الدالة  $f$  الذي ميله عند أي نقطة عليه  $(x, y)$  هو:  $-x^2 + 2x - 4$  ويمر بالنقطة  $A(3, 7)$

(5) أوجد معادلة منحنى الدالة  $f$  الذي ميله عند أي نقطة عليه  $(x, y)$  هو:  $-4x^3 + 2x + 5$  ويمر بالنقطة  $A(1, 3)$

(6) أوجد معادلة منحنى الدالة  $f$  الذي ميله عند أي نقطة عليه  $(x, y)$  هو:  $\cos 2x$  ويمر بالنقطة  $A\left(\frac{-\pi}{4}, \frac{5}{2}\right)$

(7) أوجد معادلة منحنى الدالة  $f$  الذي ميله عند أي نقطة عليه  $(x, y)$  هو:  $\sin 3x$  ويمر بالنقطة  $A\left(\frac{2\pi}{9}, \frac{7}{6}\right)$

(4)  $f(x) = -\frac{x^3}{3} + x^2 - 4x + 19$

(5)  $f(x) = -x^4 + x^2 + 5x - 2$

(6)  $f(x) = \frac{1}{2}\sin 2x + 3$

(7)  $f(x) = -\frac{1}{3}\cos 3x + 1$

(8) إذا كان ميل العمودي على منحنى الدالة  $f$  عند أي نقطة عليه  $(x, y)$  هو  $2x + 5$  فأوجد معادلة منحنى

الدالة  $f$  إذا كان يمر بالنقطة  $B(-2, 3)$

(9) لتكن:  $f''(x) = 12x^2 - 24x - 1$

أوجد معادلة الدالة  $f$  إذا كان لها نقطة عظمى محلية عند  $A(-\frac{1}{2}, \frac{15}{16})$

(8)  $f(x) = -\frac{1}{2} \ln|2x + 5| + 3$

(9)  $f'(x) = 4x^3 - 12x^2 - x + C_1$

$$f'(-\frac{1}{2}) = 0 \Rightarrow C_1 = 3$$

$$f(x) = x^4 - 4x^3 - \frac{x^2}{2} + 3x + C_2$$

$$f(-\frac{1}{2}) = \frac{15}{16} \Rightarrow C_2 = 2$$

$$\Rightarrow f(x) = x^4 - 4x^3 - \frac{x^2}{2} + 3x + 2$$

مدرستي

المجموعة B أتمارين موضوعية

school-kw.com

في التمارين (1-4)، ظلل (a) إذا كانت العبارة صحيحة و (b) إذا كانت العبارة خاطئة.

(1) طول القوس من منحنى الدالة  $f$ :  $f(x) = \frac{1}{3}(1 + 4x)^{\frac{3}{2}}$  في الفترة  $[0, 1]$

هو  $L = \frac{2}{3}$  وحدة طول.

(2) منحنى الدالة  $f$  الذي ميله عند أي نقطة عليه  $(x, y)$  هو:  $x^3 + 2$  ويمر بالنقطة  $A(2, 6)$

معادلته:  $f(x) = \frac{x^4}{4} + 2x + 2$

(3) منحنى الدالة  $f$  الذي ميله عند أي نقطة عليه  $(x, y)$  هو:  $-\sqrt{x} + x$  ويمر بالنقطة  $A(1, 1)$

معادلته:  $f(x) = -\frac{2}{3}x\sqrt{x} + x^2 + \frac{2}{3}$

(4) لتكن  $A(1, 3)$  نقطة على منحنى الدالة  $f$ :  $f'(x) = 3x^2 - 12x + 9$  فإن

معادلة الدالة  $f$  هي  $f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x - 1$

- (a) (b)  
(a) (b)  
(a) (b)  
(a) (b)

في التمارين (5-9)، ظلّل رمز الدائرة الدال على الإجابة الصحيحة.

(5) طول القوس من منحنى الدالة  $f: f(x) = \frac{1}{3}$  في الفترة  $[-2, 3]$  هو:

- (a) 7 units      (b) 6 units      (c) 5 units      (d) 1 unit

(6) طول القوس من منحنى الدالة  $f: f(x) = x - 3$  في الفترة  $[0, 2]$  هو:

- (a)  $\sqrt{2}$  units      (b)  $2\sqrt{2}$  units      (c)  $3\sqrt{2}$  units      (d)  $\frac{\sqrt{2}}{2}$  units

(7) معادلة منحنى الدالة الذي ميل العمودي عليه عند أي نقطة  $(x, y)$  هو:  $-x + 3$  ويمر بالنقطة  $A(2, 3)$  هي  $y$  تساوي:

- (a)  $-\frac{x^2}{2} + 3x - 4$       (b)  $\ln|3 - x| + 3$       (c)  $-\frac{x^2}{2} + 3x + 4$       (d)  $3 - \ln|3 - x|$

(8) معادلة منحنى الدالة الذي ميله عند أي نقطة  $(x, y)$  هو:  $2x - 3\sqrt{x}$  ويمر بالنقطة  $A(4, -2)$  هي:

- (a)  $x^2 + 2\sqrt{x^3} - 2$       (b)  $x^2 - 2\sqrt{x^3}$       (c)  $x^2 - 2\sqrt{x^3} - 2$       (d)  $\frac{x^2}{2} - 2\sqrt{x^3} + 2$

(9) إذا كانت النقطة  $A(0, 2)$  نقطة حرجة لمنحنى الدالة  $f: f''(x) = 12x - 6$  فإن النقطة الحرجة الأخرى للدالة  $f$  هي:

- (a)  $B(-2, 0)$       (b)  $B(0, -2)$       (c)  $B(1, -1)$       (d)  $B(1, 1)$

## المعادلات التفاضلية Differential Equation

### المجموعة A تمارين مقالية

(1) أثبت أن الدالة:  $y = 3e^x$  هي حل للمعادلة التفاضلية  $y'' - y' + 2x = 2x$

(2) أثبت أن الدالة:  $y = e^x$  هي حل للمعادلة التفاضلية  $y + y'' = 2e^x$

$$(1) y' = y'' = 3e^x \Rightarrow 3e^x - 3e^x + 2x = 2x \Rightarrow 2x = 2x$$

إذا الدالة  $y = 3e^x$  هي حل للمعادلة التفاضلية  $y'' - y' + 2x = 2x$

$$(2) y' = y'' = e^x \Rightarrow e^x + e^x = 2e^x$$

إذا الدالة  $y = e^x$  هي حل للمعادلة التفاضلية  $y + y'' = 2e^x$

$$xy' = 1 - x^2 \quad (4)$$

$$(4) y' = \frac{1}{x} - x$$

$$\therefore y = \ln|x| - \frac{x^2}{2} + C$$

$$y' = 3y \quad (6)$$

$$(6) y(x) = ke^{3x}$$

$$(3) y' = x^2 + x + 2 \quad \text{التي تحقق } y = 4 \text{ عند } x = 1$$

$$(3) y = \int (x^2 + x + 2) dx = \frac{x^3}{3} + \frac{x^2}{2} + 2x + C$$

$$y(1) = 4$$

$$\therefore C = \frac{7}{6}$$

$$\therefore y = \frac{x^3}{3} + \frac{x^2}{2} + 2x + \frac{7}{6}$$

$$(5) xy' = 4y \quad \text{التي تحقق } y = 1 \text{ عند } x = 1$$

$$(5) y = 4 \ln|x| + C$$

$$\therefore C = 1$$

$$\therefore y = 4 \ln|x| + 1$$

$$x=0 \text{ عند } y=\sqrt{2} \text{ التي تحقق } \sqrt{2}y'+y=0 \text{ (9)}$$

$$(9) \quad y = ke^{-\frac{1}{\sqrt{2}}x}$$
$$y(0) = \sqrt{2}$$
$$\therefore k = \sqrt{2}$$

$$x=2 \text{ عند } y=4 \text{ التي تحقق } 2y'-5y=0 \text{ (8)}$$

$$(8) \quad y = ke^{\frac{5}{2}x}$$
$$\therefore k = 4e^{-5}$$
$$\therefore y = 4e^{\frac{5}{2}x-5}$$

$$y' = 5y \text{ (7)}$$

$$(7) \quad y = ke^{5x}$$

$$x=0 \text{ عند } y=2 \text{ التي تحقق } 2y'+y=4 \text{ (12)}$$

$$(12) \quad y = ke^{-\frac{1}{2}x} + 4$$
$$y(0) = 2$$
$$\therefore k = -2$$
$$\therefore y = -2e^{-\frac{1}{2}x} + 4$$

$$x=\frac{1}{4} \text{ عند } y=\frac{3}{4} \text{ التي تحقق } \frac{1}{2}y'+4y=1 \text{ (11)}$$

$$(11) \quad y = ke^{-8x} + \frac{1}{4}$$
$$ke^{-8x} + \frac{1}{4}$$
$$k = \frac{e^2}{2}$$
$$\therefore y = \frac{1}{2}e^{2-8x} + \frac{1}{4}$$

$$y' = y + 1 \text{ (10)}$$

$$(10) \quad y = ke^x - 1$$

$$2y'' + y' - 15y = 0 \text{ (15)}$$

$$y = C_1e^{\frac{3}{2}x} + C_2e^{-3x}$$

$$y'' = 6x - 8 \text{ (14)}$$

$$y' = 3x^2 - 8x + C_1$$

$$y = x^3 - 4x^2 + C_1x + C_2$$

$$y'' = -4 \sin 4x \text{ (13)}$$

$$y' = \cos 4x + C_1$$

$$y = \frac{1}{4} \sin 4x + C_1x + C_2$$

$$y'' - 2y' + y = 0 \text{ (18)}$$

$$y = (C_1x + C_2)e^x$$

$$y'' + 9y = 0 \text{ (17)}$$

$$y = C_1 \cos 3x + C_2 \sin 3x$$

$$y'' - 6y' + 9y = 0 \text{ (16)}$$

$$y = (C_1 + C_2x)e^{3x}$$

$$y' + 2y = 0 \text{ حل المعادلة التفاضلية؛ (a) (20)}$$

$$x=0 \text{ عند } y=\frac{1}{2} \text{ يحقق الذي (b) أوجد الحل الذي يحقق}$$

$$2y'' + 4y' = -3y \text{ (19)}$$

$$(20) \text{ (a) } y = ke^{-2x}$$

$$(b) \quad k = \frac{1}{2} \quad \therefore y = \frac{1}{2}e^{-2x}$$

$$(19) \quad y = e^{-x} \left( C_1 \cos \frac{\sqrt{2}}{2}x + C_2 \sin \frac{\sqrt{2}}{2}x \right)$$

## المجموعة B تمارين موضوعية

في التمارين (1-7)، ظلّل (a) إذا كانت العبارة صحيحة و (b) إذا كانت العبارة خاطئة.

- (1) المعادلة التفاضلية التالية:  $x^2y'' + (y')^2 + y = 0$  من الرتبة الثالثة والدرجة الأولى. (a) (b)
- (2) المعادلة التفاضلية التالية:  $(y')^2 + 2xy = 0$  من الرتبة الثانية والدرجة الأولى. (a) (b)
- (3) إذا كان  $y = \frac{1}{2}$  عند  $x = 0$  و  $y' + 2y = 0$  فإن  $y = \frac{1}{4}e^{-2x} + \frac{1}{4}$  (a) (b)
- (4) إذا كان  $y = 1$  عند  $x = 0$  و  $y' + y = 2$  فإن  $y = 2e^{-x}$  (a) (b)
- (5) إذا كان  $y'' + 2y' + 2y = 0$  فإن  $y = (c_1 \cos x + c_2 \sin x)e^{-x}$  (a) (b)
- (6) إذا كان  $y'' + y = 0$  فإن  $y = c_1 \cos x + c_2 \sin x$  (a) (b)
- (7) إذا كان  $y'' - y = 0$  فإن  $y = c_1 e^x + c_2 e^{-x}$  (a) (b)

في التمارين (8-14)، ظلّل رمز الدائرة الدال على الإجابة الصحيحة.

- (8) المعادلة التفاضلية التالية:  $\frac{(2y'' + x)^2}{xy} = 3$  من: (a) الرتبة الأولى والدرجة الثانية. (b) الرتبة الثانية والدرجة الأولى. (c) الرتبة الثانية والدرجة الثانية. (d) الرتبة الأولى والدرجة الأولى.

(9) حل المعادلة التفاضلية  $\frac{dy}{dx} = 2x$  الذي يحقق  $y = -2$  عندما  $x = 1$  هو:

- (a)  $y = x^2 + 3$  (b)  $y = x^2 - 3$   
 (c)  $y = \frac{x^2}{2} - 3$  (d)  $y = \frac{x^2}{2} + 3$

(10) إذا كان  $y'' = 2x^2 + 3x$  فإن:

- (a)  $y = \frac{2x^3}{3} + \frac{3x^2}{2} + c$  (b)  $y = \frac{2x^3}{3} + \frac{3x^2}{2}$   
 (c)  $y = \frac{1}{6}x^4 + \frac{1}{2}x^3 + c_1x + c_2$  (d)  $y = \frac{1}{6}x^4 + \frac{1}{2}x^3 + c_1x$

(11) حل المعادلة التفاضلية  $2y' + y = 1$  الذي يحقق  $y = 3$  عند  $x = 5$  هو:

- (a)  $y = 2e^{\frac{x}{2}}$  (b)  $y = \frac{2}{e^{\frac{x}{2}}}$   
 (c)  $y = 2e^{(-\frac{1}{2}x + \frac{5}{2})} + 1$  (d)  $y = 2e^{(-\frac{1}{2}x - \frac{5}{2})} + 1$

(12) إذا كان  $y'' - 3y' + 2y = 0$  فإن:

- (a)  $y = c_1 e^x + c_2 e^{-2x}$  (b)  $y = c_1 e^{-x} + c_2 e^{2x}$   
 (c)  $y = c_1 e^{-x} + c_2 e^{-2x}$  (d)  $y = c_1 e^x + c_2 e^{2x}$

(13) إذا كان  $y'' + 2y' + y = 0$  فإن:

- (a)  $y = (c_1x + c_2)e^{-x}$  (b)  $y = (c_1x + c_2)e^x$   
 (c)  $y = (c_1x + c_2)e^{2x}$  (d)  $y = (c_1x + c_2)e^{-2x}$

(14) إذا كان  $y''' - 4y' + 13y = 0$  فإن:

- (a)  $y = e^x(c_1 \cos 3x + c_2 \sin 3x)$  (b)  $y = e^{-2x}(c_1 \cos 2x + c_2 \sin 2x)$   
 (c)  $y = e^{-x}(c_1 \cos 3x + c_2 \sin 3x)$  (d)  $y = e^{2x}(c_1 \cos 3x + c_2 \sin 3x)$

## اختبار الوحدة السادسة

(1) أوجد مساحة المنطقة المحددة بمنحنى الدالة  $f: f(x) = x^2 - 4x + 3$ ، محور السينات في الفترة  $[0, 1]$ .

(1) تمتد المنطقة المظللة من  $x = 0$  إلى  $x = 1$ .

$$A = \int_0^1 (x^2 - 4x + 3) dx = \left[ \frac{x^3}{3} - 2x^2 + 3x \right]_0^1 = \frac{4}{3} \text{ units square}$$

(2) أوجد مساحة المنطقة المحددة بمنحنى الدالة  $f: f(x) = x^2 - 6x + 5$ ، محور السينات في الفترة  $[1, 5]$ .

(2) تمتد المنطقة المظللة من  $x = 1$  إلى  $x = 5$ .

$$A = \int_1^5 (-x^2 + 6x - 5) dx = \left[ -\frac{x^3}{3} + 3x^2 - 5x \right]_1^5 = \frac{32}{3} \text{ units square}$$

(3) أوجد مساحة المنطقة المحددة بمنحنى الدالة  $f: f(x) = x^3 - 4x$ ، محور السينات في الفترة  $[-2, 2]$ .

$$(3) A = \int_{-2}^0 (x^3 - 4x) dx + \left| \int_0^2 (x^3 - 4x) dx \right| = \left[ \frac{x^4}{4} - 2x^2 \right]_{-2}^0 - \left[ \frac{x^4}{4} - 2x^2 \right]_0^2 = 4 + 4 = 8 \text{ units square}$$

(4) أوجد مساحة المنطقة المحددة بمنحنى الدالة  $f: f(x) = x^2 + 1$  ومنحنى الدالة  $g: g(x) = \sqrt{x}$  في الفترة  $[1, 2]$ .

$$(4) A = \int_1^2 (x^2 + 1 - \sqrt{x}) dx = \left[ \frac{x^3}{3} + x - \frac{2}{3}x\sqrt{x} \right]_1^2 = 4 - \frac{4}{3}\sqrt{2} \text{ units square}$$

(5) أوجد مساحة المنطقة المحددة بمنحنى الدالة  $f: f(x) = x^3 + 1$  ومنحنى الدالة  $g: g(x) = x + 1$ .

(5) يتقاطع المنحنيات عند النقط:  $x = -1$ ،  $x = 0$  و  $x = 1$ .

$$A = \int_{-1}^0 (x^3 + 1 - x - 1) dx + \int_0^1 (x + 1 - x^3 - 1) dx = \left[ \frac{x^4}{4} - \frac{x^2}{2} \right]_{-1}^0 + \left[ \frac{x^2}{2} - \frac{x^4}{4} \right]_0^1 = \frac{1}{2} \text{ units square}$$

(6) أوجد حجم الجسم الناتج من دورة كاملة حول محور السينات للمنطقة المحددة بمنحنى

الدالة  $f: f(x) = \frac{1}{2}x^2$  والمستقيم  $y = 2$  في الفترة  $[-2, 2]$ .

(6) يتقاطع المنحنيات عند  $x = -2$  و  $x = 2$ .

$$V = \pi \int_{-2}^2 \left( 4 - \frac{1}{4}x^4 \right) dx = \pi \left[ 4x - \frac{1}{20}x^5 \right]_{-2}^2 = \frac{64}{5}\pi \text{ units cube}$$

(7) أوجد حجم المجسم الناتج من دورة كاملة حول محور السينات للمنطقة المحددة بمنحنى الدالة  $f: f(x) = x + 2$  والدالة  $g: g(x) = -x + 3$  في الفترة  $[-1, 2]$ .

(7) تمتد المنطقة المظللة من  $x = -1$  إلى  $x = 2$  ويتقاطعا عند النقطة  $x = \frac{1}{2}$ .

$$V = \pi \int_{-1}^{\frac{1}{2}} [(-x+3)^2 - (x+2)^2] dx + \pi \int_{\frac{1}{2}}^2 [(x+2)^2 - (-x+3)^2] dx = \int_{-1}^{\frac{1}{2}} (5-10x) dx + \int_{\frac{1}{2}}^2 (-5+10x) dx$$

$$= [5x - 5x^2]_{-1}^{\frac{1}{2}} + [-5x + 5x^2]_{\frac{1}{2}}^2 = \frac{135}{4} \pi \text{ units cube}$$

(8) أوجد حجم المجسم الناتج من دورة كاملة حول محور السينات للمنطقة المحددة بمنحنى الدالة  $f: f(x) = -x^2 + 4$  والدالة  $g: g(x) = x + 2$  في الفترة  $[-2, 1]$ .

$$(8) V = \pi \int_{-2}^1 [(-x^2+4)^2 - (x+2)^2] dx = \pi \int_{-2}^1 (x^4 - 9x^2 - 4x + 12) dx$$

$$V = \pi \left[ \frac{x^5}{5} - 3x^3 - 2x^2 + 12x \right]_{-2}^1 = \frac{108}{5} \pi \text{ units cube}$$

(9) أوجد طول القوس من منحنى الدالة  $f: f(x) = 2 + \frac{1}{3}x^{\frac{3}{2}}$  في الفترة  $[0, 12]$ .

$$(9) f'(x) = \frac{1}{2}x^{\frac{1}{2}}$$

$$L = \int_0^{12} \sqrt{1 + \frac{1}{4}x} dx = \frac{8}{3} \left[ \left(1 + \frac{1}{4}x\right)^{\frac{3}{2}} \right]_0^{12} = \frac{56}{3} \text{ units}$$

(10) أوجد طول القوس من منحنى الدالة  $f: f(x) = 2 - \sqrt{3}x$  في الفترة  $[-3, 1]$ .

$$(10) f'(x) = -\sqrt{3}$$

$$L = \int_{-3}^1 \sqrt{1+3} dx = \int_{-3}^1 2 dx = 8 \text{ units}$$

(11) أوجد طول القوس من منحنى الدالة  $f: f(x) = \frac{1}{3}(-1+2x)^{\frac{3}{2}}$  في الفترة  $[2, 8]$ .

$$(11) f'(x) = (-1+2x)^{\frac{1}{2}}$$

$$L = \int_2^8 \sqrt{1+(-1+2x)} dx = \int_2^8 \sqrt{2x} dx = \frac{56}{3} \text{ units}$$

(12) أوجد معادلة منحنى الدالة الذي ميله عند أي نقطة  $(x, y)$  هو:  $3x^2 - 2x + 1$  ويمر بالنقطة  $A(-1, -5)$ .

$$(12) f'(x) = 3x^2 - 2x + 1 \quad \therefore f(x) = x^3 - x^2 + x + C$$

يمر بالنقطة  $A(-1, -5) \therefore C = -2$

(13) أوجد معادلة منحنى الدالة إذا كان ميل العمودي عند أي نقطة  $(x, y)$  على هذا المنحنى هو:  $3x - 2$  ويمر بالنقطة  $(1, -1)$ .

$$(13) f'(x) = \frac{-1}{3x-2} \quad \therefore f(x) = -\frac{1}{3} \ln|3x-2| + C$$

يمر بالنقطة  $A(1, -1)$   $\therefore C = -1$

$$\therefore f(x) = -\frac{1}{3} \ln|3x-2| - 1$$

(14) لتكن:  $f''(x) = 12x^2 - 4$ ، أوجد معادلة الدالة  $f$  إذا كان لها نقطة صغرى محلية عند  $A(-1, 3)$

(14)  $A(-1, 3)$  نقطة صغرى محلية إذا:

$$f'(-1) = 0$$

$$f'(x) = 4x^3 - 4x + C_1 \quad \therefore C_1 = 0$$

$$f(x) = x^4 - 2x^2 + C_2$$

$$C_2 = 4$$

$$\therefore f(x) = x^4 - 2x^2 + 4$$

منحنى  $f$  يمرّ بالنقطة  $A(-1, 3)$  إذا:

مدرستي  
الكويتية  
school-kw.com

في التمارين (15-20)، حلّ المعادلات التفاضلية التالية:

$$(15) 3y' + 5y = 2$$

$$(16) 3xy' = 5y$$

$$(17) y'' - 7y' + 12y = 0$$

$$(18) y'' - 6y' + 9y = 0$$

$$(19) y'' + 4y' + 20y = 0$$

$$(20) y'' + 16y = 0$$

$$(15) y = ke^{-\frac{5}{3}x} + \frac{2}{5}$$

$$(16) y = k|x|^{\frac{5}{3}}$$

$$(17) y = C_1 e^{3x} + C_2 e^{4x}$$



$$(18) y = (C_1 + C_2 x)e^{3x}$$

$$(19) y = e^{-2x}(C_1 \cos 4x + C_2 \sin 4x)$$

$$(20) y = C_1 \cos 4x + C_2 \sin 4x$$

## تمارين إثرائية

في التمارين (1-3)، أوجد مساحة المنطقة المظللة تحليليًا (جبريًا):




$$(1) \quad A = \int_0^{\pi} (1 - \cos^2 x) dx = \int_0^{\pi} \sin^2 x dx = \left[ \frac{1}{2}x - \frac{1}{4}\sin 2x \right]_0^{\pi} = \frac{\pi}{2} \text{ units square} \quad \sin^2 x = \frac{1 - \cos 2x}{2}$$

(2) استخدم التناظر:

$$2 \int_0^2 [2x^2 - (x^4 - 2x^2)] dx = 2 \int_0^2 (-x^4 + 4x^2) dx = 2 \left[ -\frac{1}{5}x^5 + \frac{4}{3}x^3 \right]_0^2 = 2 \left[ \left( -\frac{32}{5} + \frac{32}{3} \right) - 0 \right]$$

$$= \frac{128}{15} \text{ units square}$$

school - k w . c o m



(3) استخدم التناظر:

$$2 \int_0^1 (x^2 + 2x^4) dx = 2 \left[ \frac{1}{3}x^3 + \frac{2}{5}x^5 \right]_0^1 = 2 \left( \frac{1}{3} + \frac{2}{5} \right) = \frac{22}{15} \text{ units square}$$

(4) أوجد مساحة المنطقة المحددة بين منحنى الدالة:  $y = 2x^2 + 8$  ومنحنى الدالة:  $y = x^4$ .

$$(4) A = \int_{-2}^2 (8 + 2x^2 - x^4) dx = \frac{448}{15} \approx 32.5\bar{3} \text{ units square}$$

(5) أوجد مساحة المنطقة المحددة بين منحنى الدالة:  $y = 2x - 15$  ومنحنى الدالة:  $y = -x^2 + 4x$ .



$$(5) A(x) = \int_{-3}^5 (15 + 2x - x^2) dx = \frac{256}{3} \text{ units square}$$

(6) أوجد مساحة المنطقة المحددة بالمنحنيين  $f(x) = \frac{1}{x^2}$ ،  $g(x) = x$  والمستقيم  $x = 2$  ومحور السينات.

(6) يتقاطع منحنيا  $f(x) = \frac{1}{x^2}$ ،  $g(x) = x$  عند  $x = 1$  ومنه تكون:

$$A = \int_0^1 x dx + \int_1^2 \frac{1}{x^2} dx = \left[ \frac{1}{2}x^2 \right]_0^1 + \left[ -\frac{1}{x} \right]_1^2 = \frac{1}{2} + \left[ -\frac{1}{2} - (-1) \right] = 1 \text{ units square}$$

في التمرينين (7-8)، أوجد حجم الجسم الناتج من دورة كاملة للمنطقة المظللة حول محور السينات.



$$(7) V = \pi \int_0^2 \left( \frac{2-x}{2} \right)^2 dx = \frac{\pi}{4} \left( -\frac{1}{3} \right) [(2-x)^3]_0^2 = \frac{2\pi}{3} \text{ units cube}$$

$$(8) V = \pi \int_0^{\frac{\pi}{2}} (\sin^2 \cos^2 x) dx$$

$$= \frac{\pi}{4} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2(2x) dx$$

$$= \frac{\pi}{8} \int_0^{\frac{\pi}{2}} (1 - \cos 4x) dx$$

$$= \frac{\pi}{8} \left[ x - \frac{1}{4} \sin 4x \right]_0^{\frac{\pi}{2}}$$

$$= \frac{\pi^2}{16} \text{ units cube}$$

(9) أوجد معادلة منحنى الدالة  $f$  الذي ميله عند أي نقطة  $x$  هو:  $\sin 3x$  ويمر بالنقطة  $A\left(\frac{\pi}{3}, \frac{4}{3}\right)$

$$(9) f(x) = -\frac{1}{3}\cos 3x + C$$

$$\frac{4}{3} = -\frac{1}{3}\cos 3 \times \frac{\pi}{3} + C$$

$$\therefore C = 1$$

$$f(x) = -\frac{1}{3}\cos 3x + 1$$

(10) أوجد طول القوس من منحنى الدالة  $f: f(x) = \frac{1}{2}\sqrt{x^3}$  في الفترة  $[0, 27]$

$$(10) f'(x) = \frac{3}{4}x^{\frac{1}{2}}$$

$$L = \int_0^{27} \sqrt{1 + \frac{9}{16}x} dx = \frac{32}{27} \left[ \frac{259}{64} \sqrt{259} - 1 \right] \approx 76 \text{ units}$$

في التمارين (11-13)، حل المعادلات التفاضلية التالية:

$$(11) 2y' + 3y = 4$$

$$(12) y'' + y = 0$$

$$(13) y'' - y = 0$$

مدرستي  
الكويتية  
s c h o o l - k w . c o m



$$(11) y(x) = Ae^{-\frac{3}{2}x} + \frac{4}{3}$$

$$(12) y(x) = A \sin(x) + B \cos(x)$$

$$(13) y(x) = Ae^x + Be^{-x}$$

- (14) نتيجة لحادث نووي، تبين أن الجزيئات المشعة  $y(t)$  في الزمن  $t$  (بالساعات) بواسطة عداد جيجر (Geiger) تعطى بالمعادلة التفاضلية:  $(E): y' = a(y - 2)$ ، حيث  $a$  ثابت موجب.
- (a) أوجد الحل العام للمعادلة  $(E)$ .
- (b) أوجد حل  $(E)$  الذي يحقق  $y(0) = 170$ .
- (c) إذا علمنا أن  $y(6) = 9$  فما قيمة الثابت  $a$ ؟

(14) (a)  $y = ke^{ax} + 2$

(b)  $k = 168 \therefore y = 168e^{ax} + 2$

(c)  $7 = 168e^{6a} \implies a = -\frac{\ln 24}{6}$

- (15) إذا كانت النقطة  $A(3, -2)$  نقطة حرجة لمنحنى الدالة  $f$ :  $f''(x) = 6x - 6$  فأوجد معادلة الدالة  $f$ .

(15)  $f'(x) = 3x^2 - 6x + C_1$

$f'(3) = 0 \therefore C_1 = -9$

$f(x) = x^3 - 3x^2 - 9x + C_2$

$f(3) = -2 \therefore C_2 = 25$

$\therefore f(x) = x^3 - 3x^2 - 9x + 25$

$A(3, -2)$  نقطة حرجة لمنحنى الدالة  $f$  إذاً:

$A(3, -2)$  هي نقطة على منحنى الدالة  $f$  إذاً:

مدرستي  
الكويتية



www.kuwaiti-study.com

## القطوع المخروطية – القطع المكافئ Conic Sections – Parabola

### المجموعة A تمارين مقالية

في التمارين (1-3)، أوجد معادلة القطع المكافئ، الذي:

(1) رأسه نقطة الأصل والبؤرة  $(-3, 0)$

(2) رأسه نقطة الأصل والبؤرة  $(0, -2)$

(3) بؤرته  $F(0, 2)$  ومعادلة دليبه  $y = -2$

(1)  $y^2 = -12x$

(2)  $x^2 = -8y$

(3)  $x^2 = 8y$

في التمارين (4-7)، أوجد البؤرة، والدليل، وخط تماثل القطع المكافئ. ارسم تخطيطاً للرسم البياني للقطع المكافئ.

(4)  $x^2 = -y$

(5)  $y^2 = 2x$

(6)  $y = 4x^2$



(7)  $x = -8y^2$

(4) البؤرة  $(0, -\frac{1}{4})$

الدليل:  $x = -\frac{1}{2}$   
خط التماثل محور السينات

(5) البؤرة  $(\frac{1}{2}, 0)$

الدليل:  $y = \frac{1}{4}$   
خط التماثل محور الصادات



(6) البؤرة  $(\frac{1}{16}, 0)$



الدليل:  $x = \frac{1}{32}$

خط التماثل محور السينات

(7) البؤرة  $(0, \frac{1}{16})$

الدليل:  $y = -\frac{1}{16}$

خط التماثل محور الصادات



(8) أوجد معادلة القطع المكافئ الذي رأسه نقطة الأصل ويمر بالنقطة  $A(-1, 2)$  وخط تماثله  $x$ -axis.

$$(8) \text{ معادلة القطع المكافئ هي: } y^2 = 4px$$

وبالتعويض عن  $(x, y)$  بإحداثيات  $A$  نحصل على:

$$(2^2) = 4p(-1)$$

$$4 = -4p$$

$$p = -1$$

المعادلة:

$$y^2 = -4x$$

(9) أوجد معادلة القطع المكافئ الذي رأسه نقطة الأصل ويمر بالنقطتين  $A(-3, 4)$  ,  $B(3, 4)$ .

(9) النقطتان  $A(-3, 4)$  ,  $B(3, 4)$  متمائلتان في محور الصادات

$$\text{معادلة القطع المكافئ هي: } x^2 = 4py$$

وبالتعويض عن  $(x, y)$  بإحداثيات  $A$  (أو بإحداثيات  $B$ ) نحصل على:

$$(-3)^2 = 4p(4)$$

$$9 = 16p \Rightarrow p = \frac{9}{16}$$

$$x^2 = 4 \times \frac{9}{16}y$$

$$x^2 = \frac{9}{4}y$$

مدرستي  
المعادلة:

الكويتية

school-kw.com

(10) أوجد معادلة القطع المكافئ الذي رأسه نقطة الأصل ومعادلة دليله  $y = 4$ .


$$(10) \text{ البؤرة } (0 ; -4) \text{ إذا المعادلة هي: } x^2 = -16y$$

(11) أوجد معادلة القطع المكافئ الذي رأسه نقطة الأصل ومعادلة دليله  $x = -5$ .

$$(11) \text{ البؤرة } (5 ; 0) \text{ إذا المعادلة هي: } y^2 = 20x$$

(12) الميكروفونات المتكافئة. تستخدم القنوات الرياضية ميكروفوناً مكافئاً لالتقاط كل أصوات لاعبي كرة السلة والمدربين أثناء المباريات. إذا كان لأحد هذه الميكروفونات سطح مكافئ متولد بالقطع المكافئ  $10y = x^2$  فحدد موضع البؤرة (المستقبل الإلكتروني) للقطع المكافئ.

$$(12) \text{ } x^2 = 10y \text{ إذا البؤرة } \left(0, \frac{5}{2}\right) \text{ } p = \frac{10}{4} = \frac{5}{2}$$



(13) يصل سلك معدني متدلٍ بين رأسي عمودي جسر. السلك المعدني هو على صورة قطع مكافئ حيث يبعد العمودان عن بعضهما مسافة 100 m ويبلغ ارتفاع كل منهما 20 m. يبلغ أصغر ارتفاع للسلك عن الطريق العام 5 m، وضعت على الطريق دعامة للسلك المتدلي، أوجد طول الدعامة التي تبعد 8 m عن أي من العمودين.

(13) معادلة القطع المكافئ هي على الصورة:  $x^2 = 4py$

لنأخذ النقطة  $A(50, 15)$  وبالتعويض عن  $(x, y)$  بإحداثيات  $A$  نحصل على:

$$(50)^2 = 4p(15)$$

$$2500 = 60p$$

$$p = \frac{125}{3}$$

المعادلة:

$$x^2 = \frac{500}{3}y$$

الإحداثي السيني للدعامة:  $50 - 8 = 42$   
 بالتعويض في المعادلة نوجد  $y$ ،  $y = \frac{500}{3}(42)$  ومنه  $y \approx 10.6$   
 طول الدعامة يكون:  $10.6 + 5 \approx 15.6$  m

### المجموعة B تمارين موضوعية

في التمارين (1-7)، ظلّل (a) إذا كانت العبارة صحيحة، و (b) إذا كانت العبارة خاطئة.

(a)

(b)

(1) معادلة القطع المكافئ الذي رأسه  $(0, 0)$  وبؤرته  $(0, 2)$  هي:  $x^2 = 8y$

(a)

(b)

(2) معادلة القطع المكافئ الذي رأسه  $(0, 0)$  ودليله  $x = -2$  هي:  $x^2 = 8y$

(a)

(b)

(3) معادلة القطع المكافئ الذي بؤرته  $(-4, 0)$  ودليله  $x = 4$  هي:  $y^2 = -16x$

(a)

(b)

(4)  $y^2 = \frac{1}{2}x$  هي معادلة قطع مكافئ، بؤرته  $(0, \frac{-3}{2})$

في التمارين (5-7)، معادلة القطع المكافئ هي:  $y^2 = -\frac{1}{6}x$

(5) بؤرة القطع المكافئ هي:  $(-\frac{1}{24}, 0)$

(6) معادلة الدليل هي:  $y = \frac{1}{24}$

(7) خط التماثل هو محور السينات.

- (a) (b)  
(a) (b)  
(a) (b)

في التمارين (8-15)، ظلل رمز الدائرة الدال على الإجابة الصحيحة.

(8) المعادلة التي تمثل قطعاً مكافئاً رأسه  $(0, 0)$  وبؤرته  $(-5, 0)$  هي:

- (a)  $x^2 = 20y$  (b)  $y^2 = 20x$  (c)  $x^2 = -20y$  (d)  $y^2 = -20x$

(9) المعادلة التي تمثل قطع مكافئ مفتوح إلى الأسفل هي:

- (a)  $y^2 = -\frac{1}{2}x$  (b)  $y^2 = \frac{1}{2}x$  (c)  $x^2 = -\frac{1}{2}y$  (d)  $x^2 = \frac{1}{2}y$

(10) النقطة المشتركة بين كل القطوع المكافئة التي هي على الصورة  $x^2 = 4py$  هي:

- (a) (1,1) (b) (1,0) (c) (0,1) (d) (0,0)


(11) المعادلة التي تمثل قطعاً مكافئاً رأسه  $(0, 0)$  ويمر بالنقطتين  $A(-5, -2)$ ,  $B(-5, 2)$  هي:

- (a)  $y^2 = -\frac{4}{5}x$  (b)  $x^2 = -\frac{4}{5}y$  (c)  $y^2 = \frac{4}{5}x$  (d)  $x^2 = \frac{4}{5}y$

(12) المعادلة التي تمثل قطعاً مكافئاً رأسه  $(0, 0)$  ويمر بالنقطة  $C(-5, -6)$  وخط تماثله  $y$ -axis هي:


- (a)  $y^2 = -\frac{25}{6}x$  (b)  $x^2 = -\frac{25}{6}y$  (c)  $y^2 = -\frac{6}{25}x$  (d)  $x^2 = -\frac{6}{25}y$

school - kw . com




(13) بؤرة القطع المكافئ في الشكل المقابل هي:

- (a)  $(0, -\frac{4}{3})$  (b)  $(\frac{9}{20}, 0)$   
(c)  $(0, \frac{1}{12})$  (d)  $(\frac{1}{12}, 0)$



(14) معادلة دليل القطع المكافئ في الشكل المقابل هي:





- (a)  $y = \frac{4}{3}$  (b)  $y = \frac{9}{20}$   
(c)  $y = -\frac{1}{12}$  (d)  $y = -\frac{4}{3}$



(15) معادلة القطع المكافئ للبيان التالي هي:

- (a)  $x^2 = -\frac{25}{3}y$  (b)  $y^2 = \frac{9}{5}x$   
(c)  $x^2 = \frac{25}{3}y$  (d)  $y^2 = \frac{5}{9}x$

في التمارين (16–18)، لديك قائمتان. اختر من القائمة (2) ما يناسب كل تمرين في القائمة (1) لتصل بيان كل دالة بمعادلتها.

القائمة (2)	القائمة (1)
<p>a</p> 	<p>c</p> $x^2 = 3y \quad (16)$
<p>b</p> 	<p>b</p> $x^2 = -4y \quad (17)$
<p>c</p> 	<p>d</p> $y^2 = 5x \quad (18)$
<p>d</p> 	

## القطع الناقص

## Ellipse

## المجموعة A تمارين مقالية

في التمارين (1-4)، لكل معادلة من معادلات القطع الناقص التالية أوجد: رأسي القطع - طرفي المحور الأصغر - البؤرتين - معادلتا دليلي القطع - طول كل من المحورين، ثم ارسم شكلاً تقريبياً لكل قطع.

$$(1) \frac{x^2}{8^2} + \frac{y^2}{6^2} = 1$$

$$(2) \frac{x^2}{4^2} + \frac{y^2}{6^2} = 1$$

$$(1) \frac{x^2}{8^2} + \frac{y^2}{6^2} = 1$$

$$a^2 = 8^2 \Rightarrow a = 8$$

رأسا القطع:  $A_1(-8, 0), A_2(8, 0)$


$$b^2 = 6^2 \Rightarrow b = 6$$

النقطتان الطرفيتان للمحور الأصغر:  $B_1(0, -6), B_2(0, 6)$

$$a^2 = b^2 + c^2 \Rightarrow c^2 = a^2 - b^2$$

$$c^2 = 8^2 - 6^2 = 28 \Rightarrow c = 2\sqrt{7}$$

البؤرتان:  $F_1(-2\sqrt{7}, 0), F_2(2\sqrt{7}, 0)$



$$x = \frac{a^2}{c} = \frac{64}{2\sqrt{7}} = \frac{32\sqrt{7}}{7}, \quad x = -\frac{a^2}{c} = \frac{-64}{2\sqrt{7}} = \frac{-32\sqrt{7}}{7}$$

معادلتا دليلي القطع الناقص:  $2a = 2 \times 8 = 16$  طول المحور الأكبر:

$2b = 2 \times 6 = 12$  طول المحور الأصغر:

$$(2) \frac{x^2}{4^2} + \frac{y^2}{6^2} = 1$$

$$(2) \frac{x^2}{4^2} + \frac{y^2}{6^2} = 1$$

$$a^2 = 6^2 \Rightarrow a = 6$$

رأسا القطع:  $A_1(0, -6), A_2(0, 6)$


$$b^2 = 4^2 \Rightarrow b = 4$$

النقطتان الطرفيتان للمحور الأصغر:  $B_1(-4, 0), B_2(4, 0)$

$$a^2 = b^2 + c^2 \Rightarrow c^2 = a^2 - b^2$$

$$c^2 = 6^2 - 4^2 = 20 \Rightarrow c = 2\sqrt{5}$$

البورتان:  $F_1(0, -2\sqrt{5}), F_2(0, 2\sqrt{5})$



$$y = \frac{a^2}{c} = \frac{36}{2\sqrt{5}} = \frac{18\sqrt{5}}{5}$$

$$y = -\frac{a^2}{c} = \frac{-36}{2\sqrt{5}} = \frac{-18\sqrt{5}}{5}$$

معادلتنا دليلي القطع الناقص،

طول المحور الأكبر:  $2a = 12$

طول المحور الأصغر:  $2b = 8$

مدرستي  
الكويتية

$$(3) 3x^2 + 5y^2 - 225 = 0$$

$$(3) 3x^2 + 5y^2 - 225 = 0$$

$$\frac{3x^2}{225} + \frac{5y^2}{225} = \frac{225}{225}$$

$$\frac{x^2}{75} + \frac{y^2}{45} = 1$$

$$a^2 = 75 \Rightarrow a = 5\sqrt{3}$$

رأسا القطع:  $A_1(5\sqrt{3}, 0), A_2(-5\sqrt{3}, 0)$

$$b^2 = 45 \Rightarrow b = 3\sqrt{5}$$

النقطتان الطرفيتان للمحور الأصغر:  $B_1(0, -3\sqrt{5}), B_2(0, 3\sqrt{5})$

$$a^2 = b^2 + c^2 \Rightarrow c^2 = a^2 - b^2$$

$$c^2 = 75 - 45 = 30 \Rightarrow c = \sqrt{30}$$


البورتان:  $F_1(-\sqrt{30}, 0), F_2(\sqrt{30}, 0)$

$$x = \frac{a^2}{c} = \frac{75}{\sqrt{30}} = \frac{5\sqrt{30}}{2}$$

$$x = -\frac{a^2}{c} = \frac{-75}{\sqrt{30}} = \frac{-5\sqrt{30}}{2}$$

طول المحور الأكبر:  $2a = 10\sqrt{3}$

طول المحور الأصغر:  $2b = 6\sqrt{5}$



$$(4) 4x^2 + y^2 - 28 = 0$$

$$(4) 4x^2 + y^2 - 28 = 0$$

$$\frac{4x^2}{28} + \frac{y^2}{28} = \frac{28}{28}$$

$$\frac{x^2}{7} + \frac{y^2}{28} = 1 \quad \text{معادلة القطع الناقص؛}$$

$$a^2 = 28 \implies a = 2\sqrt{7}$$


$$A_1(0, -2\sqrt{7}), A_2(0, 2\sqrt{7}) \quad \text{رأسا القطع؛}$$

$$B_1(-\sqrt{7}, 0), B_2(\sqrt{7}, 0) \quad \text{النقطتان الطرفيتان للمحور الأصغر؛}$$

$$a^2 = b^2 + c^2 \implies c^2 = a^2 - b^2$$

$$c^2 = 28 - 7 = 21 \implies c = \sqrt{21}$$

$$F_1(0, -\sqrt{21}), F_2(0, \sqrt{21}) \quad \text{البؤرتان؛}$$



معادلتنا دليلى القطع الناقص؛

$$y = \frac{a^2}{c} = \frac{28}{\sqrt{21}} = \frac{28\sqrt{21}}{21} = \frac{4}{3}\sqrt{21} \quad y = -\frac{a^2}{c} = \frac{-28}{\sqrt{21}} = \frac{-28\sqrt{21}}{21} = \frac{-4}{3}\sqrt{21}$$

$$2a = 4\sqrt{7} \quad \text{طول المحور الأكبر؛}$$

$$2b = 2\sqrt{7} \quad \text{طول المحور الأصغر؛}$$

في التمارين (5-12)، اكتب معادلة القطع الناقص الذي فيه:

(5) البؤرتان  $F_1(-2, 0)$ ،  $F_2(2, 0)$ ، ونقطتا طرفي المحور الأصغر  $B_1(0, -3)$ ،  $B_2(0, 3)$ .

$$(5) c = 2, b = 3$$

$$a^2 = b^2 + c^2 = 3^2 + 2^2 = 13$$

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \quad \therefore \quad \frac{x^2}{13} + \frac{y^2}{9} = 1$$

(6)  $V_1F_1 + V_1F_2 = 10$ ، حيث إن  $V_1$  هو نقطة على القطع الناقص،  $F_1$  و  $F_2$  هما البؤرتين، علماً أن  $F_1(3, 0)$ ،  $F_2(-3, 0)$

$$(6) 2a = 10 \implies a = 5 ; c = 3$$

$$b^2 = a^2 - c^2 = 25 - 9 = 16 \implies b = 4$$

$$\therefore \frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{16} = 1$$

(7) نقطتا طرفي المحور الأكبر هما  $A_1(0, -5)$  ,  $A_2(0, 5)$  ، طول المحور الأصغر 4.

$$(7) a = 5 , 2b = 4 \implies b = 2$$

$$\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{4} = 1 \text{ فتكون معادلة القطع الناقص.}$$

(8) نقطتا طرفي المحور الأصغر  $B_1(0, -4)$  ,  $B_2(0, 4)$  ، طول المحور الأكبر 10.

$$(8) b = 4$$

$$2a = 10 \implies a = 5$$

$$\frac{x^2}{5^2} + \frac{y^2}{4^2} = 1 \implies \frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{16} = 1$$

(9) مركزه نقطة الأصل وإحدى بؤرتيه  $F(5, 0)$  ويمر بالنقطة  $C(2, 3)$ .

$$(9) c = 5$$

$$a^2 = b^2 + 5^2 \implies a^2 = b^2 + 25$$

$$\frac{2^2}{a^2} + \frac{3^2}{b^2} = 1$$

$$\implies a^2 b^2 = 4b^2 + 9a^2 \implies (b^2 + 25)b^2 = 4b^2 + 9(b^2 + 25) \implies b^4 + 25b^2 = 4b^2 + 9b^2 + 225$$

$$\implies b^4 + 12b^2 - 225 = 0 \implies b^2 = -6 + 3\sqrt{29}$$

$$\implies a^2 = 19 + 3\sqrt{29}$$

$$\frac{x^2}{(19 + 3\sqrt{29})} + \frac{y^2}{(-6 + 3\sqrt{29})} = 1$$

(10) محوره الأكبر نقطتاه الطرفيتان  $A_1(-6, 0)$  ,  $A_2(6, 0)$  ومحوره الأصغر إحدى نقطتيه الطرفيتين  $B_1(0, -4)$ .

$$(10) a = 6 ; b = 4$$

$$\frac{x^2}{36} + \frac{y^2}{16} = 1 \text{ معادلة القطع الناقص.}$$

(11) بؤرتاه  $F_1(5, 0)$  ,  $F_2(-5, 0)$  وطول محوره الأصغر 6.

$$(11) c = 5 ; 2b = 6 \implies b = \frac{6}{2} = 3$$

$$a^2 = c^2 + b^2 \implies a^2 = 5^2 + 3^2 = 25 + 9 = 34$$

$$\frac{x^2}{34} + \frac{y^2}{9} = 1$$

(12) طول المحور الأكبر الذي ينطبق على محور السينات 10 والمسافة بين البؤرتين 6 ومركزه نقطة الأصل.

$$(12) 2a = 10 \implies a = 5 ; 2c = 6 \implies c = \frac{6}{2} = 3$$

$$b^2 = a^2 - c^2 = 25 - 9 = 16$$

$$\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{16} = 1$$

## المجموعة B تمارين موضوعية

في التمارين (1-5)، ظلّل (a) إذا كانت العبارة صحيحة، و (b) إذا كانت العبارة خاطئة.

- (1) رأسي القطع للقطع الناقص الذي معادلته:  $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{5} = 1$  هما:  $(9, 0)$ ،  $(-9, 0)$  (a) (b)
- (2) النقطة  $(\sqrt{33}, 0)$  هي إحدى بؤرتي القطع الناقص الذي معادلته:  $\frac{x^2}{7^2} + \frac{y^2}{4^2} = 1$  (a) (b)
- (3) طول المحور الأكبر للقطع الناقص الذي معادلته  $25x^2 + 9y^2 = 225$  يساوي 10 units (a) (b)
- (4) بؤرتا القطع الناقص الذي معادلته:  $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{25} = 1$  هما  $(\pm 3, 0)$  (a) (b)
- (5) في القطع الناقص الذي معادلته:  $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{36} = 1$ ، طول المحور الأصغر يساوي 8 (a) (b)

في التمارين (6-12)، ظلّل رمز الدائرة الدال على الإجابة الصحيحة.

(6) النقطتان الطرفيتان للمحور الأصغر للقطع الناقص الذي معادلته  $4x^2 + 9y^2 = 36$  هما:

- (a)  $(\pm 2, 0)$  (b)  $(\pm 3, 0)$   
 (c)  $(0, \pm 2)$  (d)  $(0, \pm 3)$

(7) معادلة القطع الناقص الذي بؤرتاه  $(\pm 7, 0)$  والنقطتان الطرفيتان لمحوره الأصغر  $(0, \pm 6)$  هي:

- (a)  $\frac{x^2}{85} + \frac{y^2}{36} = 1$  (b)  $\frac{x^2}{36} + \frac{y^2}{85} = 1$   
 (c)  $\frac{x^2}{49} + \frac{y^2}{36} = 1$  (d)  $\frac{x^2}{85} + \frac{y^2}{49} = 1$





(8) معادلة القطع الناقص الذي بؤرتاه على محور السينات ومركزه نقطة الأصل وطول محوره الأكبر 9 units وطول محوره الأصغر 4 units هي:

- (a)  $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} = 1$  (b)  $\frac{x^2}{20.25} + \frac{y^2}{4} = 1$   
 (c)  $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1$  (d)  $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{20.25} = 1$

(9) النقطة  $A(-10, 0)$  تنتمي إلى القطع الناقص الذي معادلته  $\frac{x^2}{100} + \frac{y^2}{64} = 1$ . مجموع المسافتين  $AF_1 + AF_2$  حيث  $F_1, F_2$  هما البؤرتان يساوي:

- (a) 10 units (b) 12 units  
 (c) 14 units (d) 20 units

في التمارين (13-15)، لديك قائمتان. اختر من القائمة (2) ما يناسب كل تمرين في القائمة (1) لتصل بيان كل قطع ناقص بمعادلته.

القائمة (2)	القائمة (1)
<p>a</p> 	<p>b <math>\frac{x^2}{16} + y^2 = 1</math> (13)</p>
<p>b</p> 	<p>c <math>x^2 + \frac{y^2}{9} = 1</math> (14)</p>
<p>c</p> 	<p>d <math>\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{16} = 1</math> (15)</p>
<p>d</p> 	

## القطع الزائد Hyperbola

### المجموعة A تمارين مقالية


في التمرينين (1-2)، لكل معادلة من معادلات القطع الزائد التالية أوجد: رأسى القطع - البؤرتين - معادلة كل من الخطين المقاربتين - معادلة كل من الدليلين - طول كل من المحورين، ثم ارسم شكلاً تخطيطياً للقطع الزائد.

$$(1) \frac{y^2}{25} - \frac{x^2}{16} = 1$$

البؤرتان:  $F_1(0, \sqrt{41})$ ,  $F_2(0, -\sqrt{41})$

معادلتا الخطين المقاربتين:  $y = \pm \frac{a}{b}x = \pm \frac{5}{4}x$

معادلتا الدليلين:  $y = \pm \frac{a^2}{c} = \pm \frac{25\sqrt{41}}{41}$



طول المحور الأكبر:  $2a = 4 \times 5 = 10$

طول المحور المرافق:  $2b = 2 \times 4 = 8$

$$(2) 24x^2 - 12y^2 - 192 = 0$$

$$(2) 24x^2 - 12y^2 - 192 = 0$$

$$\frac{24x^2}{192} - \frac{12y^2}{192} = \frac{192}{192}$$

$$\frac{x^2}{8} - \frac{y^2}{16} = 1$$

$$a^2 = 8 \Rightarrow a = \sqrt{8} = 2\sqrt{2}$$

رأسا القطع:  $A_1(2\sqrt{2}, 0)$ ,  $A_2(-2\sqrt{2}, 0)$


$$b^2 = 16 \Rightarrow b = 4$$

$$c^2 = a^2 + b^2 = 8 + 16 = 24 \Rightarrow c = 2\sqrt{6}$$

البؤرتان:  $F_1(2\sqrt{6}, 0)$ ,  $F_2(-2\sqrt{6}, 0)$

معادلتا الخطين المقاربتين:  $y = \pm \frac{b}{a}x = \pm \frac{4x}{2\sqrt{2}} = \pm \sqrt{2}x$

معادلتا الدليلين:  $x = \pm \frac{a^2}{c} = \pm \frac{8}{2\sqrt{6}} = \pm \frac{2\sqrt{6}}{3}$



طول المحور الأكبر:  $2a = 4\sqrt{2}$

طول المحور المرافق:  $2b = 2 \times 4 = 8$

(3) أوجد معادلة القطع الزائد الذي إحدى بؤرتيه  $F_1(-5,0)$  ورأساه  $A_1(-3,0)$  ,  $A_2(3,0)$  ثم أوجد معادلة كل من خطيه المقاربتين وارسم شكلاً تقريبياً له.


(3)  $c = 5$  ,  $a = 3$

$$c^2 = a^2 + b^2 = b^2 = c^2 - a^2$$

$$b^2 = 25 - 9 = 16 \Rightarrow b = 4$$

$$\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{16} = 1 \quad \text{معادلة القطع الزائد}$$

$$y = \pm \frac{b}{a}x = \pm \frac{4x}{3} \quad \text{معادلتا الخططين المقاربتين}$$



(4) أوجد معادلة القطع الزائد الذي مركزه  $(0, 0)$  وإحدى بؤرتيه  $F_1(0, -\sqrt{5})$  ومعادلة أحد خطيه المقاربتين  $y = 2x$ .

(4)  $\frac{a}{b} = 2 \Rightarrow a = 2b$

$$c = \sqrt{5}$$

$$c^2 = a^2 + b^2 \Rightarrow (2b^2) + b^2 = 5 \Rightarrow 5b^2 = 5$$

$$\Rightarrow b^2 = 1 \Rightarrow b = 1$$

$$\therefore a = 2$$

$$\Rightarrow \frac{y^2}{4} - \frac{x^2}{1} = 1, \frac{y^2}{4} - x^2 = 1 \quad \text{معادلة القطع الزائد}$$

(5) أوجد معادلة القطع الزائد الذي مركزه نقطة الأصل وإحدى رأسيه  $A_2(\frac{2}{3}, 0)$  ويمر بالنقطة  $(1,1)$ .

(5)  $a = \frac{2}{3}$

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 \Rightarrow \frac{x^2}{\frac{4}{9}} - \frac{y^2}{b^2} = 1$$

$$\frac{1}{4} - \frac{1}{b^2} = 1 \Rightarrow b^2 = \frac{4}{5}$$

$$\Rightarrow \frac{x^2}{\frac{4}{9}} - \frac{y^2}{\frac{4}{5}} = 1 \quad \text{معادلة القطع الزائد}$$

لنضع إحداثيات النقطة  $(1, 1)$  في المعادلة:

(6) أوجد معادلة القطع الزائد الذي مركزه نقطة الأصل ويمر بالنقطتين  $A(2,1)$  ,  $B(4,3)$  ومحوره الأساسي جزء من محور السينات.

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 \quad \text{المعادلة هي، جزء من محور السينات فالمعادلة هي،}$$

لنضع إحداثيات  $A$  في المعادلة،

$$\frac{4}{a^2} - \frac{1}{b^2} = 1$$

$$\frac{4}{a^2} = \frac{1}{b^2} + 1 \Rightarrow \frac{1}{a^2} = \frac{1}{4b^2} + \frac{1}{4}$$

لنضع إحداثيات  $B$  في المعادلة،

$$\frac{16}{a^2} - \frac{9}{b^2} = 1$$

بالتعويض نوجد المعادلة التالية،

$$16\left(\frac{1}{4b^2} + \frac{1}{4}\right) - \frac{9}{b^2} = 1$$

$$4 + \frac{4}{b^2} - \frac{9}{b^2} = 1 \Rightarrow \frac{5}{b^2} = 3 \Rightarrow b^2 = \frac{5}{3}$$

$$\frac{4}{a^2} - \frac{1}{\frac{5}{3}} = 1 \Rightarrow \frac{4}{a^2} = \frac{8}{5} \Rightarrow a^2 = \frac{5}{2}$$

$$\frac{x^2}{\frac{5}{2}} - \frac{y^2}{\frac{5}{3}} = 1 \quad \text{المعادلة هي،}$$

(7) سمع صوت طلق ناري عند النقطة  $A(150, 0)$  وبعده بثانيتين سمع الصوت نفسه عند النقطة  $B(-150, 0)$ . أثبت أن مجموعة النقاط  $P(x, y)$  التي يمكن أن تكون مصدراً للصوت تمثل قطعاً زائداً، ثم أوجد معادلته علمًا بأن سرعة الصوت في الهواء  $50 \text{ units/s}$

school - kw . com


(7) نستخدم قاعدة المسافة بدلالة الزمن والسرعة،

$$d = vt \Leftrightarrow t = \frac{d}{v}$$

$$t_1 = \frac{PA}{50}$$

$$t_2 = \frac{PB}{50}$$

$$t_1 - t_2 = \frac{PA}{50} - \frac{PB}{50}$$



$$t_1 - t_2 = 2 \quad \text{ولكن،}$$

$$2 = \frac{PA}{50} - \frac{PB}{50} \Rightarrow PA - PB = 100$$

بما أن  $A, B$  نقطتان ثابتتان فيكون منحنى النقاط المتغيرة  $P$  هي قطع زائد بؤرتاه هما  $A, B$  حيث،  $2a = 100$

$$c = 150, a = 50$$

$$b^2 = (150)^2 - (50)^2 = 20000$$

$$\frac{x^2}{2500} - \frac{y^2}{20000} = 1 \quad \text{معادلة القطع الزائد،}$$

## المجموعة B تمارين موضوعية

في التمارين (1-4)، ظلّل (a) إذا كانت العبارة صحيحة، و (b) إذا كانت العبارة خاطئة.

- (1)  $x^2 - y^2 = 4$  هي معادلة قطع زائد. (a)  (b)
- (2) الخطّان المقاربان للقطع الزائد الذي معادلته  $x^2 - y^2 = 12$  هما متعامدان. (a)  (b)
- (3) إحداثيات بؤرتي القطع الزائد الذي معادلته  $\frac{y^2}{9} - \frac{x^2}{18} = 1$  هما:  $(0, 3)$  ,  $(0, -3)$ . (a)  (b)
- (4) نقطتا طرفي المحور المرافق للقطع الزائد الذي معادلته  $\frac{x^2}{25} - y^2 = 1$  هما:  $B_1(1, 0)$  ,  $B_2(-1, 0)$ . (a)  (b)

في التمارين (5-11)، ظلّل رمز الدائرة الدال على الإجابة الصحيحة.

(5) معادلة القطع الزائد الذي بؤرتاه  $(0, \pm 3)$  وطول محوره القاطع 4 هي:

- (a)  $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{5} = 1$  (b)  $\frac{y^2}{5} - \frac{x^2}{4} = 1$
- (c)  $\frac{y^2}{4} - \frac{x^2}{5} = 1$  (d)  $\frac{x^2}{5} - \frac{y^2}{4} = 1$

(6) إذا كانت معادلة القطع الزائد  $\frac{x^2}{5} - \frac{y^2}{3} = 1$ ؛ فيمّر أحد الخطين المقاربين له في النقطة:

- (a)  $(2, 2\sqrt{\frac{3}{5}})$  (b)  $(\sqrt{\frac{5}{3}}, 2)$
- (c)  $(2\sqrt{\frac{3}{5}}, 2)$  (d)  $(\sqrt{\frac{5}{3}}, 2\sqrt{\frac{3}{5}})$

(7) معادلة القطع الزائد الذي نقطتي تقاطعه مع المحور السيني هما  $(\pm 6, 0)$  هي:

- (a)  $y^2 - x^2 = 36$  (b)  $\frac{y^2}{36} - \frac{x^2}{49} = 1$
- (c)  $\frac{x^2}{25} - \frac{y^2}{36} = 1$  (d)  $\frac{x^2}{36} - \frac{y^2}{4} = 1$

(8) البعد بين بؤرتي القطع الزائد الذي معادلته:  $50y^2 - 25x^2 - 100 = 0$  بوحدة الطول يساوي:

- (a)  $\sqrt{6}$  (b)  $2\sqrt{6}$
- (c) 6 (d)  $2\sqrt{2}$

(9) منحنى أي معادلة مما يلي لا يقطع المحور الصادي في  $(0, \pm 4)$ :

- (a)  $y^2 - x^2 = 16$  (b)  $4y^2 - 16x^2 = 64$
- (c)  $\frac{x^2}{25} - \frac{y^2}{16} = 1$  (d)  $\frac{y^2}{16} - \frac{x^2}{9} = 1$

(10) نقطتا تقاطع القطع الزائد الذي معادلته:  $\frac{x^2}{25} - \frac{y^2}{49} = 1$  مع محور السينات هما:

(a)  $(\pm 7, 0)$

(b)  $(\pm 5, 0)$

(c)  $(0, \pm 5)$

(d) ليس أيًّا مما سبق

(11) معادلتا الخطين المقاربتين للقطع الزائد:  $\frac{x^2}{8} - \frac{y^2}{32} = 2$  هما:





(a)  $y = \pm 2x$

(b)  $y = \pm \frac{1}{2}x$

(c)  $y = \pm 4x$

(d)  $y = \pm \frac{1}{4}x$

في التمارين (12-14)، لديك قائمتان. اختر من القائمة (2) ما يناسب كل تمرين في القائمة (1) لتصل بيان كل قطع زائد بمعادلته.

القائمة (2)	القائمة (1)
<p>(a) </p>	<p>(c) <math>\frac{x^2}{25} - \frac{y^2}{16} = 1</math> (12)</p>
<p>(b) </p>	<p>(a) <math>3y^2 - x^2 = 2</math> (13)</p>
<p>(c) </p>	<p>(d) <math>\frac{1}{2}x^2 - y^2 - 2 = 0</math> (14)</p>
<p>(d) </p>	

## الاختلاف المركزي Eccentricity

### المجموعة A تمارين مقالية

في التمارين (1-4)، حدّد نوع القطع في كل ممّا يلي، ثم أوجد معادلته.

(1) اختلافه المركزي  $e = \frac{3}{2}$  وإحدى بؤرتيه  $F(0, 3)$

$$(1) e = \frac{3}{2}, \frac{3}{2} > 1$$

إذاً القطع المخروطي هو قطع زائد.

$$c = 3, e = \frac{c}{a} \Rightarrow \frac{3}{a} = \frac{3}{2} \Rightarrow a = 2$$

ولكن في القطع الزائد،

$$c^2 = a^2 + b^2 \Rightarrow b^2 = 9 - 4$$

$$b^2 = 5$$

مدرستي

$$\frac{y^2}{5} - \frac{x^2}{4} = 1$$

معادلة القطع الزائد هي:

الكويتية

(2) اختلافه المركزي  $e = \frac{\sqrt{7}}{4}$  وإحدى بؤرتيه  $F(0, -\sqrt{7})$

school-kw.com

$$(2) e = \frac{\sqrt{7}}{4}, \frac{\sqrt{7}}{4} < 1$$

إذاً القطع المخروطي هو قطع ناقص

$$c = \sqrt{7}, e = \frac{c}{a} \Rightarrow \frac{\sqrt{7}}{4} = \frac{\sqrt{7}}{a} \Rightarrow a = 4$$

$$a^2 = b^2 + c^2 \Rightarrow b^2 = a^2 - c^2$$

$$b^2 = 16 - 7 \Rightarrow b^2 = 9$$

$$\frac{y^2}{16} + \frac{x^2}{9} = 1$$

معادلة القطع الناقص هي:

(4) اختلافه المركزي  $e = \frac{3}{4}$  ومعادلة دليبه  $x = 8$

$$(4) e = \frac{3}{4}, \frac{3}{4} < 1$$

إذا القطع المخروطي هو قطع ناقص

$$8 = \frac{a^2}{c} \Rightarrow c = \frac{a^2}{8} \quad \text{معادلة الدليل}$$

$$\frac{3}{4} = \frac{c}{a} = \frac{\frac{a^2}{8}}{a} \Rightarrow \frac{3}{4} = \frac{a}{8} \Rightarrow a = 6$$

$$c = e \cdot a = \frac{3}{4} \times 6 = \frac{9}{2}$$

$$a^2 = b^2 + c^2 \Rightarrow b^2 = a^2 - c^2 \quad \text{في القطع الناقص}$$

$$b^2 = 36 - \frac{81}{4} = \frac{63}{4}$$

$$\frac{x^2}{36} + \frac{y^2}{\frac{63}{4}} = 1 \quad \text{المعادلة هي}$$

$$(6) 4y^2 - 9x^2 = 36$$

$$(6) 4y^2 - 9x^2 = 36$$

$$\frac{y^2}{a^2} - \frac{x^2}{b^2} = 1 \quad \text{الصورة على الصورة } \frac{y^2}{9} - \frac{x^2}{4} = 1$$

$$a^2 = 9 \Rightarrow a = 3 \quad \text{بالمقارنة}$$

$$b^2 = 4 \Rightarrow b = 2$$

$$c^2 = a^2 + b^2 = 9 + 4 = 13 \Rightarrow c = \sqrt{13}$$

$$e = \frac{c}{a} = \frac{\sqrt{13}}{3} > 1$$

$$(8) \frac{y^2}{16} - \frac{x^2}{4} = 1 \quad \text{المعادلة}$$

$$(8) a^2 = 16 \Rightarrow a = 4$$

$$b^2 = 4 \Rightarrow b = 2$$

$$A_1(0, -4), A_2(0, 4) \quad \text{الرأسان}$$

$$c^2 = a^2 + b^2 = 16 + 4 = 20 \Rightarrow c = 2\sqrt{5}$$

$$F_1(0, -2\sqrt{5}), F_2(0, 2\sqrt{5}) \quad \text{البؤرتان}$$

$$e = \frac{c}{a} = \frac{2\sqrt{5}}{4} = \frac{\sqrt{5}}{2}$$

$$y = \pm \frac{a^2}{c} = \pm \frac{16}{2\sqrt{5}} = \pm \frac{8\sqrt{5}}{5} \quad \text{معادلتنا الدليلين}$$

(3) اختلافه المركزي  $e = \frac{5}{3}$  وأحد رأسيه  $A(-4, 0)$

$$(3) e = \frac{5}{3}, \frac{5}{3} > 1$$

إذا القطع المخروطي هو قطع زائد

$$a = 4, e = \frac{c}{a}$$

$$\frac{c}{4} = \frac{5}{3} \Rightarrow c = \frac{5 \times 4}{3} = \frac{20}{3}$$

$$c^2 = a^2 + b^2 \Rightarrow b^2 = c^2 - a^2 \quad \text{في القطع الزائد}$$

$$b^2 = \frac{400}{9} - 16 = \frac{256}{9}$$

$$\frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{\frac{256}{9}} = 1 \quad \text{المعادلة هي}$$

في التمرينين (5-6)، أوجد الاختلاف المركزي لكل قطع ممّا يلي حيث معادلته:

$$(5) \frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1$$

$$(5) (a^2 = 9, b^2 = 4) \Rightarrow (a = 3, b = 2)$$

$$a^2 = b^2 + c^2 \quad \text{في القطع الناقص}$$

$$c^2 = 9 - 4 = 5 \Rightarrow c = \sqrt{5}$$

$$e = \frac{c}{a} = \frac{\sqrt{5}}{3} \quad \text{الاختلاف المركزي للقطع الناقص}$$

في التمرينين (7-8)، أوجد الرأسين والبؤرتين والاختلاف المركزي ومعادلتنا الدليلين للقطع الزائد.

$$(7) \frac{x^2}{7} - \frac{y^2}{16} = 1 \quad \text{المعادلة}$$

$$(7) a^2 = 7 \Rightarrow a = \sqrt{7}$$

$$b^2 = 16 \Rightarrow b = 4$$

$$A_1(-\sqrt{7}, 0), A_2(\sqrt{7}, 0) \quad \text{الرأسان}$$

$$c^2 = a^2 + b^2 = 7 + 16 \Rightarrow c = \sqrt{23}$$

$$F_1(-\sqrt{23}, 0), F_2(\sqrt{23}, 0) \quad \text{البؤرتان}$$

$$e = \frac{c}{a} = \frac{\sqrt{23}}{\sqrt{7}} = \frac{\sqrt{161}}{7} \quad \text{الاختلاف المركزي}$$


$$x = \pm \frac{a^2}{c} = \pm \frac{7}{\sqrt{23}} = \pm \frac{7\sqrt{23}}{23} \quad \text{معادلتنا الدليلين}$$

(9) مسار الأرض حول الشمس هو قطع ناقص، حيث تقع الشمس عند إحدى بؤرتيه. إذا كان طول المحور الأكبر للقطع 300 000 km واختلافه المركزي  $e = 0.017$ . فأوجد أكبر وأصغر بُعد للأرض عن الشمس.

$$(9) 2a = 3000000 \Rightarrow a = 150000$$

$$e = \frac{c}{a} \Rightarrow c = e \cdot a = 0.017 \times 150000 = 2550$$

$$c = 2550$$



$$F_2 A_2 = 150000 - 2550 = 147450 \text{ km}$$

أصغر بعد للأرض عن الشمس هو:  $F_2 A_2$  فيكون:

$$F_2 A_1 = 150000 + 2550 = 152550 \text{ km}$$

أكبر بعد للأرض عن الشمس هو:  $F_2 A_1$  فيكون:

## المجموعة B تمارين موضوعية

في التمرين (1-7)، ظلّل (a) إذا كانت العبارة صحيحة و (b) إذا كانت العبارة خاطئة.

school-kw.com

(a) (b)

(1) إذا كانت  $e < 1$ ، فإن القطع هو قطع ناقص.

(a) (b)

(2) إذا  $a = 6$ ،  $b = 9$  في القطع الزائد فإن  $c = 3\sqrt{13}$

(a) (b)

(3) معادلتا المقاربتين للقطع الزائد  $\frac{x^2}{36} - \frac{y^2}{9} = 1$  هما:  $y = \frac{1}{2}x$ ،  $y = -\frac{1}{2}x$

(4) إذا كانت معادلة القطع الناقص هي:  $\frac{x^2}{49} + \frac{y^2}{9} = 1$ ، فإن طول محوره الأكبر هو 6 وطول محوره الأصغر هو 14.

(a) (b)

(5) لأي معادلة قطع مكافئ فإن  $e = 1$

(a) (b)

(6) المحور القاطع للقطع الزائد  $\frac{y^2}{15} - \frac{x^2}{10} = 1$  ينطبق على محور الصادات.

(a) (b)

(7) رأسا القطع الناقص الذي معادلته:  $\frac{x^2}{36} + \frac{y^2}{25} = 1$  هما:  $(0, 6)$ ،  $(0, -6)$

(a) (b)

في التمارين (8-13)، ظلّل رمز الدائرة الدال على الإجابة الصحيحة.

(8) إذا كانت  $a = 7$ ،  $c = 2\sqrt{10}$ ، فإن معادلة القطع المخروطي الناتج هي:

(a)  $\frac{x^2}{49} - \frac{y^2}{9} = 1$

(b)  $\frac{x^2}{49} + \frac{y^2}{9} = 1$

(c)  $\frac{x^2}{7} + \frac{y^2}{3} = 1$

(d)  $\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{49} = 1$

(9) أيّ معادلة مما يلي تمثل قطعاً زائداً معادلة أحد دليليه  $y = \frac{25}{7}$ ؟

(a)  $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{24} = 1$

(b)  $\frac{x^2}{24} - \frac{y^2}{25} = 1$

(c)  $\frac{y^2}{25} - \frac{x^2}{24} = 1$

(d)  $\frac{y^2}{25} + \frac{x^2}{24} = 1$

(10) إذا كانت معادلة أحد المقاربيين  $y = \frac{-7}{5}x$  والاختلاف المركزي  $e = \frac{\sqrt{74}}{5}$  فمعادلة القطع الزائد هي:

(a)  $\frac{y^2}{7} - \frac{x^2}{5} = 1$

(b)  $\frac{x^2}{7} - \frac{y^2}{5} = 1$

(c)  $\frac{x^2}{49} - \frac{y^2}{25} = 1$

(d)  $\frac{x^2}{25} - \frac{y^2}{49} = 1$

مدرستي

(11) الاختلاف المركزي للمعادلة  $\frac{x^2}{36} + \frac{y^2}{25} = 1$  هو:

(a)  $\frac{\sqrt{11}}{6}$

(b)  $\frac{\sqrt{11}}{5}$

(c)  $\frac{36}{25}$

(d)  $\frac{25}{36}$

(12) معادلة قطع ناقص إحدى بؤرتيه (0, 4) وأحد رأسيه (0, -5) هي:

(a)  $\frac{y^2}{9} + \frac{x^2}{25} = 1$

(b)  $\frac{y^2}{4} + \frac{x^2}{5} = 1$

(c)  $\frac{y^2}{25} + \frac{x^2}{9} = 1$

(d)  $\frac{y^2}{5} + \frac{x^2}{3} = 1$

(13) لأيّ قطع ناقص يكون:





(a)  $a > c$

(b)  $a < c$

(c)  $a = ec$

(d)  $a = c$

في الصارين (14-16)، لديك قائمتان. اختر من القائمة (2) ما يناسب كل تعبير في القائمة (1) لتصل بيان كل قطع مخروطي بمعادله.

القائمة (2)	القائمة (1)
<p>a</p> 	<p>b</p> $\frac{x^2}{25} - \frac{y^2}{16} = 1 \quad (14)$
<p>b</p> 	<p>d</p> $\frac{y^2}{36} + \frac{x^2}{9} = 1 \quad (15)$
<p>c</p> 	<p>a</p> $\frac{x^2}{36} + \frac{y^2}{9} = 1 \quad (16)$
<p>d</p> 	

## اختبار الوحدة السابعة

في التمارين (1-4)، حدّد نوع القطع المخروطي، ثم اكتب معادلته بالصورة العامة، وحدّد البؤرتين والمركز.

$$(1) 4y^2 - 9x^2 - 36 = 0$$

$$4y^2 - 9x^2 = 36 \Rightarrow \frac{y^2}{9} - \frac{x^2}{4} = 1$$

إذاً هي معادلة قطع زائد مركزه نقطة الأصل.

$$a^2 = 9, b^2 = 4$$

$$\Rightarrow c^2 = 13 \Rightarrow c = \sqrt{13}$$

البؤرتان:  $F_1(0, -\sqrt{13}), F_2(0, \sqrt{13})$

$$(2) -2x^2 + 3y^2 + 10 = 0$$

$$-2x^2 + 3y^2 + 10 = 0 \Rightarrow -2x^2 + 3y^2 = -10 \Rightarrow 2x^2 - 3y^2 = 10$$

$$\frac{x^2}{5} - \frac{y^2}{\frac{10}{3}} = 1$$

إذاً هي معادلة قطع زائد مركزه نقطة الأصل.

$$a^2 = 5, b^2 = \frac{10}{3}$$

$$\Rightarrow c^2 = \frac{25}{3} \Rightarrow c = \frac{5\sqrt{3}}{3}$$

البؤرتان:  $F_1\left(-\frac{5\sqrt{3}}{3}, 0\right), F_2\left(\frac{5\sqrt{3}}{3}, 0\right)$

$$(3) 2x^2 + y^2 = 9$$

$$2x^2 + y^2 = 9$$

$$\frac{x^2}{\frac{9}{2}} + \frac{y^2}{9} = 1$$

$$a^2 = \frac{9}{2}, b^2 = 9$$

$$c^2 = 9 - \frac{9}{2}$$

$$c^2 = \frac{9}{2}$$

البؤرتان:  $F_1\left(0, -\frac{3\sqrt{2}}{2}\right), F_2\left(0, \frac{3\sqrt{2}}{2}\right)$

$$(4) 2x^2 - y^2 + 6 = 0$$

$$2x^2 - y^2 + 6 = 0 \Rightarrow 2x^2 - y^2 = -6 \Rightarrow y^2 - 2x^2 = 6$$

$$\frac{y^2}{6} - \frac{x^2}{3} = 1$$

إذاً هي معادلة قطع زائد مركزه نقطة الأصل.

$$a^2 = 6, b^2 = 3 \Rightarrow c^2 = 9$$

البؤرتان:  $F_1(0, -3), F_2(0, 3)$

مدرستي  
الكويتية  
school-kw.com



في التمارين (5-10)، أوجد: الاختلاف المركزي، البؤرة (البؤرتين)، معادلة الدليل (معادلتَي الدليلين)، معادلتَي الخطين المقاربتين (في القطع الزائد).

$$(5) \frac{x^2}{2^2} + \frac{y^2}{5^2} = 1$$

$$(6) y^2 = 5x$$

$$\frac{x^2}{2^2} + \frac{y^2}{5^2} = 1.$$

هي معادلة قطع ناقص مركزه نقطة الأصل.

$$a^2 = 5^2 \Rightarrow a = 5$$

$$b^2 = 2^2 \Rightarrow b = 2$$

في القطع الناقص:  $a^2 = b^2 + c^2 \Rightarrow c^2 = a^2 - b^2$

$$c^2 = 5^2 - 2^2 = 21 \Rightarrow c = \sqrt{21}$$

الاختلاف المركزي:  $e = \frac{c}{a} = \frac{\sqrt{21}}{5}$

البؤرتان:  $F_1(0, -\sqrt{21}) ; F_2(0, \sqrt{21})$

$$y = \pm \frac{a^2}{c} = \pm \frac{25}{\sqrt{21}} = \pm \frac{25\sqrt{21}}{21}$$

مدرستي  
الكويتية  
school-kw.com

$$(7) \frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{9} = 1$$

$$\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{9} = 1$$

هي معادلة قطع زائد مركزه نقطة الأصل.

$$a^2 = 4 \Rightarrow a = 2$$

$$b^2 = 9 \Rightarrow b = 3$$

في القطع الزائد:  $c^2 = a^2 + b^2 = 13 \Rightarrow c = \sqrt{13}$

الاختلاف المركزي:  $e = \frac{c}{a} = \frac{\sqrt{13}}{2}$

البؤرتان:  $F_1(-\sqrt{13}, 0) ; F_2(\sqrt{13}, 0)$

$$x = \pm \frac{a^2}{c} = \pm \frac{4}{\sqrt{13}} = \pm \frac{4\sqrt{13}}{13}$$

معادلتَي الخطين المقاربتين:  $y = \pm \frac{b}{a}x = \pm \frac{3}{2}x$

$$y^2 = 5x.$$


هي معادلة قطع مكافئ مركزه نقطة الأصل.

$$4p = 5 \Rightarrow p = \frac{5}{4}$$

الاختلاف المركزي:  $e = 1$

البؤرة:  $F\left(\frac{5}{4}, 0\right)$

معادلة الدليل:  $x = -\frac{5}{4}$



$$(8) \frac{x^2}{18^2} + \frac{y^2}{10^2} = 1$$

$$\frac{x^2}{18^2} + \frac{y^2}{10^2} = 1$$

هي معادلة قطع ناقص مركزه نقطة الأصل.

$$a^2 = 18^2 \Rightarrow a = 18$$

$$b^2 = 10^2 \Rightarrow b = 10$$

في القطع الناقص:  $a^2 = b^2 + c^2 = c^2 = a^2 - b^2$

$$c^2 = 18^2 - 10^2 = 224 \Rightarrow c = \sqrt{224} = 4\sqrt{14}$$

الاختلاف المركزي:  $e = \frac{c}{a} = \frac{4\sqrt{14}}{18} = \frac{2\sqrt{14}}{9}$

البؤرتان:  $F_1(-4\sqrt{14}, 0) ; F_2(4\sqrt{14}, 0)$

$$x = \pm \frac{a^2}{c} = \pm \frac{18^2}{4\sqrt{14}} = \pm \frac{81\sqrt{14}}{14}$$

$$(9) y^2 = -3x$$

$$(10) \frac{y^2}{16} - \frac{x^2}{9} = 1$$

$$y^2 = -3x$$

هي معادلة قطع مكافئ مركزه نقطة الأصل.

$$4p = -3 \Rightarrow p = -\frac{3}{4}$$

$e = 1$  الاختلاف المركزي:

البؤرة:  $F(-\frac{3}{4}, 0)$

معادلة الدليل:  $x = \frac{3}{4}$

$$\frac{y^2}{16} - \frac{x^2}{9} = 1$$

هي معادلة قطع زائد مركزه نقطة الأصل.

$$a^2 = 16 \Rightarrow a = 4$$

$$b^2 = 9 \Rightarrow b = 3$$

في القطع الزائد:  $c^2 = a^2 + b^2 = 16 + 9 = 25 \Rightarrow c = 5$

الاختلاف المركزي:  $e = \frac{c}{a} = \frac{5}{4}$

البؤرتان:  $F_1(0, -5); F_2(0, 5)$

معادلتا الدليلين:  $x = \pm \frac{a^2}{c} = \pm \frac{16}{5}$

معادلتا الخطين المقاربتين:  $y = \pm \frac{a}{b}x = \pm \frac{4}{3}x$

(11) إذا كان  $a = b = r$ ، فسّر لماذا يكون القطع الناقص الذي معادلته  $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$  دائرة مركزها  $(0, 0)$  ونصف قطرها  $r$ .

$$(11) x^2 + y^2 = r^2$$

$$\therefore \frac{x^2}{r^2} + \frac{y^2}{r^2} = 1$$


$$OM = \sqrt{x^2 + y^2}$$

$$\Rightarrow \sqrt{x^2 + y^2} = r$$

$$\Rightarrow (\sqrt{x^2 + y^2})^2 = r^2$$

$$\Rightarrow x^2 + y^2 = r^2$$

لتكن  $M(x, y)$  نقطة على دائرة؛ لنذكر أن  $OM = r$ .



(12) أوجد معادلة نموذج مسار سفينة فضائية حول أحد الكواكب إذا كان:

$$a = 107124 \text{ km} , c = 213125.9 \text{ km}$$

$$(12) e = \frac{c}{a} = \frac{213125.9}{107124} \approx 1.99$$

$e = 1.99 > 1$  إذا هي معادلة قطع زائد مركزه نقطة الأصل.

$$b^2 = c^2 - a^2 \Rightarrow b^2 = 3.39 \times 10^{10}$$

بفرض أن مركز القطع الزائد هو نقطة الأصل وأن المحور أفقي.

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 \quad \text{تكون المعادلة:}$$

$$\Rightarrow \frac{x^2}{1.15 \times 10^{10}} - \frac{y^2}{3.39 \times 10^{10}} = 1$$

(13) لتكن  $M$  نقطة متغيرة على قطع زائد حيث بؤرتيه  $F_1(155,0)$  ,  $F_2(-155,0)$

أوجد معادلة القطع الزائد إذا كان  $|MF_1 - MF_2| = 80$

(13) لتكن  $M(x,y)$  نقطة على القطع الزائد و  $F_1(-155,0)$  ,  $F_2(155,0)$  البؤرتين.

$$|MF_1 - MF_2| = 80$$

$$2a = 80 \Rightarrow a = 40 \Rightarrow a^2 = 1600$$

$$\therefore c = 155$$

$$b^2 = c^2 - a^2 \quad \text{في القطع الزائد:}$$

$$b^2 = 22425$$

$$\Rightarrow \frac{x^2}{1600} - \frac{y^2}{22425} = 1$$

(14) (a) حدّد نوع القطع المخروطي حيث اختلافه المركزي  $e = \frac{\sqrt{2}}{2}$

(b) إذا كان مركزه نقطة الأصل  $(0,0)$  أوجد  $a$  ,  $b$  علماً أنّ معادلة إحدى دليبيه هي  $x = 4$

(c) اكتب معادلة القطع المخروطي.

$$(14) (a) e = \frac{\sqrt{2}}{2} , \frac{\sqrt{2}}{2} < 1$$

إذا هي معادلة قطع ناقص.

$$(b) e = \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{c}{a} \Rightarrow 2c = \sqrt{2}a \Rightarrow a = \sqrt{2}c$$

$$x = 4 = \frac{a^2}{c} \Rightarrow 4 = \frac{(\sqrt{2}c)^2}{c} = 2c \Rightarrow c = 2 \Rightarrow a = 2\sqrt{2}$$

$$a^2 = b^2 + c^2 \Rightarrow (2\sqrt{2})^2 = b^2 + 4 \Rightarrow b^2 = 4 \Rightarrow b = 2 \quad \text{في القطع الناقص:}$$

(c) الصورة العامة للقطع الناقص حيث أن المحور القاطع ينطبق على محور السينات هي:

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \Rightarrow \frac{x^2}{8} + \frac{y^2}{4} = 1$$

(15) اكتب معادلة قطع مخروطي مركزه نقطة الأصل (0,0) حيث اختلافه المركزي  $e = \frac{5}{4}$  وإحدى بؤرتيه

$F(0, -5)$

(15) إذا هي معادلة قطع زائد.  $e = \frac{5}{4}$ ,  $\frac{5}{4} > 1$





$$\frac{5}{4} = \frac{c}{a} \Rightarrow 4c = 5a \Rightarrow a = \frac{4}{5}c$$

$$c = 5 \Rightarrow a = \frac{4}{5} \times 5 = 4$$

في القطع الزائد:  $b^2 = c^2 - a^2 = 25 - 16 = 9$

إذا الصورة العامة للقطع الزائد هي:  $\frac{y^2}{16} - \frac{x^2}{9} = 1$

في التمارين (16-19)، اكتب معادلة القطع المخروطي الموضح في الرسم.



(16)  $x^2 = -4y$

(17)  $y^2 = 8x$

(18)  $\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{16} = 1$

(19)  $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{9} = 1$

(20) أوجد معادلة قطع زائد إذا كان محوره الأكبر ينطبق على محور الصادات وطوله 12 والمسافة بين البؤرتين 20.


$$2c = 20 \implies c = 10$$

$$c^2 = a^2 + b^2 \implies b^2 = c^2 - a^2 = 100 - 36 = 64 \implies b = 8$$

$$\frac{y^2}{36} - \frac{x^2}{64} = 1 \quad \text{المعادلة:}$$

### تمارين إثرائية

(1) أوجد معادلات الخطوط المقاربة للقطع الزائد:  $\frac{x^2}{49} - \frac{y^2}{9} = 1$ ، ومن ثم ارسم بيان هذا القطع الزائد.



$$(1) \text{ معادلات الخطوط المقاربة للقطع الزائد: } \frac{x^2}{49} - \frac{y^2}{9} = 1$$

$$y = \pm \frac{3}{7}x \quad \therefore y = \pm \frac{b}{a}x$$

(2) النقطتان الطرفيتان للمحور الأكبر في قطع ناقص إحداثياتهما  $(-10, 0)$ ،  $(10, 0)$  وإحدى النقاط الطرفية للمحور الأصغر هي  $(0, 7)$ . أوجد إحداثيات بؤرتيه

$$(2) \quad a = 10 \quad b = 7$$

$$c^2 = a^2 - b^2 = 100 - 49 = 51 \implies c = \sqrt{51}$$

$$\therefore F_1(-\sqrt{51}, 0), F_2(\sqrt{51}, 0)$$

$$(3) \text{ لتكن المعادلة: } mx^2 + (2m + 1)y^2 + (m - 1)x = 0$$

حدّد  $m$  لتكون هذه المعادلة معادلة قطع مكافئ، ثم عدّد خواصه.

$$(3) \quad m = 0 \implies y^2 - x = 0$$

$$y^2 = x$$

معادلة قطع مكافئ رأسه نقطة الأصل

$$4p = 1 \implies p = \frac{1}{4}$$

$$F\left(\frac{1}{4}, 0\right) \quad \text{البؤرة:}$$

$$x = -\frac{1}{4} \quad \text{معادلة الدليل}$$

$$(4) \text{ لتكن المعادلة: } (m-1)x^2 - (2m+1)y^2 + 2m+3 = 0$$

إذا  $m = 2$ ، فحدّد ما تمثّله المعادلة، ثم أوجد خواصه.

$$(4) \quad x^2 - 5y^2 + 7 = 0 \implies x^2 - 5y^2 = -7 \implies 5y^2 - x^2 = 7$$
$$\frac{y^2}{7} - \frac{x^2}{5} = 1$$

إذا هي معادلة قطع زائد مركزه نقطة الأصل.

$$a^2 = \frac{7}{5} \implies a = \sqrt{\frac{7}{5}}$$

$$b^2 = 7 \implies b = \sqrt{7}$$

$$\text{الرأسان: } A_1\left(0, -\sqrt{\frac{7}{5}}\right); A_2\left(0, \sqrt{\frac{7}{5}}\right)$$

$$\text{معادلتا الخطين المقاربتين: } y = \pm \frac{\sqrt{\frac{7}{5}}}{\sqrt{7}}x = \pm \frac{\sqrt{7}}{\sqrt{5} \times \sqrt{7}}x = \pm \frac{\sqrt{5}}{5}x$$

$$c^2 = a^2 + b^2 \implies c^2 = \frac{7}{5} + 7 = \frac{42}{5} \implies c = \sqrt{\frac{42}{5}}$$

$$F_1\left(0, -\sqrt{\frac{42}{5}}\right); F_2\left(0, \sqrt{\frac{42}{5}}\right)$$

$$\text{معادلتا الدليلين: } y = \pm \frac{a^2}{c} = \pm \frac{7}{5\sqrt{\frac{42}{5}}} = \pm \frac{\sqrt{210}}{30}$$



$$(5) \text{ لتكن المعادلتان: } \frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{25} = 1, \frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{4} = 1$$

(a) حدّد ما تمثله كل معادلة.

(b) أوجد نقاط التقاطع مستخدمًا المنحنيين اللذين يمثلان.


(c) علّل النتيجة التي حصلت عليها في السؤال (b) مستخدمًا عمليّات حسابيّة.

$$(5) (a) \frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{25} = 1$$

إذاً هي معادلة قطع زائد مركزه نقطة الأصل.

$$\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{4} = 1$$

إذاً هي معادلة قطع ناقص مركزه نقطة الأصل.



مدرستي

بين الشكل وجرّد 4 نقاط تقاطع بين المنحنيين

$$(c) \frac{x^2}{4} = 1 + \frac{y^2}{25}$$

$$x^2 = 4\left(1 + \frac{y^2}{25}\right)$$

$$\frac{x^2}{25} = 1 - \frac{y^2}{4}$$

$$x^2 = 25\left(1 - \frac{y^2}{4}\right)$$

$$\rightarrow 4\left(1 + \frac{y^2}{25}\right) = 25\left(1 - \frac{y^2}{4}\right)$$

$$\rightarrow 4 + \frac{4}{25}y^2 = 25 - \frac{25}{4}y^2 \rightarrow y^2\left(\frac{4}{25} + \frac{25}{4}\right) = 25 - 4$$

$$\frac{641}{100}y^2 = 21$$

$$y^2 = \frac{2100}{641}$$

$$y = \pm 10\sqrt{\frac{21}{641}}$$

$$x^2 = \frac{2900}{641}$$

$$x = \pm 10\sqrt{\frac{29}{641}}$$

يوجد 4 نقاط تقاطع بين المنحنيين.

(6) أوجد معادلة قطع مخروطي مركزه نقطة الأصل (0,0) حيث اختلافه المركزي  $e = \frac{7}{5}$  ومعادلة إحدى دليليه  $y = \frac{25}{7}$ .

$$(6) \quad e = \frac{7}{5}, \frac{7}{5} > 1$$

إذا قطع زائد.

$$\frac{7}{5} = \frac{c}{a} \Rightarrow 7a = 5c \Rightarrow a = \frac{5}{7}c$$

$$\frac{25}{7} = \frac{a^2}{c} = \frac{\frac{25}{49}c^2}{c} = \frac{25}{49}c \Rightarrow c = 7 \Rightarrow a = 5$$

$$c^2 = a^2 + b^2 \Rightarrow b^2 = c^2 - a^2 = 7^2 - 5^2 = 24$$

$$\frac{y^2}{25} - \frac{x^2}{24} = 1 \quad \text{معادلة القطع الزائد.}$$

(7) أوجد معادلة قطع مخروطي مركزه نقطة الأصل (0,0) حيث اختلافه المركزي  $e = \frac{5}{7}$  وإحدى بؤرتيه  $F(-5,0)$ .

$$(7) \quad e = \frac{5}{7}, \frac{5}{7} < 1$$

إذا إنه قطع ناقص

$$c = 5$$

$$\frac{c}{a} = \frac{5}{7}; \frac{5}{a} = \frac{5}{7} \Rightarrow a = 7$$

$$a^2 = b^2 + c^2 \Rightarrow b^2 = a^2 - c^2 \Rightarrow b^2 = 49 - 25 \Rightarrow b^2 = 24$$

$$\frac{x^2}{49} + \frac{y^2}{24} = 1 \quad \text{المعادلة.}$$

(8) أوجد معادلة القطع الزائد حيث بؤرتيه  $F_1(-\sqrt{34}, 0)$ ,  $F_2(\sqrt{34}, 0)$  وأحد خطيه المقاربين يمر بالنقطة  $A(3,5)$ .

(8) الخط المقارب  $y = \frac{b}{a}x$  يمر بالنقطة  $A(3,5)$  فيكون:

$$5 = \frac{b}{a}(3) \Rightarrow \frac{b}{a} = \frac{5}{3} \Rightarrow a = \frac{3}{5}b$$

$$c^2 = a^2 + b^2 \Rightarrow 34 = \frac{9b^2}{25} + b^2 \Rightarrow 34 = \frac{34b^2}{25} \Rightarrow b^2 = 25 \Rightarrow b = 5$$

$$a = \frac{3}{5}(5) = 3$$

$$\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{25} = 1 \quad \text{فتكون معادلة القطع الزائد.}$$

(9) أوجد معادلة القطع الزائد الذي مركزه نقطة الأصل وميل أحد الخطين المقاربين 2 وإحدى بؤرتيه  $F(0, -\sqrt{5})$ .

$$(9) \frac{a}{b} = 2, c = \sqrt{5}, a = 2b$$

$$c^2 = a^2 + b^2 \Rightarrow 5 = b^2 + 4b^2 \Rightarrow 5 = 5b^2 \Rightarrow b^2 = 1 \Rightarrow b = 1$$

$$a = 2b \Rightarrow a = 2 \quad \text{ولكن:}$$

$$\frac{y^2}{4} - x^2 = 1 \quad \text{لذا معادلة القطع الزائد هي:}$$

في التمارين (10-14)، أوجد: الاختلاف المركزي، البؤرة (البؤرتين)، معادلة الدليل (معادلتا الدليلين)، معادلتا الخطين المقاربين (في القطع الزائد).

$$(10) \frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{25} = 1$$

$$(11) 8y^2 - 25x^2 = 200$$

$$(10) a^2 = 25 \Rightarrow a = 5$$

$$b^2 = 9 \Rightarrow b = 3$$

$$a^2 = b^2 + c^2 \Rightarrow c^2 = b^2 - a^2 = 25 - 9 = 16 \Rightarrow c = 4$$

$$e = \frac{c}{a} = \frac{4}{5} \quad \text{الاختلاف المركزي:}$$

$$F_1(0, -4), F_2(0, 4) \quad \text{البؤرتان:}$$

$$x = \pm \frac{a^2}{c} = \pm \frac{25}{4} \quad \text{معادلتا الدليلين:}$$

$$(11) 8y^2 - 25x^2 = 200 \Rightarrow \frac{y^2}{25} - \frac{x^2}{8} = 1$$

$$a^2 = 25 \Rightarrow a = 5$$

$$b^2 = 8 \Rightarrow b = 2\sqrt{2}$$

$$c^2 = a^2 + b^2 = 25 + 8 = 33 \Rightarrow c = \sqrt{33}$$

$$e = \frac{c}{a} = \frac{\sqrt{33}}{5} \quad \text{الاختلاف المركزي:}$$

$$F_1(0, -\sqrt{33}), F_2(0, \sqrt{33}) \quad \text{البؤرتان:}$$

$$y = \pm \frac{a^2}{c} = \pm \frac{25}{\sqrt{33}} = \pm \frac{25\sqrt{33}}{33} \quad \text{معادلتا الدليلين:}$$

$$y = \pm \frac{a}{b}x = \pm \frac{5\sqrt{2}}{4}x \quad \text{معادلتا الخطين المقاربين:}$$

$$(12) \quad x^2 = -2y$$

$$(12) \quad x^2 = -2y$$

$$4p = -2 \implies p = -\frac{1}{2}$$

$e = 1$  الاختلاف المركزي:

البؤرة:  $F(0, -\frac{1}{2})$

معادلة الدليل:  $y = \frac{1}{2}$

$$(13) \quad y^2 = -x$$

$$(13) \quad y^2 = -x$$

$$4p = -1 \implies p = -\frac{1}{4}$$

$e = 1$  الاختلاف المركزي:

البؤرة:  $F(-\frac{1}{4}, 0)$

معادلة الدليل:  $x = \frac{1}{4}$



$$(14) \quad 5x^2 - 9y^2 = 45$$

$$(14) \quad 5x^2 - 9y^2 = 45 \implies \frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{5} = 1$$

$$a^2 = 9 \implies a = 3$$

$$b^2 = 5 \implies b = \sqrt{5}$$

$$c^2 = a^2 + b^2 = 9 + 5 = 14 \implies c = \sqrt{14}$$

$e = \frac{c}{a} = \frac{\sqrt{14}}{3}$  الاختلاف المركزي:

البؤرتان:  $F_1(-\sqrt{14}, 0)$ ;  $F_2(\sqrt{14}, 0)$

معادلتنا الدليلين:  $x = \pm \frac{a^2}{c} = \pm \frac{9\sqrt{14}}{14}$

معادلتنا الخططين المقاربتين:  $y = \pm \frac{b}{a}x = \pm \frac{\sqrt{5}}{3}x$

## المتغيرات العشوائية المتقطعة

## Discrete Random Variables

## المجموعة A تمارين مقالية

(1) في تجربة إلقاء قطعة نقود مرتين متتاليتين، إذا كان المتغير العشوائي  $X$  يعبر عن عدد الصور فأوجد:

(a) فضاء العينة  $(S)$  وعدد عناصره  $n(S)$ .

(b) مدى المتغير العشوائي  $X$ .

(c) احتمال وقوع كل عنصر من عناصر مدى المتغير العشوائي  $x$ :  $f(x_i) = P(X = x_i)$

(d) دالة التوزيع الاحتمالي للمتغير العشوائي  $X$ .

(1) (a) فضاء العينة:  $(S) = \{(H, T), (T, T), (T, H), (H, H)\}$

عدد عناصره:  $n(S) = 4$

(b)  $X \in \{0, 1, 2\}$

(c)  $P(X = 0) = \frac{1}{4}$

$$P(X = 1) = \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{1}{2}$$

$$P(X = 2) = \frac{1}{4}$$

(d) دالة التوزيع الاحتمالي للمتغير العشوائي  $X$ :

$x$	0	1	2
$f(x)$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$

(2) في تجربة إلقاء قطعة نقود ثلاث مرات متتالية، أوجد مجموعة القيم للمتغيرات العشوائية التالية وحدد فيما

إذا كانت متغيرات عشوائية متقطعة أم لا:

(2) (a)  $X = \{0, 1, 2, 3\}$

$X$  متغير عشوائي متقطع.

(a) المتغير العشوائي  $X$  الذي يمثل عدد الكتابات.

(b)  $Y = \{0, \frac{1}{4}, \frac{1}{2}, \frac{3}{4}\}$

$Y$  متغير عشوائي متقطع.

(b) المتغير العشوائي  $Y$  الذي يمثل ربع عدد الكتابات.

(c) المتغير العشوائي  $Z$  الذي يمثل عدد الكتابات مضافاً له 1.

(c)  $Z = \{1, 2, 3, 4\}$

$Z$  متغير عشوائي متقطع.

(3) إذا كانت دالة التوزيع الاحتمالي  $f$  للمتغير العشوائي  $X$  هي:

$x$	-1	0	1	2	3
$f(x)$	0.1	0.3	$K$	0.2	0.3

$$k = 1 - (0.1 + 0.3 + 0.2 + 0.3) = 0.1$$

(4) إذا كان  $X$  متغيرًا عشوائيًا متقطعًا مداه هو:  $\{1, 2, 3, 4\}$  وكان  $f(1) = 0.1$  ،  $f(3) = 0.4$  ،  $f(4) = 0.2$  . فأوجد  $f(2)$  ، ثم اكتب دالة التوزيع الاحتمالي  $f$  للمتغير العشوائي  $X$ .

$$(4) f(2) = 1 - (0.1 + 0.4 + 0.2) = 0.3$$

دالة التوزيع الاحتمالي  $f$  للمتغير العشوائي  $X$ :

$x$	1	2	3	4
$f(x)$	0.1	0.3	0.4	0.2

(5) صندوق يحوي 10 كرات متماثلة منها 6 كرات حمراء و 4 كرات بيضاء سحبت 5 كرات عشوائيًا معًا من الصندوق. إذا كان المتغير العشوائي  $X$  يمثل عدد الكرات البيضاء. فأوجد ما يلي:

school - kw . com

(a) عدد عناصر فضاء العينة  $n(S)$ .

(b) مدى المتغير العشوائي  $X$ .

(c) احتمال كل عنصر من عناصر مدى المتغير العشوائي  $X$ .

(d) دالة التوزيع الاحتمالي  $f$  للمتغير العشوائي  $X$ .

$$(5) (a) \text{ عدد عناصر فضاء العينة؛ } n(S) = {}_{10}C_5 = 252$$

$$(b) X \in \{0, 1, 2, 3, 4\}$$

$$(c) P(X = 0) = \frac{{}_6C_5 \times {}_4C_0}{252} = \frac{1}{42}$$

$$P(X = 1) = \frac{{}_6C_4 \times {}_4C_1}{252} = \frac{5}{21}$$

$$P(X = 2) = \frac{{}_6C_3 \times {}_4C_2}{252} = \frac{10}{21}$$

$$P(X = 3) = \frac{{}_6C_2 \times {}_4C_3}{252} = \frac{5}{21}$$

$$P(X = 4) = \frac{{}_6C_1 \times {}_4C_4}{252} = \frac{1}{42}$$

(d) دالة التوزيع الاحتمالي  $f$  للمتغير العشوائي  $X$ :

$x$	0	1	2	3	4
$f(x)$	$\frac{1}{42}$	$\frac{5}{21}$	$\frac{10}{21}$	$\frac{5}{21}$	$\frac{1}{42}$

(6) إذا كانت دالة التوزيع الاحتمالي  $f$  للمتغير العشوائي  $X$  هي:

$x$	0	1	2	3
$f(x)$	0.2	0.3	0.4	0.1

فأوجد التوقع  $\mu$  للمتغير العشوائي  $X$ .

$$(6) \mu = 0 \times 0.2 + 1 \times 0.3 + 2 \times 0.4 + 3 \times 0.1 = 1.4$$

إذاً، التوقع:  $(\mu) = 1.4$

(7) الجدول التالي يبين دالة التوزيع الاحتمالي لمتغير عشوائي متقطع  $X$ .

$x$	7	8	9	10
$f(x)$	$\frac{1}{8}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{1}{8}$

أوجد:

(a) التوقع  $(\mu)$ .


(b) التباين  $\sigma^2$ .

(c) الانحراف المعياري  $(\sigma)$ .

$$(7) (a) \mu = 7 \times \frac{1}{8} + 8 \times \frac{3}{8} + 9 \times \frac{3}{8} + 10 \times \frac{1}{8} = \frac{17}{2}$$

$$(b) \sigma^2 = 49 \times \frac{1}{8} + 64 \times \frac{3}{8} + 81 \times \frac{3}{8} + 100 \times \frac{1}{8} - \left(\frac{17}{2}\right)^2 = 0.75$$

$$(c) \sigma = \sqrt{0.75} = 0.866$$



إذاً، الانحراف المعياري:  $(\sigma) = 0.866$

(8) الجدول التالي يبين دالة التوزيع الاحتمالي  $f$  للمتغير العشوائي المتقطع  $X$ .

$x$	0	1	2	3	4
$f(x)$	0.2	0.15	0.1	0.25	0.3

إذا كانت  $F$  دالة التوزيع التراكمي للمتغير العشوائي  $X$ .

فأوجد:  $F(0), F(1), F(2), F(3), F(3.5), F(4), F(5)$

$$(8) F(0) = P(X \leq 0) = 0.2$$

$$F(1) = P(X \leq 1) = P(X < 1) + P(X = 1) = 0.2 + 0.15 = 0.35$$

$$F(2) = P(X \leq 2) = P(X < 2) + P(X = 2) = 0.2 + 0.15 + 0.1 = 0.45$$

$$F(3) = P(X \leq 3) = P(X < 3) + P(X = 3) = 0.2 + 0.15 + 0.1 + 0.25 = 0.7$$

$$F(3.5) = P(X \leq 3.5) = P(X < 3) + P(X = 3) = 0.2 + 0.15 + 0.1 + 0.25 = 0.7$$

$$F(4) = P(X \leq 4) = P(X < 4) + P(X = 4) = 0.2 + 0.15 + 0.1 + 0.25 + 0.3 = 1$$

$$F(5) = P(X \leq 5) = P(X < 5) + P(X = 5) = 1$$

(9) الجدول التالي يبين بعض قيم دالة التوزيع التراكمي  $F$  للمتغير العشوائي المتقطع  $X$ .

$x$	-1	3	5	7
$F(x)$	0.1	0.45	0.7	1

أوجد:

(a)  $P(-1 < X \leq 5)$

(b)  $P(3 < X \leq 7)$

(c)  $P(X > 3)$

(9) (a)  $P(-1 < X < 5) = F(5) - F(-1) = 0.7 - 0.1 = 0.6$

(b)  $P(3 \leq X < 7) = F(7) - F(3) = 1 - 0.45 = 0.55$

(c)  $P(X > 3) = 1 - P(X \leq 3) = 1 - F(3) = 1 - 0.45 = 0.55$

(10) إذا كان  $X$  متغيراً عشوائياً ذو حددين ومعلمتيه هما:  $n = 8$  ,  $P = 0.3$

فأوجد:

(a)  $P(X = 0)$

(b)  $P(2 < X \leq 5)$

(10) (a)  $P(X = 0) = {}_8C_0 \times 0.3^0 \times (1 - 0.3)^8 = 0.0576$

(b)  $P(2 < X \leq 5) = P(X = 3) + P(X = 4) + P(X = 5)$   
 $= {}_8C_3 \times 0.3^3 \times 0.7^5 + {}_8C_4 \times 0.3^4 \times 0.7^4 + {}_8C_5 \times 0.3^5 \times 0.7^3 = 0.437$

(11) إذا كان  $X$  متغيراً عشوائياً ذو حددين ومعلمتيه هما:  $n = 10$  ,  $P = 0.5$

فأوجد:

(a)  $P(X = 0)$

(b)  $P(2 < X \leq 4)$

(11) (a)  $P(X = 0) = {}_{10}C_0 \times 0.5^0 \times 0.5^{10} = 9.766 \cdot 10^{-4}$

(b)  $P(2 < X \leq 4) = P(X = 3) + P(X = 4)$

$$= {}_{10}C_3 \times 0.5^3 \times 0.5^7 + {}_{10}C_4 \times 0.5^4 \times 0.5^6 = 0.322$$

(12) ينتج مصنع 100 وحدة يومياً، إذا كانت نسبة إنتاج الوحدات المعيبة 0.03، فأوجد التوقع والتباين

(12)  $n = 100$  ,  $p = 0.03$

$$\mu = np = 100 \times 0.03 = 3$$

إذًا، التوقع:  $(\mu) = 3$

$$\sigma^2 = np(1 - p) = 100 \times 0.03 \times 0.97 = 2.91$$

إذًا، التباين:  $(\sigma^2) = 2.91$

$$\sigma = \sqrt{2.91} = 1.7059$$

إذًا، الانحراف المعياري:  $(\sigma) = 1.7059$

(13) إذا رمينا قطعة نقود معدنية 12 مرة، أوجد التوقع والتباين إذا كان المتغير العشوائي  $X$  هو ظهور صورة.

(13)  $n = 12$  ,  $p = 0.5$

$$\mu = n p = 12 \times 0.5 = 6$$

إذا، التوقع:  $(\mu) = 6$

$$\sigma^2 = n p(1-p) = 12 \times 0.5 \times 0.5 = 3$$

إذا، التباين:  $(\sigma^2) = 3$

$$\sigma = \sqrt{3} = 1.732$$

إذا، الانحراف المعياري:  $(\sigma) = 1.732$

### المجموعة B تمارين موضوعية

في التمارين (1-9)، ظلل (a) إذا كانت العبارة صحيحة، و (b) إذا كانت العبارة خاطئة.

- (1) التوقع هو القيمة التي تقيس تشتت قيم المتغير العشوائي المتقطع عن قيمته المتوسطة. (a) (b)
- (2) التباين هو القيمة التي تتجمع حولها القيم الممكنة للمتغير العشوائي المتقطع. (a) (b)
- (3) دالة التوزيع التراكمي  $F$  للمتغير العشوائي المتقطع عند القيمة  $a$  هي احتمال وقوع المتغير العشوائي  $X$  بحيث يكون  $X$  أصغر من أو يساوي  $a$ . (a) (b)
- (4) التوزيع التالي يمثل دالة التوزيع الاحتمالي  $f$  للمتغير  $X$ .

$x$	0	1	2	3
$f(x)$	0.1	0.05	0.4	0.4

- (5) قيمة  $K$  التي تجعل التوقع  $\mu$  للمتغير العشوائي  $X$  يساوي 1 لدالة التوزيع الاحتمالي  $f$  هي صفر. (a) (b)

$x$	2	1	0
$f(x)$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	$K$

- (6) لدالة توزيع تراكمي  $F$  للمتغير العشوائي  $X$  يكون، (a) (b)

$$P(a < X \leq b) = F(b) - F(a)$$

- (7) لدالة توزيع تراكمي  $F$  للمتغير العشوائي  $X$  يكون، (a) (b)

$$P(X < a) = 1 - F(a)$$

(8) مدرسة فيها عدد الطلبة 300 طالب فإذا كانت نسبة النجاح 0.6 فإن التوقع لعدد الطلبة الناجحين هو 150 طالباً.

- (a) (b)  
(a) (b)

(9) عند إلقاء قطعة نقود ثلاث مرات متتالية فإن  $n(S) = 6$ .

في التمارين (10–21)، ظلّل رمز الدائرة الدال على الإجابة الصحيحة.

(10) إذا كانت دالة التوزيع الاحتمالي  $f$  للمتغير العشوائي  $X$  هي:

$x$	-1	0	1	2
$f(x)$	0.2	0.2	$K$	0.2

فإن قيمة  $K$  هي:

- (a) 0.2 (b) 0 (c) 0.4 (d) 0.3

(11) إذا كانت دالة التوزيع الاحتمالي  $f$  للمتغير العشوائي  $X$  هي:

$x$	1	2	3
$f(x)$	$K$	$2K$	$2K$

فإن قيمة  $K$  تساوي:

- (a) 0.5 (b) 0.2 (c) 1 (d) 0.4

مدرستي  
الكويتية  
school-kw.com

في التمارين (12–14)، استخدم الجدول التالي:

$x$	0	1	2	3
$f(x)$	0.2	0.4	0.1	0.3

حيث  $f$  هي دالة التوزيع الاحتمالي للمتغير العشوائي المتقطع  $X$ .

(12)  $F(-1)$

- (a) 0 (b) 0.2 (c) 0.4 (d) 0.6

(13)  $F(1.5)$

- (a) 0.4 (b) 0.2 (c) 0 (d) 0.6

(14)  $F(4)$

- (a) 0.2 (b) 0.1 (c) 0.4 (d) 1

(15) إذا كان  $X$  متغيرًا عشوائيًا متقطعًا دالة توزيع الاحتمالي  $f$  هي:

$x$	0	1	2
$f(x)$	0.25	0.50	0.25

فإن التوقع له يساوي:

- (a) 1      (b) 1.25      (c) 1.5      (d) 0.5

(16) إذا كان  $X$  متغيرًا عشوائيًا متقطعًا لدالة التوزيع الاحتمالي  $f$  وكان التوقع = 0.5 ،  $\sum x^2 f(x) = 4.25$  ،

فإن الانحراف المعياري هو:

- (a) 4      (b) 2      (c) 3.75      (d) 1

(17) إذا كانت بعض قيم دالة التوزيع التراكمي  $F$  للمتغير العشوائي  $X$  معطاة في الجدول التالي:

$x$	0	1	2	3
$F(x)$	0.1	0.3	0.7	1

فإن  $f(2)$  تساوي:

- (a) 0.7      (b) 0.3      (c) 0.4      (d) 1

(18) إذا كانت دالة التوزيع الاحتمالي  $f$  للمتغير العشوائي المتقطع  $X$  هي:

$x$	0	1	2
$f(x)$	$\frac{1}{3}$	$\frac{5}{9}$	$\frac{1}{9}$

فإن التوقع  $\mu$  للمتغير العشوائي  $X$  يساوي:

- (a) 1      (b)  $\frac{2}{3}$       (c)  $\frac{7}{9}$       (d) 0

(19) عند إلقاء قطعة نقود منتظمة أربع مرات متتالية فإن التباين  $\sigma^2$  للمتغير العشوائي  $X$  «ظهور صورة» يساوي:

- (a) 2      (b) 1      (c)  $\frac{1}{2}$       (d) 4

(20) إذا كان  $X$  متغيرًا عشوائيًا متقطعًا يأخذ القيم 1.5 , 1 , -1 و كان:  $P(X = -1) = 0.6$  ,  $P(X = 1) = 0.3$  ،

فإن  $P(X > 0)$  يساوي:

- (a) 0.6      (b) 0.9      (c) 0.4      (d) 0.7

(21) ينتج مصنع سيارات 200 سيارة في الشهر. إذا كانت نسبة السيارات المعيبة 0.02 فإن التوقع لعدد

السيارات المعيبة المنتجة في الشهر يساوي:

- (a) 2      (b) 4      (c) 20      (d) 40

المتغيرات العشوائية المتصلة (المستمرة)  
Continuous Random Variables

المجموعة A تمارين مقالية

(1) إذا كان  $X$  متغيرًا عشوائيًا متصلًا ودالة كثافة الاحتمال له هي:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{5} & : 0 \leq x \leq 5 \\ 0 & : \text{في ما عدا ذلك} \end{cases}$$

فأوجد.

(a)  $P(0 \leq X \leq 5)$

(b)  $P(X = 3)$

(c)  $P(X \leq 2)$

(d)  $P(X > 2)$

(1) (a)  $P(0 \leq X \leq 5) = 5 \times \frac{1}{5} = 1$

(b)  $P(X = 3) = 0$

(c)  $P(X \leq 2) = 2 \times \frac{1}{5} = \frac{2}{5}$

(d)  $P(X > 2) = 3 \times \frac{1}{5} = \frac{3}{5}$

مدرستي  
الكويتية  
w . c o m



(2) إذا كان  $X$  متغيرًا عشوائيًا متصلًا ودالة كثافة الاحتمال له هي:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{2} & : 2 \leq x \leq 4 \\ 0 & : \text{في ما عدا ذلك} \end{cases}$$

فأوجد.

(a)  $P(2 \leq X \leq 4)$

(b)  $P(X \geq 2.5)$

(2) (a)  $P(2 \leq X \leq 4) = 2 \times \frac{1}{2} = 1$

(b)  $P(X \geq 2.5) = (4 - 2.5) \times \frac{1}{2} = \frac{3}{4}$

(3) إذا كان  $X$  متغيرًا عشوائيًا متصلًا ودالة كثافة الاحتمال له هي:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{2}{9}x & : 0 \leq x \leq 3 \\ 0 & : \text{في ما عدا ذلك} \end{cases}$$

فأوجد:

(a)  $P(0 \leq X \leq 3)$

(b)  $P(X < 1)$

(c)  $P(X \geq 1)$

(3) (a)  $x = 3 \quad \therefore y = \frac{6}{9} = \frac{2}{3}$

$$P(0 \leq X \leq 3) = \frac{1}{2} \times 3 \times \frac{2}{3} = 1$$

(b)  $x = 1 \quad \therefore y = \frac{2}{9}$

$$P(X < 1) = \frac{1}{2} \times 1 \times \frac{2}{9} = \frac{1}{9}$$

(c)  $P(X \geq 1) = 1 - P(X < 1) = 1 - \frac{1}{9} = \frac{8}{9}$

(4) لتكن الدالة  $f$ :

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{6} & : -1 \leq x \leq 5 \\ 0 & : \text{في ما عدا ذلك} \end{cases}$$

(a) أثبت أن الدالة  $f$  هي دالة كثافة احتمال.

(b) أثبت أن الدالة  $f$  تتبع التوزيع الاحتمالي المنتظم.

(c) أوجد  $P(0 < X \leq 3)$ .

(d) أوجد التوقع والتباين للدالة  $f$ .

(4) (a) المساحة تحت المنحنى (وهو منطقة مستطيلة)

$$\frac{1}{6} \times (5 - (-1)) = 6 \times \frac{1}{6} = 1$$

$\therefore$  الدالة هي كثافة احتمال.

(b) لإثبات أن الدالة  $f$  تتبع التوزيع الاحتمالي المنتظم يجب أن تكون الدالة  $f$  على الصورة:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a} & : a \leq x \leq b \\ 0 & : \text{في ما عدا ذلك} \end{cases}$$

$$a = -1, b = 5$$

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{5 - (-1)} = \frac{1}{6} & : -1 \leq x \leq 5 \\ 0 & : \text{في ما عدا ذلك} \end{cases}$$

إذاً هي دالة توزيع احتمالي منتظم.

(c)  $P(0 < X \leq 3) = 3 \times \frac{1}{6} = \frac{1}{2}$

(d)  $\mu = \frac{a+b}{2} = \frac{5-1}{2} = 2$

إذاً، التوقع:  $(\mu) = 2$

$$\sigma^2 = \frac{(b-a)^2}{12} = \frac{(5-(-1))^2}{12} = \frac{36}{12} = 3$$

إذا، التباين  $(\sigma^2) = 3$

(5) الدالة  $f$  تتبع التوزيع الاحتمالي المنتظم وهي معرفة كما يلي:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{7} & : 0 \leq x \leq 7 \\ 0 & : \text{في ما عدا ذلك} \end{cases}$$

(a) أثبت أن الدالة  $f$  هي دالة كثافة احتمال.

(b) أوجد  $P(0 \leq X \leq \frac{7}{8})$ .

(c) أوجد التوقع والتباين للدالة  $f$ .

(5) (a) لإثبات أن الدالة  $f$  تتبع التوزيع الاحتمالي المنتظم يجب أن تكون الدالة  $f$  على الصورة:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a} & : a \leq x \leq b \\ 0 & : \text{في ما عدا ذلك} \end{cases}$$

الكويتية  
a = 0 , b = 7  
school - kw . com

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{7-0} = \frac{1}{7} & : 0 \leq x \leq 7 \\ 0 & : \text{في ما عدا ذلك} \end{cases}$$

إذا  $f$  هي دالة توزيع احتمالي منتظم.

$$(b) P(0 \leq X \leq \frac{7}{8}) = \frac{7}{8} \times \frac{1}{7} = \frac{1}{8}$$

$$(c) \mu = \frac{a+b}{2} = \frac{0+7}{2} = \frac{7}{2}$$

إذا، التوقع،  $(\mu) = \frac{7}{2}$

$$\sigma^2 = \frac{(b-a)^2}{12} = \frac{(7-0)^2}{12} = \frac{49}{12}$$

إذا، التباين،  $(\sigma^2) = \frac{49}{12}$

(6) إذا كان  $z$  يتبع التوزيع الطبيعي المعياري للمتغير العشوائي  $X$  فأوجد:

(a)  $P(z \leq 2.16)$

(b)  $P(z \geq 2.51)$

(c)  $P(1.5 \leq z \leq 2.4)$

(6) (a)  $P(z \leq 2.16) = 0.98461$

(b)  $P(z \geq 2.51) = 1 - P(z < 2.51) = 1 - 0.99396 = 0.00604$

(c)  $P(1.5 \leq z \leq 2.4) = P(z \leq 2.4) - P(z \leq 1.5) = 0.99180 - 0.93319 = 0.05861$

(7) إذا كان  $z$  يتبع التوزيع الطبيعي المعياري فأوجد:

(a)  $P(z \leq -0.64)$

(b)  $P(-1.7 \leq z \leq 2.85)$

(c)  $P(-1.23 \leq z \leq 0.68)$

(7) (a)  $P(z \leq -0.64) = 0.26109$

(b)  $P(-1.7 \leq z \leq 2.85) = P(z \leq 2.85) - P(z \leq -1.7)$

$= 0.99781 - 0.04457 = 0.95324$

(c)  $P(-1.23 \leq z \leq 0.68) = P(z \leq 0.68) - P(z \leq -1.23)$

$= 0.75175 - 0.10935 = 0.6424$

## المجموعة B تمارين موضوعية

في التمارين (1-7)، ظلّل (a) إذا كانت العبارة صحيحة، و (b) إذا كانت العبارة خاطئة.

(a) (b)

(1) نسبة الرطوبة خلال شهر هو متغير عشوائي متصل.

(a) (b)

(2) عدد أحرف كلمات كتاب هو متغير عشوائي متصل.

(3) إذا كانت الدالة  $f$  معرفة كالتالي:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{2} & : 0 \leq x \leq 1 \\ 0 & : \text{في ما عدا ذلك} \end{cases}$$

فإن الدالة  $f$  هي دالة كثافة احتمال.

(a) (b)

(4) إذا كانت  $X$  متغيرًا عشوائيًا متصلًا ودالة كثافة الاحتمال له هي:

$$f(x) = \begin{cases} 2 & : 0 \leq x \leq \frac{1}{2} \\ 0 & : \text{في ما عدا ذلك} \end{cases}$$

فإن  $P(X \geq 2) = 1$

(a) (b)

(5) إذا كانت الدالة  $f$  هي دالة كثافة احتمال تتبع التوزيع الاحتمالي المنتظم معرفة كما يلي:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{3} & : 0 \leq x \leq 3 \\ 0 & : \text{في ما عدا ذلك} \end{cases}$$

فإن التباين للدالة  $f$  هو  $\sigma^2 = \frac{3}{4}$ .

school-kw.com

(a) (b)

(6) من خواص التوزيع الطبيعي أنه متماثل حول  $x = \mu$ .

(a) (b)

(7) المساحة تحت منحنى التوزيع الطبيعي تساوي الواحد.

(a) (b)

في التمارين (8-17)، ظلّل رمز الدائرة الدال على الإجابة الصحيحة.

(8) إذا كان  $X$  متغيرًا عشوائيًا متصلًا ودالة كثافة الاحتمال له هي:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{2}x & : 0 \leq x \leq 2 \\ 0 & : \text{في ما عدا ذلك} \end{cases}$$

فإن  $P(X = 1)$  يساوي:

(a)  $\frac{1}{2}$

(b) 0

(c) 1

(d) ليس أيًا مما سبق

(9) إذا كان  $X$  متغيرًا عشوائيًا متصلًا ودالة كثافة الاحتمال له هي:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{5}x & : -2 \leq x \leq 3 \\ 0 & : \text{في ما عدا ذلك} \end{cases}$$

فإن  $P(X \leq -2.5)$  يساوي:

(a) 0


(b) 1

(c)  $\frac{1}{5}$

(d)  $\frac{1}{10}$

في التمارين (10-16)، أجب عن الأسئلة من خلال الرسم البياني في الشكل المقابل:

(10) الدالة التي تعبر عن الرسم البياني التالي هي:



(a)  $f(x) = \begin{cases} \frac{3}{4} & : 0 < x < \frac{4}{3} \\ 0 & : \text{في ما عدا ذلك} \end{cases}$

(b)  $f(x) = \begin{cases} \frac{3}{4} & : 0 < x < \frac{4}{3} \\ 0 & : \text{في ما عدا ذلك} \end{cases}$

(c)  $f(x) = \begin{cases} \frac{4}{3} & : 0 < x < \frac{4}{3} \\ 0 & : \text{في ما عدا ذلك} \end{cases}$

(d)  $f(x) = \begin{cases} \frac{3}{4} & : 0 < x < 4 \\ 0 & : \text{في ما عدا ذلك} \end{cases}$

(11) الدالة  $f$  تتبع التوزيع الاحتمالي:

(a) ذات الحدين

(b) الطبيعي

(c) المنتظم

(d) الطبيعي المعياري

مدرستي

(12) التوقع هو:

(a)  $\frac{4}{5}$

(b)  $\frac{2}{3}$

(c)  $\frac{4}{3}$

(d)  $\frac{3}{4}$

school-kw.com

(13) التباين هو:

(a)  $\frac{4}{27}$

(b)  $\frac{16}{9}$

(c)  $\frac{16}{108}$

(d)  $\frac{108}{16}$

(14)  $P\left(X < \frac{4}{6}\right) =$

(a)  $\frac{1}{3}$

(b)  $\frac{1}{4}$

(c)  $\frac{1}{6}$

(d)  $\frac{1}{2}$

(15)  $P\left(X > \frac{4}{12}\right) =$

(a)  $\frac{2}{6}$

(b)  $\frac{6}{2}$

(c)  $\frac{3}{4}$

(d) 1

(16)  $P(0 < X < 1) =$

(a)  $\frac{4}{5}$

(b)  $\frac{1}{3}$

(c) 1

(d)  $\frac{3}{4}$

(17) إذا كان  $z$  يتبع التوزيع الطبيعي فإن:  $P(0 \leq z \leq 2.35)$  يساوي:

(a) 0.9906

(b) 0.5

(c) 0.4906

(d) 0.218

## اختبار الوحدة الثامنة

(1) إذا كان  $X$  متغيراً عشوائياً متقطعاً مداه هو  $\{2, 3, 4, 5\}$  وكان  $f(2) = 0.3$  ،  $f(3) = 0.2$  ،  $f(4) = 0.1$  فأوجد  $f(5)$ ، ثم اكتب دالة التوزيع الاحتمالي  $f$  للمتغير العشوائي  $X$ .

$$(1) f(5) = 1 - (0.3 + 0.2 + 0.1) = 0.4$$

دالة التوزيع الاحتمالي  $f$  للمتغير العشوائي  $X$ :

$x$	2	3	4	5
$f(x)$	0.3	0.2	0.1	0.4

(2) يحتوي صندوق على 8 كرات متماثلة منها: 5 كرات حمراء و 3 كرات صفراء سحبت 4 كرات عشوائياً معاً من الصندوق. إذا كان المتغير العشوائي  $X$  يمثل عدد الكرات الصفراء، فأوجد ما يلي:

(a) عدد عناصر فضاء العينة  $n(S)$ .

(b) مدى المتغير العشوائي  $X$ .

(c) احتمال كل عنصر من عناصر مدى المتغير العشوائي  $X$ .

(d) دالة التوزيع الاحتمالي  $f$  للمتغير العشوائي  $X$ .

$$(2) (a) n(S) = {}_8C_4 = 70$$

$$(b) X \in \{0, 1, 2, 3\}$$

$$(c) P(X = 0) = \frac{{}_5C_4}{{}_7C_4} = \frac{1}{14}$$

$$P(X = 1) = \frac{{}_5C_3 \times {}_3C_1}{{}_7C_4} = \frac{3}{7}$$

$$P(X = 2) = \frac{{}_5C_2 \times {}_3C_2}{{}_7C_4} = \frac{3}{7}$$

$$P(X = 3) = \frac{{}_5C_1 \times {}_3C_3}{{}_7C_4} = \frac{1}{14}$$

(d) دالة التوزيع الاحتمالي  $f$  للمتغير العشوائي  $X$ :

$x$	0	1	2	3
$f(x)$	$\frac{1}{14}$	$\frac{3}{7}$	$\frac{3}{7}$	$\frac{1}{14}$

(3) يبين الجدول التالي دالة التوزيع الاحتمالي لمتغير عشوائي متقطع  $X$ .

$x$	3	4	5	6
$f(x)$	$\frac{2}{11}$	$\frac{5}{11}$	$\frac{3}{11}$	$\frac{1}{11}$

أوجد:

(a) التوقع ( $\mu$ ).

(b) التباين ( $\sigma^2$ ).

(c) الانحراف المعياري ( $\sigma$ ).

$$(3) (a) \mu = 3 \times \frac{2}{11} + 4 \times \frac{5}{11} + 5 \times \frac{3}{11} + 6 \times \frac{1}{11} = \frac{47}{11}$$

إذاً، التوقع:  $\mu = \frac{47}{11}$

$$(b) \sigma^2 = 9 \times \frac{2}{11} + 16 \times \frac{5}{11} + 25 \times \frac{3}{11} + 36 \times \frac{1}{11} - \left(\frac{47}{11}\right)^2 = \frac{90}{121}$$

إذاً، التباين:  $(\sigma^2) = \frac{90}{121}$

$$(c) \sigma = \sqrt{\frac{90}{121}} = \frac{3}{11}\sqrt{10}$$

إذاً، الانحراف المعياري:  $(\sigma) = \frac{3}{11}\sqrt{10}$

مدرستي  
الكويتية  
s c h o o l - k w . c o m

(4) يبين الجدول التالي دالة التوزيع الاحتمالي  $f$  للمتغير العشوائي المتقطع  $X$ .

$x$	2	3	4	5	6
$f(x)$	0.14	0.16	0.35	0.15	0.2

أوجد باستخدام دالة التوزيع التراكمي  $F$ :  $F(1)$  ,  $F(2)$  ,  $F(3)$  ,  $F(3.5)$  ,  $F(4)$  ,  $F(5)$  ,  $F(6)$  ,  $F(7)$

$$(4) F(1) = p(X \leq 1) = 0$$

$$F(2) = p(X \leq 2) = p(X < 2) + p(X = 2) = 0.14$$

$$F(3) = p(X \leq 3) = p(X = 3) + p(X < 3) = p(X = 3) + p(X = 2) = 0.3$$

$$F(3.5) = p(X \leq 3.5) = p(X = 3) + p(X < 3) = p(X = 3) + p(X = 2) = 0.3$$

$$F(4) = p(X \leq 4) = p(X = 4) + p(X < 4) = p(X = 4) + p(X = 3) + p(X = 2) = 0.65$$

$$F(5) = p(X \leq 5) = p(X = 5) + p(X < 5) = p(X = 5) + p(X = 4) + p(X = 3) + p(X = 2) = 0.8$$

$$F(6) = p(X \leq 6) = p(X = 6) + p(X < 6) = p(X = 6) + p(X = 5) + p(X = 4) + p(X = 3) + p(X = 2) = 1$$

$$F(7) = p(X \leq 7) = p(X = 7) + p(X < 7) = p(X = 6) + p(X = 5) + p(X = 4) + p(X = 3) + p(X = 2) = 1$$

(5) ينتج مصنع أجهان 1250 علبة يوميًا، إذا كانت نسبة إنتاج العلب الفاسدة 0.04، فأوجد ما يلي لمعرفة عدد العلب الفاسدة في أحد الأيام:

(5)  $n = 1250$  ,  $p = 0.04$

(a)  $\mu = np = 1250 \times 0.04 = 50$

إذا، التوقع:  $(\mu) = 50$

(b)  $\sigma^2 = np(1-p) = 1250 \times 0.04 \times 0.96 = 48$

إذا، التباين:  $(\sigma^2) = 48$

(c)  $\sigma = \sqrt{48} = 4\sqrt{3}$

إذا، الانحراف المعياري:  $(\sigma) = 4\sqrt{3}$

(6) إذا كان  $X$  متغيرًا عشوائيًا متصلًا ودالة كثافة الاحتمال له هي:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{5} & : -2 \leq x \leq 3 \\ 0 & : \text{في ما عدا ذلك} \end{cases}$$

(a)  $P(0 \leq X \leq 3)$

(b)  $P(-2 \leq X \leq 0)$

فأوجد:

(c)  $P(X = 2)$

(d)  $P(-1 \leq X \leq 2)$

(6) (a)  $P(0 \leq X \leq 3) = 3 \times \frac{1}{5} = \frac{3}{5}$

(b)  $P(-2 \leq X \leq 0) = 2 \times \frac{1}{5} = \frac{2}{5}$

(c)  $P(X = 2) = 0$

(d)  $P(-1 \leq X \leq 2) = (2 - (-1)) \times \frac{1}{5} = \frac{3}{5}$

(7) إذا كان  $X$  متغيرًا عشوائيًا متصلًا. دالة كثافة الاحتمال له هي:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{9}{2}x & : 0 \leq x \leq \frac{2}{3} \\ 0 & : \text{في ما عدا ذلك} \end{cases}$$

(a)  $P(0 \leq X \leq \frac{1}{3})$

(b)  $P(X \geq \frac{1}{3})$

فأوجد:

(7) (a)  $x = \frac{1}{3} \therefore y = \frac{9}{2} \times \frac{1}{3} = \frac{3}{2}$

$P(0 \leq X \leq \frac{1}{3}) = \frac{1}{2} \times \frac{1}{3} \times \frac{3}{2} = \frac{1}{4}$

(b)  $P(X \geq \frac{1}{3}) = 1 - P(X < \frac{1}{3}) = 1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$

(8) الدالة  $f$  تتبع التوزيع الاحتمالي المنتظم وهي معرفة كما يلي:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{8} & : -3 \leq x \leq 5 \\ 0 & : \text{في ما عدا ذلك} \end{cases}$$

(a) أثبت أن  $f$  هي دالة كثافة احتمال.

(b)  $P(-1 \leq X \leq 3)$

(c) أوجد التوقع والتباين للدالة  $f$ .

(8) (a) المساحة تحت منحنى الدالة  $f$  هي:  $(5 - (-3)) \times \frac{1}{8} = 8 \times \frac{1}{8} = 1$

∴ الدالة  $f$  هي دالة كثافة احتمال.

(b)  $P(-1 \leq x \leq 3) = (3 - (-1)) \times \frac{1}{8} = \frac{4}{8} = \frac{1}{2}$

(c)  $\mu = \frac{a+b}{2} = \frac{-3+5}{2} = 1$

إذا، التوقع:  $(\mu) = 1$

$$\sigma^2 = \frac{(b-a)^2}{12} = \frac{(5 - (-3))^2}{12} = \frac{64}{12} = \frac{16}{3}$$

إذا، التباين:  $(\sigma^2) = \frac{16}{3}$

مدرستي  
الكويتية

(9) إذا كان  $z$  يتبع التوزيع الطبيعي المعياري للمتغير العشوائي  $X$ ، فأوجد:

(a)  $P(z \leq 2.24)$

(b)  $P(z \geq 1.52)$

(c)  $P(1.4 \leq z \leq 2.6)$

school - kw . com

(9) (a)  $P(z \leq 2.24) = 0.98745$

(b)  $P(z \geq 1.52) = 1 - P(z < 1.52) = 1 - 0.93574 = 0.06426$

(c)  $P(1.4 \leq z \leq 2.6) = P(x \leq 2.6) - P(x \leq 1.4) = 0.99534 - 0.91924 = 0.0761$

(10) يمثل المتغير  $X$  درجات الطلاب في مادة الرياضيات. إذا كان توزيع هذه الدرجات يتبع التوزيع الطبيعي الذي وسطه  $\mu = 40$  وانحرافه المعياري  $\sigma = 8$  فأوجد:

(a)  $P(30 < X < 65)$

(b)  $P(X \geq 45)$

(10) (a)  $x_1 = 30 \quad \therefore z_1 = \frac{x_1 - \mu}{\sigma} = \frac{30 - 40}{8} = -\frac{5}{4} = -1.25$

$x_2 = 65 \quad \therefore z_2 = \frac{x_2 - \mu}{\sigma} = \frac{65 - 40}{8} = \frac{25}{8} = 3.125$

$$P(30 < X < 65) = P(-0.125 < z < 3.125) = P(z < 3.125) - P(z < -1.25) \\ = \frac{0.99910 + 0.99913}{2} - 0.10565 = 0.893465$$

(b)  $X = 45 \quad \therefore z = \frac{X - \mu}{\sigma} = \frac{45 - 40}{8} = \frac{5}{8} = 0.625$

$$P(X \geq 45) = 1 - P(X < 45) = 1 - P(z < 0.625) = 1 - \frac{0.73237 + 0.73565}{2} \\ = 1 - 0.73401 = 0.26599$$

(11) إذا كانت دالة التوزيع الاحتمالي  $f$  للمتغير العشوائي  $X$  هي:

$x$	-2	-1	0	1	2
$f(x)$	0.16	0.24	$K$	0.15	0.2

فأوجد قيمة  $K$

(b)  $P(z > 0.27) = 1 - P(z \leq 0.27) = 1 - 0.60642 = 0.39358$

(12) إذا كان  $z$  يتبع التوزيع الطبيعي المعياري فأوجد:

(a)  $P(z \leq 1.45)$

(b)  $P(z > 0.27)$

(c)  $P(-1.32 \leq z \leq 1.75)$

(d)  $P(-2.87 \leq z \leq -1.42)$

(12) (a)  $P(z \leq 1.45) = 0.92647$

(b)  $P(z > 0.27) = 1 - P(z \leq 0.27) = 1 - 0.60642 = 0.39358$

(c)  $P(-1.32 \leq z \leq 1.75) = P(z \leq 1.75) - P(z \leq -1.32) = 0.95994 - 0.09342 = 0.86652$

(d)  $P(-2.87 \leq z \leq -1.42) = P(z \leq -1.42) - P(z \leq -2.87) = 0.07780 - 0.00205 = 0.07575$

مدرستي  
تمارين إثرائية  
الكويتية

(1) متغير عشوائي  $X$  يتبع توزيعاً طبيعياً توقعه  $\mu = 55$  وتباينه  $\sigma^2 = 25$ ، فأوجد:

(a)  $P(X > 55)$

(b)  $P(X < 50)$

(c)  $P(30 < X < 40)$

(1)  $\sigma^2 = 25 \therefore \sigma = 5$

(a)  $x = 55 \therefore z = \frac{x - \mu}{\sigma} = \frac{55 - 55}{5} = 0$

$P(X > 55) = 1 - P(X \leq 55) = 1 - P(z \leq 0) = 1 - 0.5 = 0.5$

(b)  $x = 50 \therefore z = \frac{x - \mu}{\sigma} = \frac{50 - 55}{5} = -\frac{5}{5} = -1$

$P(X < 50) = P(z < -1) = 0.15866$

(c)  $x_1 = 30 \therefore z_1 = \frac{x_1 - \mu}{\sigma} = \frac{30 - 55}{5} = -5$

$x_2 = 40 \therefore z_2 = \frac{x_2 - \mu}{\sigma} = \frac{40 - 55}{5} = -3$

$P(30 < X < 40) = P(-5 < z < -3) = P(z < -3) - P(z < -5)$

$= 0.00135 - 0 = 0.00135$

(2) إذا كانت دالة التوزيع الاحتمالي  $f$  للمتغير العشوائي  $X$  هي:

$x$	2	4	6	8	10	12
$f(x)$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{3}$	$K$	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{6}$

(a) أوجد  $K$ .


(b) ارسم دالة التوزيع الاحتمالي  $f$ .

(c) أوجد دالة التوزيع التراكمي  $F$ .

(d) ارسم دالة التوزيع التراكمي  $F$ .

$$(2) (a) K = 1 - \left( \frac{1}{6} + \frac{1}{3} + \frac{1}{12} + \frac{1}{12} + \frac{1}{6} \right) = \frac{1}{6}$$

(b)



$$(c) F(2) = P(X \leq 2) = P(X = 2) = \frac{1}{6}$$

$$F(4) = P(X \leq 4) = P(X = 2) + P(X = 4) = \frac{1}{2}$$

$$F(6) = P(X \leq 6) = P(X = 2) + P(X = 4) + P(X = 6) = \frac{2}{3}$$

$$F(8) = P(X \leq 8) = P(X = 2) + P(X = 4) + P(X = 6) + P(X = 8) = \frac{3}{4}$$


$$F(10) = P(X \leq 10) = P(X = 2) + P(X = 4) + P(X = 6) + P(X = 8) + P(X = 10) = \frac{5}{6}$$

$$F(12) = P(X \leq 12) = P(X = 2) + P(X = 4) + P(X = 6) + P(X = 8) + P(X = 10) + P(X = 12) = 1$$

جدول التوزيع التراكمي  $F$  للمتغير العشوائي المتقطع  $X$ :

$x$	2	4	6	8	10	12
$F(x)$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{2}{3}$	$\frac{3}{4}$	$\frac{5}{6}$	1

(d)



(3) مدفع يتبع مداه توزيعًا طبيعيًا توقعه 14 km وتباينه 1 km.

(a) ما احتمال أن تصل القذيفة إلى مسافة أبعد من 15 km؟

(b) ما احتمال أن تصل القذيفة فقط إلى مسافة أقل من 11 km؟

(c) ما احتمال أن تصل القذيفة إلى مسافة بين 13 km, 15 km؟

$$(3) \mu = 14 \quad \sigma = \sqrt{1} = 1$$

$$(a) x = 15 \therefore z = \frac{x - \mu}{\sigma} = 15 - 14 = 1$$

$$P(X > 15) = P(z > 1) = 1 - P(z \leq 1) = 1 - 0.84134 = 0.15866$$

$$(b) x = 11 \therefore z = \frac{x - \mu}{\sigma} = 11 - 14 = -3$$

$$P(X < 11) = P(z < -3) = 0.00135$$

$$(c) x_1 = 13 \therefore z_1 = \frac{x_1 - \mu}{\sigma} = 13 - 14 = -1$$

$$x_2 = 15 \therefore z_2 = \frac{x_2 - \mu}{\sigma} = 15 - 14 = 1$$

$$P(13 < X < 15) = P(-1 < z < 1) = P(z < 1) - P(z < -1)$$

$$= 0.84134 - 0.15866 = 0.68268$$

مدرستي  
الكويتية

school-kw.com

(4) إذا كان  $X$  متغيرًا عشوائيًا متصلًا، دالة كثافة الاحتمال له هي:

$$f(x) = \begin{cases} 2x & : 0 \leq x \leq 2 \\ 0 & : \text{في ما عدا ذلك} \end{cases}$$

فأوجد:

$$(a) P\left(\frac{1}{2} \leq X \leq \frac{3}{2}\right)$$

$$(b) P\left(X \geq \frac{1}{2}\right)$$

$$(4) (a) P\left(\frac{1}{2} \leq X \leq \frac{3}{2}\right) = P\left(X \leq \frac{3}{2}\right) - P\left(X \leq \frac{1}{2}\right) = f\left(\frac{3}{2}\right) - f\left(\frac{1}{2}\right)$$

$$f\left(\frac{3}{2}\right) = 2\left(\frac{3}{2}\right) = 3$$

$$f\left(\frac{1}{2}\right) = 2\left(\frac{1}{2}\right) = 1$$

$$P\left(\frac{1}{2} \leq X \leq \frac{3}{2}\right) = \frac{1}{2} \times \frac{3}{2} \times 3 - \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times 1 = 2$$

$$(b) P\left(X \geq \frac{1}{2}\right) = 1 - P\left(X < \frac{1}{2}\right) = 1 - \left(\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times 1\right) = \frac{3}{4}$$

(5) عند إلقاء حجر نرد منتظم 7 مرات متتالية، أوجد:

(a) احتمال ظهور العدد 2 خمس مرات.

(b) احتمال ظهور العدد 2 مرة واحدة على الأقل.

(c) احتمال ظهور العدد 2 مرة واحدة على الأكثر.

$$(5) n = 7, p = \frac{1}{2}$$

$$(a) P(X = 5) = {}_7C_5 \times 0.5^5 \times 0.5^2 = 0.164$$

$$(b) P(X > 0) = 1 - P(X \leq 0) = 1 - P(X = 0) = 1 - {}_7C_0 \times 0.5^0 \times 0.5^7 = 0.992$$

$$(c) P(X = 0) + P(X = 1) = 7.8125 \cdot 10^{-3} + {}_7C_1 \times 0.5^1 \times 0.5^6 = 0.0625$$

(6) إذا كان  $z$  يتبع التوزيع الطبيعي المعياري فأوجد:

$$(a) P(z \leq 2.65)$$

$$(b) P(-2.85 \leq z \leq -1.96)$$

$$(c) P(z \geq 1.56)$$

$$(6) (a) P(z \leq 2.65) = 0.99598$$

$$(b) P(-2.85 \leq z \leq -1.96) = P(z \leq -1.96) - P(z \leq -2.85) = 0.025 - 0.00219 = 0.02281$$

$$(c) P(z \geq 1.56) = 1 - P(z < 1.56) = 1 - 0.94062 = 0.05938$$

school - kw . com

(7) يبين الجدول التالي دالة التوزيع الاحتمالي  $f$  لمتغير عشوائي متقطع  $X$ .

$x$	1	2	3	4	5
$f(x)$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{6}$

أوجد:

(a) التوقع ( $\mu$ ).

(b) التباين ( $\sigma^2$ ).

(c) الانحراف المعياري ( $\sigma$ ).

$$(7) (a) \mu = 1 \times \frac{1}{6} + 2 \times \frac{1}{4} + 3 \times \frac{1}{3} + 4 \times \frac{1}{12} + 5 \times \frac{1}{6} = \frac{17}{6}$$

$$\text{إذاً، التوقع، } (\mu) = \frac{17}{6}$$

$$(b) \sigma^2 = 1 \times \frac{1}{6} + 4 \times \frac{1}{4} + 9 \times \frac{1}{3} + 16 \times \frac{1}{12} + 25 \times \frac{1}{6} - \left(\frac{17}{6}\right)^2 = \frac{59}{36}$$

$$\text{إذاً، التباين، } (\sigma^2) = \frac{59}{36}$$

$$(c) \sigma = \sqrt{\frac{59}{36}} = \frac{\sqrt{59}}{6}$$

$$\text{إذاً، الانحراف المعياري، } (\sigma) = \frac{\sqrt{59}}{6}$$

(8) يبين الجدول التالي دالة التوزيع الاحتمالي  $f$  للمتغير العشوائي المتقطع  $X$ .

$x$	3	4	5	6
$f(x)$	0.17	0.24	0.23	0.36

أوجد باستخدام دالة التوزيع التراكمي  $F$ :  $F(2)$  ,  $F(3)$  ,  $F(4)$  ,  $F(4.5)$  ,  $F(5)$  ,  $F(6)$  ,  $F(6.5)$

$$(8) F(2) = P(X \leq 2) = 0$$

$$F(3) = P(X \leq 3) = P(X < 3) + P(X = 3) = P(X = 3) = 0.17$$

$$F(4) = P(X \leq 4) = P(X < 4) + P(X = 4) = P(X = 3) + P(X = 4) = 0.41$$

$$F(4.5) = P(X \leq 4.5) = P(X < 4) + P(X = 4) = P(X = 3) + P(X = 4) = 0.41$$

$$F(5) = P(X \leq 5) = P(X < 5) + P(X = 5) = P(X = 3) + P(X = 4) + P(X = 5) = 0.64$$

$$F(6) = P(X \leq 6) = P(X < 6) + P(X = 6) = P(X = 3) + P(X = 4) + P(X = 5) + P(X = 6) = 1$$

$$F(6.5) = P(X \leq 6.5) = P(X < 6) + P(X = 6) = P(X = 3) + P(X = 4) + P(X = 5) + P(X = 6) = 1$$

