



تم تحميل الملف
من موقع **بداية**



للمزيد اكتب
في جوجل



بداية التعليمي

موقع بداية التعليمي كل ما يحتاجه الطالب والمعلم
من ملفات تعليمية، حلول الكتب، توزيع المنهج،
بوربوينت، اختبارات، ملخصات، اختبارات إلكترونية،
أوراق عمل، والكثير...

حمل التطبيق





التسمم الدوائي

المفاهيم الرئيسة:

- التسمم.
- الدواء.



يتعرض العديد من الأشخاص لحالات من التسمم، نتيجة تناول أغذية ملوثة، أو مواد كيميائية، أو استنشاقهم لبعض الأبخرة السامة، أو نتيجة لبعض العادات الخاطئة في تناول الأدوية وهو ما ينتج عنه مخاطر جسيمة تضر بصحة الجسم.

التسمم:

هو دخول أي مادة ضارة (طبيعية أو مصنعة) أو ملوثة، داخل الجسم بكمية معينة فتحدث فيه أضراراً.

طرق دخول المواد السامة إلى الجسم

موقع بداية التعليمي | beadaya.com

البلع

عن طريق الفم والجهاز الهضمي.

الاستنشاق

عن طريق الجهاز التنفسي مثل الغازات والأبخرة السامة.

الحقن

حقن الأدوية العضلي أو الوريدي أو عن طريق لسع الحشرات.

أقسام التسمم حسب المسبب

التسمم الغذائي



التسمم الكيميائي



التسمم بالأدوية



الدواء:

مادة كيميائية تساعد في علاج أو منع أو تخفيف أو تشخيص أعراض الأمراض التي تصيب الإنسان.

التسمم الدوائي:

حالة مرضية تنتج عن حدوث تسمم داخل الجسم نتيجة بعض الأسباب؛ كتناول جرعات زائدة من دواء معين أكانت بوصفة طبيب أو غير ذلك، أو تداخل بعض الأدوية، أو عندما لا تتمكن الكبد أو الكليتان من التخلص من الدواء، مما يسمح له بالتراكم في الجسم.

أسباب التسمم الدوائي



هناك عدة أسباب تؤدي إلى التسمم الدوائي منها:

١. تناول الأدوية دون استشارة الطبيب.
٢. تناول أكثر من دواء في وقت واحد بشكل خاطئ.
٣. تناول جرعات زائدة من الأدوية.
٤. التخزين غير السليم للأدوية.



يوجد أسباب أخرى للتسمم الدوائي اذكرها ؟

عدم معرفة او اتباع تعليمات الجرعة
تاريخ إساءة الاستخدام أو الإدمان
تناول الأطفال للأدوية غير المخصصة لهم عن طريق الخطأ
وجود تاريخ من الاضطرابات النفسية

يعتمد التسمم الدوائي على نوع الدواء، والجرعة التي تم تناولها، والتاريخ المرضي أو الطبي.



أنواع التسمم الدوائي

تسمم مزمن:

وينتج عن تناول الدواء مدة طويلة مما يسبب تراكم الأدوية وارتفاع مستوى السموم في جسم المريض.

تسمم حاد:

وينتج عن تناول المريض لجرعات زائدة من الدواء.

متى تظهر أعراض التسمم الدوائي؟

تختلف سرعة ظهور أعراض التسمم الدوائي بحسب نوع الدواء المتناول والكمية المتناولة، فبعض الأدوية تظهر أعراض التسمم بها خلال دقائق فقط من تناولها، في حين أن بعض الأدوية الأخرى يمكن أن يحتاج إلى ساعات؛ لذلك يجب الاتصال بالإسعاف في حالة وجود ما يدل على اشتباه حدوث تسمم دوائي، كوجود علب دواء مفتوحة وفارغة مع وجود أطفال في المنزل، ويلزم الإسراع في طلب الإسعاف حتى لو لم تظهر أعراض التسمم، تجنباً للمضاعفات.

أعراض التسمم الدوائي

انخفاض درجة حرارة الجسم، والشعور بالبرودة الشديدة.
ضيق التنفس، وقد يصل الأمر إلى توقف النفس والشعور بالاختناق.
الشعور بالغثيان والقيء.
التعرق الشديد والهلوسة في بعض الأحيان.
اضطراب الرؤية مع اتساع العينين.
تسارع ضربات القلب بشكل ملحوظ.
حدوث بعض التشنجات العضلية، والرعشة.



بعد دراستك لمفهوم التسمم الدوائي استنتج مفهوم السلامة الدوائية؟

هو أحد فروع العلوم الدوائية الجديدة نسبياً والذي يهتم بدراسة كل ما يتعلق بالآثار الجانبية للأدوية والمنتجات الصيدلانية أو أي مشاكل أخرى متعلقة باستهلاك الدواء

معلومة
إثرائية

أنشأت الهيئة العامة للغذاء والدواء نظام التتبع الدوائي ضمن خطتها؛ للمساهمة في برنامج التحول الوطني ٢٠٢٠ الذي يهدف لتحقيق «رؤية المملكة العربية السعودية ٢٠٣٠»، وذلك بتبني أحدث الوسائل التقنية واستخدامها في تتبع وتعقب جميع الأدوية البشرية المسجلة والمصنعة داخل المملكة أو المستوردة من خارجها. ويساهم النظام في تعزيز دور الهيئة في حماية المجتمع، وتعزيز الرقابة والتأكد من سلامة الأدوية وذلك من خلال معرفة مصدرها والمراحل التي مرت بها من التصنيع وحتى وصولها للمستهلك.



من خلال مشاهداتك اليومية :

قدم نصيحة تساعد في معالجة العادات الخاطئة عند تناول الأدوية مما يأتي :

(أ) الملل من تناول الدواء في الوقت نفسه كل يوم.

تناول الدواء في مواعيد المحددة وبالجرعات الموصى بها من قبل الطبيب
أساس نجاح كل علاج ؛ وتجنب حدوث آثار جانبية

موقع بداية التعليمي | beadaya.com

(ب) التوقف عن تناول الدواء عند الشعور بالتحسن.

الاستمرار في تناول الدواء طوال المدة المحددة من قبل الطبيب حتى
يقوم الدواء بوظيفته وحتى لا يتفاقم المرض

(ج) رمي ورقة التعليمات المرفقة بالدواء أو عدم الاطلاع عليها.

يجب قراءة ورقة التعليمات المرفقة بالدواء بكاملها قبل البدء في استخدام
الدواء

إرشادات قبل البدء في تناول الدواء

أخبر طبيبك أو الصيدلي عن الأمور الآتية:
أي أدوية أخرى تتناولها بما في ذلك العشبية، حيث أنه يمكن لبعض الأدوية أن تتفاعل مع بعضها إذا تم أخذها معاً، وقد تسبب مخاطر صحية.
إذا كان لديك أي حساسية من بعض الأدوية.
إذا كنت ستجري عملية جراحية.
أي معلومة لم تفهمها عن دوائك في النشرة الدوائية.

المسكنات:



تُستخدم مسكنات الألم لتقليل الآلام التي نشعر بها كالصداع أو التهاب العضلات، أو المفاصل والآلام الأخرى. والمسكنات أنواع مختلفة من حيث آلية عملها وملائمتها للحالة الصحية، وغالباً ما تكون مسكنات الألم آمنة إذا تم استخدامها بالطريقة الصحيحة، وقد يتعرض الشخص للتسمم بمسكنات الألم عندما يتناول جرعات كبيرة منها تتجاوز احتياجه، كما قد يتعرض للتسمم عندما يتناول أكثر من دواء يحتوي على نفس المادة الفعالة عن طريق الخطأ.

أقسام مسكنات الألم

المسكنات الوصفية:

لا بوصفة طبية
من الطبيب بعد مراجعة حالتك الطبية.

المسكنات اللا وصفية:

ها من
الصيدلية بدون وصفة طبية.



تنصح الهيئة العامة للغذاء والدواء دائماً باستشارة الطبيب المختص، أو الصيدلي قبل شراء أي مسكن، وقراءة واتباع تعليمات النشرة الداخلية؛ للحصول على معلومات إضافية عن الدواء.



موقع بداية التعليمي | beadaya.com

إسعاف حالات التسمم الدوائي



أولاً: قبل كل شيء يجب الاتصال بالإسعاف فوراً.

ثانياً: أثناء انتظار الإسعاف، افحص المصاب إن كان واعياً، وانقله إلى مكان مريح، وراقب نبضه وتنفسه وحرارته، وفي حال توقف المصاب عن التنفس فبادر بعمل الإنعاش الرئوي حتى وصول الإسعاف.

تذكّر

يعد التسمم الدوائي حالة مرضية تحتاج إلى تدخل طبي طارئ؛ وذلك لمنع حدوث المضاعفات الصحية الخطيرة.




حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من منتجات و خلطات غذائية، يتم تسويقها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي وتحمل ادعاءات صحية أو تغذوية غير صحيحة مثل: خلطات التسمين أو التنحيف.

بالتعاون مع مجموعتك وضع أسباب هذا التحذير:

لأنه لوحظ احتواء بعضها على مواد دوائية لا تستخدم إلا بوصفة طبية

بداية

موقع بداية التعليمي | beadaya.com



التسمم الدوائي عند الأطفال



يشكل الأطفال النسبة الأكبر من المصابين بالتسمم الدوائي عن طريق الخطأ، وخصوصاً من هم دون الخامسة من العمر؛ بسبب وضعهم لأي شيء يجدونه أمامهم في أفواههم وخاصة الأدوية التي قد تشبه الحلوى في نظرهم.

الإجراءات الوقائية لحماية الأطفال من التسمم الدوائي

١. عدم إعطاء أي دواء للأطفال، دون استشارة أحد مقدمي الرعاية الصحية المختصين.
٢. الحرص دائماً على استخدام المقاييس الصحيحة لحساب جرعات الأدوية السائلة مثل: الأغطية الصغيرة المرفقة مع الدواء، قطارة الفم.
٣. احفظ الأدوية في مكان بعيد عن متناول أيدي الأطفال وخصوصاً عند وضع الدواء في الثلاجة.
٤. تأكد من حفظ الأدوية في عبواتها الأصلية في مكان محكم الإغلاق.
٥. استخدم الأدوية التي تتميز بوجود أغطية السلامة، وتأكد من أحكام غلقها جيداً بعد كل استخدام.
٦. احرص على عدم تسمية الدواء الذي يعطى للأطفال بالحلوى أو المسميات التي ترغبهم في تناول الدواء.
٧. التأكيد على الأطفال بعدم تناول أو شرب أي دواء إلا تحت إشراف شخص بالغ.
٨. لا تتناول الدواء أمام الأطفال تجنباً لتقليدهم لك.
٩. تأكد من تخلصك من الأدوية الإضافية أو الأدوية منتهية الصلاحية.



يُقدم دواء باراسيتامول للأطفال كمسكن للألام الخفيفة والمتوسطة وخافض للحرارة، وقد صممت الهيئة العامة للغذاء والدواء حاسبة تستخدم لحساب الجرعة الصحيحة للدواء على شكل شراب أو قطرات عن طريق الفم.

معلومة
إثرائية



ماذا تفعل في حالة الاشتباه بتسمم أحد الأطفال في المنزل؟

(١) اتصل على ٩٩٧ (الإسعاف) أو ٩٣٧ (وزارة الصحة) .

(٢) تحقق من أن الطفل يتنفس بشكل طبيعي.




اقترح طرقاً للتخلص من (الأدوية الإضافية أو الأدوية منتهية الصلاحية) بطريقة آمنة؟

التخلص من جميع الأدوية في علبها الأصلية ؛ والحرص أن تكون العلب محكمة الإغلاق و عدم نثر الأقراص
وضع زجاجات الأدوية السائلة المتبقي فيها كمية من الدواء في أكياس بلاستيكية وربطها جيداً كي لا يتسرب الدواء في حال انكسار الزجاجات
وضع جميع الأدوية في حاوية مهملات مغلقة المسارعة بالتخلص من محتويات سلة المهملات المحتوية على الأدوية الموجودة بالمنزل إلى تلك الأخرى الموجودة بالشارع ليتم تفرغها من قبل عمال النظافة

نشاط (ب):

الدخول على خدمة الإبلاغ
اختيار نم وذج
تعبئة النم وذج
إرسال البلاغ للمختصين



نشاط (أ):

الدواء	الصلاحية بعد الفتح
الأقراص والكبسولات (التي تأتي بشريط معدني).	كما هو موجود على أحد طرفي الشريط المعدني
الاسبرين الفوار.	شهر واحد من تاريخ صرفها
قطرات أو مراهم (العين-الأذن- الأنف).	28 يوما من الفتح
بخاخ الربو.	تاريخ الصلاحية المكتوب على العبوة
السوائل الفموية.	6 أشهر من الفتح
	المضادات الحيوية

التأكد من الصيدلاني
عن تاريخ الصلاحية إن
لم تكن موضحة

