

مدرسة التميز النموذجية

(ابتدائي - متوسط - ثانوي)



بنك الأسئلة

الإحصاء

الصف الحادي عشر
أدبي



خمسة وعشرون عاماً من التميز

2025 / 2024
الفصل الدراسي الأول



الإحصاء

(أ) بسط كلا مما يلي :

$$(١) \sqrt[١٠]{٤٩ \text{ س } ٤ \text{ ص}}$$

الإجابة:

$$\sqrt[١٠]{٤٩ \text{ س } ٤ \text{ ص}} = \sqrt[١٠]{٧^٢ (٢ \text{ س } ٢) (٢ \text{ ص } ٢)}$$

$$= \sqrt[١٠]{٧^٢ \text{ س } ٢ \text{ ص } ٢ \text{ س } ٢ \text{ ص } ٢}$$

$$= \sqrt[١٠]{٧^٢ \text{ س } ٢ \text{ ص } ٢ \text{ س } ٢ \text{ ص } ٢}$$

$$= \sqrt[١٠]{٧^٢ \text{ س } ٢ \text{ ص } ٢ \text{ س } ٢ \text{ ص } ٢}$$

(ب) اقسم ثم بسط ما يلي :

$$\frac{\sqrt[٣]{١٢٨ \text{ س } ١٠}}{\sqrt[٣]{٢ \text{ س } ٢}}$$

حيث $١٠ \neq ٠$

الإجابة:

$$\frac{\sqrt[٣]{١٢٨ \text{ س } ١٠}}{\sqrt[٣]{٢ \text{ س } ٢}} = \frac{\sqrt[٣]{١٢٨ \text{ س } ١٠}}{\sqrt[٣]{٢ \text{ س } ٢}}$$

$$= \sqrt[٣]{\frac{١٢٨ \text{ س } ١٠}{٢ \text{ س } ٢}}$$

$$= \sqrt[٣]{\frac{١٢٨ \text{ س } ١٠}{٢ \text{ س } ٢}}$$

$$= \sqrt[٣]{\frac{١٢٨ \text{ س } ١٠}{٢ \text{ س } ٢}}$$

$$= \sqrt[٣]{\frac{١٢٨ \text{ س } ١٠}{٢ \text{ س } ٢}}$$

$$(1) \quad \sqrt[3]{2 \text{ ص}^2} \times \sqrt[3]{4 \text{ ص}^3}$$

$$\text{الحل:} \quad \sqrt[3]{2 \times 4 \times \text{ص}^2 \times \text{ص}^3} =$$

$$\sqrt[3]{8 \text{ ص}^5} =$$

$$\sqrt[3]{(2 \times 2 \times 2) \times (\text{ص} \times \text{ص} \times \text{ص})} =$$

$$\sqrt[3]{(2 \times 2 \times 2) \times (\text{ص} \times \text{ص} \times \text{ص})} =$$

$$\sqrt[3]{(2 \times 2 \times 2) \times (\text{ص} \times \text{ص} \times \text{ص})} =$$

$$\sqrt[3]{(2 \times 2 \times 2) \times (\text{ص} \times \text{ص} \times \text{ص})} =$$

$$(ب) \text{ اوجد ناتج } \sqrt[3]{75} - \sqrt[3]{27} + \sqrt[3]{12} \quad (\text{موضحا خطوات الحل})$$

$$\sqrt[3]{75} - \sqrt[3]{27} + \sqrt[3]{12}$$

$$\sqrt[3]{3 \times 5 \times 5} - \sqrt[3]{3 \times 3 \times 3} + \sqrt[3]{2 \times 2 \times 3}$$

$$\sqrt[3]{3 \times 5 \times 5} - \sqrt[3]{3 \times 3 \times 3} + \sqrt[3]{2 \times 2 \times 3}$$

$$\sqrt[3]{3 \times 5 \times 5} - \sqrt[3]{3 \times 3 \times 3} + \sqrt[3]{2 \times 2 \times 3}$$

$$\sqrt[3]{3 \times 5 \times 5} - \sqrt[3]{3 \times 3 \times 3} + \sqrt[3]{2 \times 2 \times 3}$$

$$\text{بسط ما يأتي:} \quad \sqrt[3]{2 \text{ ص}^2} \times \sqrt[3]{4 \text{ ص}^3}$$

الإجابة:

$$\sqrt[3]{2 \text{ ص}^2} \times \sqrt[3]{4 \text{ ص}^3}$$

$$\sqrt[3]{2 \text{ ص}^2 \times 4 \text{ ص}^3} =$$

$$\sqrt[3]{2 \times 4 \times \text{ص}^2 \times \text{ص}^3} =$$

$$\sqrt[3]{(2 \times 2 \times 2) \times (\text{ص} \times \text{ص} \times \text{ص})} =$$

$$\sqrt[3]{(2 \times 2 \times 2) \times (\text{ص} \times \text{ص} \times \text{ص})} =$$



(ب) أوجد ناتج ما يلي في أبسط صورة :-

$$\sqrt[3]{16} + \sqrt[3]{54} + \sqrt[3]{125}$$

الحل :-

$$\sqrt[3]{2 \times 2 \times 2} + \sqrt[3]{2 \times 3 \times 3 \times 3} + \sqrt[3]{5 \times 5 \times 5} =$$

$$2 + 6 + 5 =$$

$$2 + 6 + 5 =$$

$$2 + 6 + 5 =$$

$$2 + 6 + 5 =$$

ضع في أبسط صورة :

$$\frac{25 \times \frac{2}{5} (32)}{4 \times \frac{1}{3} (125)}$$

$$\frac{25 \times \frac{2}{5} (32)}{4 \times \frac{1}{3} (125)} =$$

$$\frac{25 \times 32}{4 \times 125} =$$

$$10 = 5 \times 2 =$$



(أ) أوجد ناتج ما يلي في أبسط صورة :

$$\frac{45}{\sqrt{6}} - \frac{20}{\sqrt{2}} + \frac{125}{\sqrt{5}}$$

الإجابة:

$$\frac{45}{\sqrt{6}} - \frac{20}{\sqrt{2}} + \frac{125}{\sqrt{5}}$$

$$\frac{5 \times 9}{\sqrt{6}} - \frac{5 \times 4}{\sqrt{2}} + \frac{5 \times 25}{\sqrt{5}} =$$

$$\frac{5 \times 3^2}{\sqrt{6}} - \frac{5 \times 2^2}{\sqrt{2}} + \frac{5 \times 5^2}{\sqrt{5}} =$$

$$\frac{5 \sqrt{3 \times 6}}{\sqrt{6}} - \frac{5 \sqrt{2}}{\sqrt{2}} + \frac{5 \sqrt{5}}{\sqrt{5}} =$$

$$\frac{5 \sqrt{18}}{\sqrt{6}} - \frac{5 \sqrt{2}}{\sqrt{2}} + \frac{5 \sqrt{5}}{\sqrt{5}} =$$

$$\frac{5 \sqrt{11}}{\sqrt{6}} - \frac{5 \sqrt{2}}{\sqrt{2}} + \frac{5 \sqrt{5}}{\sqrt{5}} =$$

$$\frac{2}{5} (32) \times \frac{3,5}{4} (2)$$

الإجابة:

$$\frac{2}{5} (32) \times \frac{7}{2} (\frac{4}{2}) = \frac{2}{5} (32) \times \frac{3,5}{4} (\frac{4}{2})$$

$$\frac{2}{5} (52) \times \frac{7}{2} (22) =$$

$$22 \times 72 =$$

$$1584 =$$

$$512 =$$

(أ) اختصر ما يلي بحيث يكون المقام عددا نسبيا

$$\frac{\sqrt{5}-2}{\sqrt{5}+3}$$

$$\begin{aligned} \frac{(\sqrt{5}-3) \times (\sqrt{5}-2)}{(\sqrt{5}-3) \times (\sqrt{5}+3)} &= \frac{\sqrt{5}-2}{\sqrt{5}+3} \\ \frac{0 + \sqrt{5} - 3 - 6}{5 - 9} &= \\ \frac{\sqrt{5} - 11}{-4} &= \end{aligned}$$

(ب) اختصر ما يلي بحيث يكون المقام عددا نسبياً :

$$\frac{\sqrt{7}-2}{\sqrt{7}+3}$$

الحل:

$$\begin{aligned} \frac{\sqrt{7}-3}{\sqrt{7}-3} \times \frac{\sqrt{7}-2}{\sqrt{7}+3} &= \\ \frac{\sqrt{7} - 3 - \sqrt{7} - 2 - \sqrt{7} \times \sqrt{7} + 6}{(\sqrt{7})^2 - 3^2} &= \\ \frac{\sqrt{7} - 5 - 7 + 6}{7 - 9} &= \\ \frac{\sqrt{7} - 6}{-2} &= \end{aligned}$$



(أ) اختصر $\frac{8}{\sqrt{5} + 3}$ بحيث يكون المقام عددا نسبيا.

الحل:

$$\begin{aligned} \frac{\sqrt{5}-3}{\sqrt{5}-3} \times \frac{8}{\sqrt{5}+3} &= \\ \frac{(\sqrt{5}-3) \times 8}{(\sqrt{5}-3)(\sqrt{5}+3)} &= \\ \frac{\sqrt{5}8 - 24}{5-9} &= \\ \frac{\sqrt{5}8 - 24}{-4} &= \end{aligned}$$

$$(2) \quad \frac{\frac{1}{5}(27) \times \frac{2}{3}(8)}{\frac{3}{5}(3)}$$

الحل:

$$\begin{aligned} \frac{\frac{1}{5}(27) \times \frac{2}{3}(8)}{\frac{3}{5}(3)} &= \\ \frac{27 \times 16}{3 \times 3} &= \\ \frac{432}{9} &= \\ 48 &= \end{aligned}$$

$$(ب) \text{ بسط ما يلي: } \frac{\frac{1}{2}(49) \times \frac{3}{4}(16)}{\frac{2}{5}(32)}$$

الإجابة:

$$\frac{\frac{1}{2}(49) \times \frac{3}{4}(16)}{\frac{2}{5}(32)} = \frac{\frac{1}{2}(49) \times \frac{3}{4}(16)}{\frac{2}{5}(32)}$$

$$\begin{aligned} 7 \times 6 &= \frac{7 \times 24}{24} = \\ 14 &= \end{aligned}$$

(ب) في إحدى الشركات يوجد ٤٠٠ موظف موزعين كما يبين الجدول أدناه :

عمال	مهندسون	المجموع
٣٠٠	١٠٠	٤٠٠
١ إلى ٣٠٠	٣٠١ إلى ٤٠٠	الترقيم

المطلوب سحب عينة عشوائية طبقية مكونة من ٨ موظفين باستخدام جدول الأعداد العشوائية ابتداء من الصف الأول و العمود الخامس .

الإجابة:

$$\text{كسر المعاينة} = \frac{\text{حجم العينة}}{\text{حجم المجتمع الإحصائي}}$$

$$0,02 = \frac{8}{400} =$$

$$\text{حجم عينة العمال} = 300 \times 0,02 = 6$$

$$\text{حجم عينة المهندسون} = 100 \times 0,02 = 2$$

باستخدام جدول الأعداد العشوائية فإن

ترقيم عينة العمال هي: ١٢٥ ، ٨٤ ، ٨٢ ، ١٥٨ ، ٩٤ ، ١٢٤

ترقيم عينة المهندسون هي: ٣٣٠ ، ٣٤١

(أ) في إحدى المدارس يوجد ١٢٠ طالب في الصف الحادي عشر أدبي مرقمين من ١ إلى ١٢٠، المطلوب سحب عينة عشوائية منتظمة مكونة من ٦ طلاب باستخدام جدول الأعداد العشوائية ابتداءً من الصف الثاني والعمود الثالث .

الإجابة:

$$\text{طول الفترة} = \frac{\text{حجم المجتمع الإحصائي}}{\text{حجم العينة}}$$

$$٢٠ = \frac{١٢٠}{٦} =$$

أول عدد عشوائي هو ٧

تتكون العينة العشوائية المنتظمة من الطلاب حيث ترقمهم بالأعداد التالية:

٧ ، ٢٧ ، ٤٧ ، ٦٧ ، ٨٧ ، ١٠٧

(ب) مجتمع مكون من ٢٠٠ طبيب مرقمين من (١) إلى (٢٠٠) و ٤٠٠ ممرض مرقمين من (٢٠١) إلى (٦٠٠) المطلوب سحب عينة عشوائية طبقية مكونة من ٦ أفراد باستخدام جدول الأعداد العشوائية ابتداءً من الصف الثاني والعمود الخامس . (٦ درجات)

الحل:

$$\text{أولاً: كسر المعانيب} = \frac{\text{حجم العينة}}{\text{حجم المجتمع الإحصائي}}$$

$$= \frac{٦}{٢٠٠} = ٠.٠٣$$

$$\text{ثانياً: حجم العينة الطبيبة} = \text{كسر المعانيب} \times \text{حجم الطبقة المناظرة}$$

$$\text{حجم عينة الأطباء} = ٠.٠٣ \times ٢٠٠ = ٦$$

$$\text{حجم عينة الممرضين} = ٠.٠٣ \times ٤٠٠ = ٦$$

ثالثاً: نستخدم جدول الأعداد العشوائية ليعبر بالرقم:

الأطباء: ٨٢٤٨٤

الممرضين: ٥٧٧٠٥٨١٢٤٩٧٢٤٦٣

(أ) في إحدى المصانع في دولة الكويت كان عدد الموظفين ٣٠٠ موظف مرقمين من ٦٠١ إلى ٩٠٠ والمطلوب سحب عينة عشوائية بسيطة مكونة من ٤ موظفين باستخدام جدول الأعداد العشوائية ابتداءً من الصف العاشر والعمود الرابع عشر .

الحل:

باستخدام جدول الأعداد العشوائية

٣٨٥٠٦٨٦٠٠٧٠٥٧٠٦٨٣


(ب) أكمل الجدول التالي بإيجاد كل من التكرار النسبي والتكرار النسبي المنوي :

الفئة	- ١	- ١٠	- ٢٠	- ٣٠	- ٤٠	المجموع
التكرار	٣	٥	٩	٧	١	٢٥
التكرار النسبي	$\frac{٣}{٢٥}$	$\frac{٥}{٢٥}$	$\frac{٩}{٢٥}$	$\frac{٧}{٢٥}$	$\frac{١}{٢٥}$	١
التكرار النسبي المنوي	%١٢	%٢٠	%٣٦	%٢٨	%٤	١٠٠

يبين الجدول التالي إنتاج زيت الوقود (ألف برميل / يوم) في دولة ما .

السنة	٢٠٠٦	٢٠٠٧	٢٠٠٨	٢٠٠٩	٢٠١٠
الإنتاج (ألف برميل/يوم)	١٥٠	٢٥٠	٢٠٠	٤٠٠	٣٥٠

مثل هذه البيانات باستخدام الخط المنكسر




يبين الجدول التالي توزيع تكراري لدرجات ٢٠ طالب في أحد الاختبارات .

الفئة	- ١٠	- ٢٠	- ٣٠	- ٤٠	المجموع
التكرار	٤	٦	٨	٢	٢٠
أقل من الحد الأعلى للفئة	أقل من ٢٠	أقل من ٣٠	أقل من ٤٠	أقل من ٥٠	
التكرار المتجمع الصاعد	٤	١٠	١٨	٢٠	

(١) أكمل الجدول السابق لإيجاد التكرار المتجمع الصاعد .

التكرار المتجمع الصاعد

(٢) ارسم مضع التكرار المتجمع الصاعد .





المجال الدراسي : الرياضيات
الزمن : ساعتان و ١٥ دقيقة
عدد الصفحات : ٨

دولة الكويت
وزارة التربية
التوجيه الفني العام للرياضيات
نموذج إجابة امتحان الفترة الدراسية الأولى للصف الحادي عشر أدبي للعام الدراسي : ٢٠٢٣/٢٠٢٢ م

القسم الأول – أسئلة المقال
تراعى الحلول الأخرى في جميع الأسئلة

السؤال الأول : (٧ درجات)

(٤ درجات)

(أ) أوجد الناتج في أبسط صورة :

$$\sqrt{8} - \sqrt{50} + \sqrt{72}$$

$$1\frac{1}{2}$$

$$2 \times 4 \sqrt{} - 2 \times 25 \sqrt{} + 2 \times 36 \sqrt{} = \sqrt{8} - \sqrt{50} + \sqrt{72}$$

$$1\frac{1}{2}$$

$$2 \times 2^2 \sqrt{} - 2 \times 5^2 \sqrt{} + 2 \times 6^2 \sqrt{} =$$

$$\frac{1}{2}$$

$$2 \sqrt{2} - 2 \sqrt{5} + 2 \sqrt{6} =$$

$$\frac{1}{2}$$

$$2 \sqrt{9} =$$





تابع نموذج إجابة امتحان الفترة الدراسية الأولى للصف الحادي عشر أدبي - الرياضيات - العام الدراسي ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣ م

تابع السؤال الأول :

(ب) يبين الجدول التالي حركة الاتصالات الهاتفية التي يتلقاها أحد مكاتب الخدمات حيث العمل


من الساعة الثامنة صباحاً إلى الساعة السادسة مساءً (٣ درجات)

فترة تسجيل الاتصالات	٨ : ٠٠ -	١٠ : ٠٠ -	١٢ : ٠٠ -	١٤ : ٠٠ -	١٦ : ٠٠ -
عدد الاتصالات المسجلة (التكرار)	١٥	٤١	٧٥	٦٠	٣٤
أقل من الحد الأعلى للفئة	أقل من ١٠	أقل من ١٢	أقل من ١٤	أقل من ١٦	أقل من ١٨
التكرار المتجمع الصاعد	١٥	٥٦	١٣١	١٩١	٢٢٥

(١) أكمل الجدول السابق بإضافة التكرار المتجمع الصاعد.

(٢) ارسم المنحنى التكراري المتجمع الصاعد.

التكرار المتجمع





تابع نموذج إجابة امتحان الفترة الدراسية الأولى للصف الحادي عشر أدبي - الرياضيات - العام الدراسي ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣ م

السؤال الثاني : (٧ درجات)

(٣ درجات)

(أ) أوجد الناتج في أبسط صورة :

حيث $s \neq 0$ ، $s < 0$

$$\frac{s \times \frac{2}{3}}{s \times \frac{1}{3} \times \frac{3}{4}}$$

١+١

١

$$s \times \frac{2}{3} = \frac{s \times \frac{2}{3} \times \frac{1}{3} \times \frac{3}{4}}{s \times \frac{1}{3} \times \frac{3}{4}}$$

$$= \frac{s \times \frac{2}{3} \times \frac{1}{3} \times \frac{3}{4}}{s \times \frac{1}{3} \times \frac{3}{4}}$$

$$= \frac{s \times \frac{2}{3} \times \frac{1}{3} \times \frac{3}{4}}{s \times \frac{1}{3} \times \frac{3}{4}}$$





تابع نموذج إجابة امتحان الفترة الدراسية الأولى للصف الحادي عشر أدبي - الرياضيات - العام الدراسي ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣ م

تابع السؤال الثاني :

(ب) في أحد المصانع حيث عدد العمال ٤٠٠ مرقمين من ١ إلى ٤٠٠ أراد صاحب هذا المصنع مناقشة هؤلاء العمال حول كيفية تحسين الأداء وزيادة الإنتاج .
المطلوب سحب عينة عشوائية منتظمة حجمها ٥ مستخدماً جدول الأعداد العشوائية ابتداء من الصف الثامن والعمود العاشر .
(٤ درجات)

١	$\text{طول الفترة} = \frac{\text{حجم المجتمع الإحصائي}}{\text{حجم العينة}} = \frac{400}{5} = 80$
١	باستخدام جدول الأعداد العشوائية نجد العدد ٣١ فتكون الأعداد كما يلي : ٣١
$4 \times \frac{1}{4}$	$\left\{ \begin{array}{l} 111 = 80 + 31 \\ 191 = 80 + 111 \\ 271 = 80 + 191 \\ 351 = 80 + 271 \end{array} \right.$

العينة العشوائية المنتظمة تتكون من العمال حيث ترقيمهم بالأعداد التالية
٣٥١ ، ٢٧١ ، ١٩١ ، ١١١ ، ٣١





تابع نموذج إجابة امتحان الفترة الدراسية الأولى للصف الحادي عشر أدبي - الرياضيات - العام الدراسي ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣ م

السؤال الثالث : (٧ درجات)

(٤ درجات)

(أ) بسط التعبير الجذري :

$$(\sqrt[3]{-3} - 3)(\sqrt[3]{3} + 4)$$

١+١	$3 - \sqrt[3]{3} \times 3 + \sqrt[3]{3} \times 4 - 3 \times 4 = (\sqrt[3]{-3} - 3)(\sqrt[3]{3} + 4)$
١	$3 - \sqrt[3]{3} - 12 =$
١	$\sqrt[3]{3} - 9 =$





تابع نموذج إجابة امتحان الفترة الدراسية الأولى للصف الحادي عشر أدبي - الرياضيات - العام الدراسي ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣ م

تابع السؤال الثالث :

(ب) في أحد الأندية الكبيرة في دولة الكويت كان عدد العمال ٢٠٠ عامل مرقمين (٣ درجات)
من ٢٠١ إلى ٤٠٠ ، المطلوب سحب عينة عشوائية بسيطة مكونة من ٦ عمال لدراسة
المستوى الفني للعمال باستخدام جدول الأعداد العشوائية ابتداء من الصف الأول والعمود
الثاني.

العمال حاملو الأعداد التالية يشكلون عينة عشوائية بسيطة :

٢٨٥ ، ٣١٠ ، ٣٧١ ، ٣٥٦ ، ٣٢١ ، ٣٨٣

$$6 \times \frac{1}{4}$$





تابع نموذج إجابة امتحان الفترة الدراسية الأولى للصف الحادي عشر أدبي - الرياضيات - العام الدراسي ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣ م

القسم الثاني : البنود الموضوعية

أولاً: في البنود من (١) إلى (٣) عبارات ظلل في ورقة الإجابة (أ) إذا كانت العبارة صحيحة (ب) إذا كانت العبارة خاطئة



(١) إذا كانت $s = 2 - \frac{3}{2}$ ، $v = \frac{3}{4}(16)$ فإن $v \times s = 1$

(٢) $\frac{3}{27} = \frac{9}{27} \times \frac{1}{37}$

(٣) في البيانات التالية : ١٠ ، ١٢ ، ١٣ ، ١٥ ، ١٢ ، ١٠ ، ١٧ ، ١٨ ، ١٢ ، ١٧ ، ١٨ ، ١٥

١٣ ، ١٢ ، ١٨ ، ١٠ ، ١٧ ، ١٢ ، ١٣ التكرار النسبي للعدد ١٢ هو ٠,٢٥ .

ثانياً : في البنود من (٤) إلى (٧) لكل بند أربع اختيارات واحدة فقط صحيحة ظلل في ورقة الإجابة الرمز الدال على الإجابة الصحيحة

(٤) العدد $\sqrt[3]{4}$ مرافق لـ

(د) $\sqrt[4]{3}$

(ج) $\sqrt[2]{3}$

(ب) $\sqrt[7]{4}$

(أ) $\sqrt[24]{3}$

(٥) إذا كان الجدول التالي يبين النسبة المئوية لتكرار القيم : ١٠ ، ١٢ ، ١٤ ، ١٦

القيمة	١٠	١٢	١٤	١٦	المجموع
النسبة المئوية لتكرار القيم	١٥%	ك	١٥%	٤٠%	١٠٠%

فإن ك =

(د) ١٠٠%

(ج) ٣٠%

(ب) ٤٠%

(أ) ١٥%

(٦) عدد أفراد العائلة هو متغير

(أ) كيفي إسمي (ب) كيفي مرتب (ج) كمي مستمر (د) كمي متقطع

(٧) إذا كان حجم المجتمع الإحصائي يساوي ١٠٠٠ وكسر المعاينة يساوي ٠,٠٨ فإن حجم العينة يساوي

(د) ١٨

(ج) ٨٠

(ب) ١٨٠

(أ) ٩٠

"انتهت الأسئلة"






تابع نموذج إجابة امتحان الفترة الدراسية الأولى للصف الحادي عشر أدبي - الرياضيات - العام الدراسي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ م

ورقة إجابة البنود الموضوعية

رقم السؤال	الإجابة
(١)	أ
(٢)	أ
(٣)	أ
(٤)	أ
(٥)	أ
(٦)	أ
(٧)	أ



لكل بند درجة واحدة فقط