

المملكة العربية السعودية
وزارة التربية والتعليم
الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان
مكتب التربية والتعليم في محافظة صامطة
مدرسة النجامية الثانوية



أوراق عمل الكيمياء

الصف الثالث الثانوي

الفصل الدراسي الأول

للعام ١٤٣٥ / ١٤٣٦ هـ

الفصل الرابع

الاتزان الكيميائي

اعداد المعلم / أحمد بن علي النجمي

الفكرة العامة : يصل الكثير من التفاعلات إلى حالة من الاتزان الكيميائي حيث تتكون كل من المواد المتفاعلة والنواتجة بسرعات متساوية.

الفصل الرابع	الاتزان الكيميائي		الصف ٣
	حالة الاتزان الديناميكي 1 - 4		المادة كيمياء
تقويم ختامي للدرس		تعابير الاتزان	Equilibrium Expressions
اسم الطالب	الدرجة		
	١٠		
37 الزمن : ١٠ دقائق			
أجب عن جميع الأسئلة التالية :			
نعبر عن الاتزان :			
٢. تكتب تعابير الاتزان للأنظمة المتزنة.	التفاعلات الغير مستهلكة و حالة الاتزان	* بعض الأنظمة الكيميائية ميلها قليل للتفاعل. وتستمر أنظمة أخرى حتى تكتمل التفاعل. * في بعض التفاعلات تكون كمية النواتج أقل من المتوقع (علل) لأن هذه التفاعلات تصل إلى قبل بعض المتفاعلات.	
	نص قانون الاتزان الكيميائي	قدم وطور الكيميائيان النرويجيان كاتو ماكسمليان جولدبرج وبيتر ويج. عند درجة حرارة يمكن للتفاعل الكيميائي أن يصل إلى تصبح فيها تراكيز المتفاعلات والنواتج	
	تعبر ثابت الاتزان K_{eq}	معادلة التفاعل العامة لتفاعل في حالة اتزان كما يلي : $aA + bB \rightleftharpoons cC + dD$ تمثل $[A]$ و $[B]$ التراكيز المولارية للمتفاعلات. تمثل $[C]$ و $[D]$ التراكيز المولارية للنواتج. تمثل a و b و c و d معاملات المعادلة الموزونة. $K_{eq} = \frac{[C]^c [D]^d}{[A]^a [B]^b}$	
	ثابت الاتزان K_{eq}	هو القيمة العددية لنسبة تراكيز حاصل ضرب إلى حاصل ضرب تراكيز ويرفع كل تركيز إلى مساو للمعامل الخاص به في المعادلة الموزونة.	
	دلالة قيمة ثابت الاتزان	إذا كان تركيز النواتج أكبر من تركيز المتفاعلات عند الاتزان فإن $K_{eq} \dots\dots\dots 1$ إذا كان تركيز المتفاعلات أكبر من تركيز النواتج عند الاتزان فإن $K_{eq} \dots\dots\dots 1$	
	أنواع الاتزان	١- الاتزان ٢- الاتزان	
	نعبر عن الاتزان المتجانس :		
	الاتزان المتجانس	هو حالة تكون فيها المواد المتفاعلة والناتجة في حالة فيزيائية مثال $H_2(g) + I_2(g) \rightleftharpoons 2HI(g)$ لاحظ أن جميع المواد في الحالة التعبير عن ثابت الاتزان $K_{eq} = \frac{[HI]^2}{[H_2][I_2]}$	
مثال 1. 4 : ص 123 نعبر عن ثابت الاتزان للتفاعلات المتجانسة.			
- تنتج ملايين الأطنان من الأمونيا NH_3 لاستعمالها في صناعة المتفجرات والأسمدة والألياف الصناعية ويمكن أن تستعمل الأمونيا منظفا منزليا فهي مفيدة جدا في تنظيف الزجاج . وتصنع الأمونيا من عناصرها الهيدروجين والنيتروجين باستعمال طريقة هابر.			
اكتب تعبير ثابت الاتزان للتفاعل الآتي : $N_2(g) + 3H_2(g) \rightleftharpoons 2NH_3(g)$			
$K_{eq} = \frac{[NH_3]^2}{[N_2][H_2]^3}$			
نعبر عن :			
1 - اكتب تعابير ثابت الاتزان للمعادلات الآتية :			
$2H_2S(g) \rightleftharpoons 2H_2(g) + S_2(g)$ - b	$N_2O_4(g) \rightleftharpoons 2NO_2(g)$ - a	$K_{eq} =$	
		$K_{eq} =$	

$4\text{NH}_3(\text{g}) + 5\text{O}_2(\text{g}) \rightleftharpoons 4\text{NO}(\text{g}) + 6\text{H}_2\text{O}(\text{g})$	- d	$\text{CO}(\text{g}) + 3\text{H}_2(\text{g}) \rightleftharpoons \text{CH}_4(\text{g}) + \text{H}_2\text{O}(\text{g})$	- c
$K_{\text{eq}} =$		$K_{\text{eq}} =$	
$\text{CH}_4(\text{g}) + 2\text{H}_2\text{S}(\text{g}) \rightleftharpoons \text{CS}_2(\text{g}) + 4\text{H}_2(\text{g})$ - e			
$K_{\text{eq}} =$			
2 - اكتب المعادلة الكيميائية التي تمثل تعبير ثابت الاتزان الآتي :			
$K_{\text{eq}} = \frac{[\text{CO}]^2 [\text{O}_2]}{[\text{CO}_2]^2}$			

نماذج الاتزان غير المتجانس :

هو حالة تكون فيها المواد المتفاعلة والناجمة في من حالة فيزيائية واحدة.	الاتزان غير المتجانس
تراكيز السوائل (I) والمواد الصلبة (S) النقية تحذف من تعبير ثابت الاتزان (علل) لأن تركيزها يبقى ثابتا مهما كانت كميتها صغيرة أو كبيرة . لذا يدمج تركيزها مع قيمة K_{eq} .	ملاحظة
$\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}(\text{l}) \rightleftharpoons \text{C}_2\text{H}_5\text{OH}(\text{g})$ $K_{\text{eq}} = [\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}]$ هنا تركيز المادة لم يكتب.	مثال تطبيقي
$\text{I}_2(\text{s}) \rightleftharpoons \text{I}_2(\text{g})$ $K_{\text{eq}} = [\text{I}_2]$ هنا تركيز المادة لم يكتب.	

مثال 2. 4 : ص 125 نماذج ثابت الاتزان غير المتجانس.

- تستعمل صودا الخبز . كربونات الصوديوم الهيدروجينية في الخبز ومضادا للحموضة وفي التنظيف كما أنها توضع في أوعية مفتوحة في الثلاجات لإبقاء الجو منعشا .

اكتب تعبير ثابت الاتزان لتحلل صودا الخبز :

$$2\text{NaHCO}_3(\text{s}) \rightleftharpoons \text{Na}_2\text{CO}_3(\text{s}) + \text{CO}_2(\text{g}) + \text{H}_2\text{O}(\text{g})$$

$K_{\text{eq}} = [\text{CO}_2][\text{H}_2\text{O}]$

نمريبات :

3 - اكتب تعابير ثابت الاتزان غير المتجانس لكل مما يلي :

$\text{H}_2\text{O}(\text{l}) \rightleftharpoons \text{H}_2\text{O}(\text{g})$	- b	$\text{C}_{10}\text{H}_8(\text{s}) \rightleftharpoons \text{C}_{10}\text{H}_8(\text{g})$	- a
$K_{\text{eq}} =$		$K_{\text{eq}} =$	
$\text{C}(\text{s}) + \text{H}_2\text{O}(\text{g}) \rightleftharpoons \text{CO}(\text{g}) + \text{H}_2(\text{g})$	- d	$\text{CaCO}_3(\text{s}) \rightleftharpoons \text{CaO}(\text{s}) + \text{CO}_2(\text{g})$	- c
$K_{\text{eq}} =$		$K_{\text{eq}} =$	

4 - يتفاعل الحديد الصلب مع غاز الكلور لتكوين كلوريد الحديد FeCl_3 III .
اكتب معادلة كيميائية موزونة وتعبير ثابت الاتزان للتفاعل.

الفصل الرابع	الاتزان الكيميائي حالة الاتزان الديناميكي 1 - 4	الصف المادة	٣ ث
ثوابت الاتزان		تقويم ختامي للدرس	
Equilibrium Constants		ثوابت الاتزان	
اسم الطالب		الدرجة	١٠
الزمن : ١٠ دقائق			
أجب عن جميع الأسئلة التالية :			
ثوابت الاتزان :			
* تبقى قيمة K_{eq} ثابتة لتفاعل معين عند درجة حرارة معينة . بغض النظر عن التراكيز الابتدائية للنواتج والمتفاعلات. (لاحظ الجدول 4-1)			
تراكيز الاتزان	بسبب اختلاف التراكيز الابتدائية لتفاعل ما في عدد من التجارب. قد تكون تراكيز الاتزان غير متساوية. لكن عند التعويض بدل تراكيز الاتزان في معادلة ثابت الاتزان تم الحصول على قيمة K_{eq} نفسها.		
قيمة K_{eq}	إذا كانت قيمة K_{eq} فإن النواتج أكبر من المتفاعلات عند الاتزان. إذا كانت قيمة K_{eq} فإن النواتج تكون شبه معدومة عند الاتزان.		
خواص الاتزان	١- يجب أن يتم التفاعل في نظام ٢- يجب أن تبقى درجة الحرارة ٣- توجد النواتج والمتفاعلات معا وهي في حركة ديناميكية		
ملاحظة	الاتزان ديناميكي وليس		
مثال 4.3 : ص 127 قيمة ثابت الاتزان.			
- احسب قيمة K_{eq} لتعبير ثابت الاتزان $K_{eq} = \frac{[NH_3]^2}{[N_2][H_2]^3}$ إذا علمت أن تراكيز المواد في أحد مواضع الاتزان هي .			
$[NH_3] = 0.933 \text{ mol/l} , [N_2] = 0.533 \text{ mol/l} , [H_2] = 1.600 \text{ mol/l}$			
$K_{eq} = \frac{[NH_3]^2}{[N_2][H_2]^3}$	$K_{eq} = \frac{[0.933]^2}{[0.533][1.600]^3}$	= 0.399	
نوريات :			
5 - احسب قيمة K_{eq} للاتزان $N_2O_4(g) \rightleftharpoons 2NO_2(g)$ إذا علمت أن : $[N_2O_4] = 0.0185 \text{ mol/l} , [NO_2] = 0.0627 \text{ mol/l}$			
6 - احسب قيمة K_{eq} للاتزان $CO(g) + 3H_2(g) \rightleftharpoons CH_4(g) + H_2O(g)$ إذا علمت أن : $[CO] = 0.0613 \text{ mol/l} , [H_2] = 0.1839 \text{ mol/l} , [CH_4] = 0.0387 \text{ mol/l} , [H_2O] = 0.0387 \text{ mol/l}$			
7 - يصل التفاعل $COCl_2(g) \rightleftharpoons CO(g) + Cl_2(g)$ إلى حلة الاتزان عند درجة حرارة 900 K فإذا كان تركيز كل من CO و Cl_2 هو 0.150 M عند الاتزان . فما تركيز $COCl_2$ ؟ علما أن ثابت الاتزان K_{eq} عند درجة الحرارة نفسها يساوي 8.2×10^{-2} .			

* تحسب ثوابت الاتزان من بيانات التراكيز.

الفصل الرابع	الامتزان الكيمياء		الصف ٣																																						
العوامل المؤثرة في الامتزان الكيمياء 2 - 4			المادة كيمياء																																						
تقويم ختامي للدرس	مبدأ لوتشاتلييه وتطبيقه	Le Chatelier"s Principle																																							
اسم الطالب	الدرجة																																								
١٠																																									
الزمن : ١٠ دقائق																																									
أجب عن جميع الأسئلة التالية :																																									
٤٠																																									
١. مبدأ لوتشاتلييه : * اكتشف العالم الفرنسي هنري لويس لوتشاتلييه أن هناك طرائق للتحكم في الامتزان لجعل التفاعل أكثر إنتاجا . <table border="1"> <tr> <td>مبدأ لوتشاتلييه</td> <td>إذا بذل على نظام في حالة فإن ذلك يؤدي إلى إزاحة النظام في اتجاه أثر هذا الجهد .</td> </tr> <tr> <td>تعريف الجهد</td> <td>هو أي يؤثر في نظام معين.</td> </tr> </table> ٢. تطبيق مبدأ لوتشاتلييه : <table border="1"> <tr> <td>طريقة تطبيق مبدأ لوتشاتلييه في الصناعة</td> <td>تعتمد طريقة مبدأ لوتشاتلييه في الصناعة على : تعديل أي عامل يؤدي إلى الامتزان نحو في التفاعل.</td> </tr> <tr> <td>العوامل المؤثرة في الامتزان الكيمياء</td> <td>١- التغير في ١- التغير في ١- التغير في ١- التغير في ١- التغير في ١- التغير في</td> </tr> </table> ٣. أثر التغير في التركيز على الامتزان حسب مبدأ لوتشاتلييه : <table border="1"> <tr> <td>استفسار</td> <td>هل من الممكن أن يغير الكيمياء حالة الامتزان بتغيير التراكيز.</td> </tr> <tr> <td>الإجابة</td> <td>يمكن ذلك لأن تغيير تراكيز النواتج أو المتفاعلات يؤثر في حالة الامتزان. إذ تنص نظرية التصادم على أن الجسيمات يجب أن تتصادم حتى تتفاعل وأن عدد التصادمات بين جسيمات المواد المتفاعلة يعتمد على</td> </tr> </table> * يمكن تلخيص أثر تغيير التراكيز على حالة الامتزان وثابت الامتزان حسب مبدأ لوتشاتلييه كما يلي : <table border="1"> <tr> <th>العامل المؤثر</th> <th>حالة الامتزان</th> <th>ثابت الامتزان K_{eq}</th> </tr> <tr> <td>إضافة مادة متفاعلة</td> <td>ينزاح الامتزان من جهة (المتفاعلات) إلى نحو جهة (النواتج).</td> <td rowspan="4"></td> </tr> <tr> <td>إزالة مادة ناتجة</td> <td>ينزاح الامتزان من جهة (المتفاعلات) إلى نحو جهة (النواتج).</td> </tr> <tr> <td>إضافة مادة ناتجة</td> <td>ينزاح الامتزان من جهة (النواتج) إلى نحو جهة (المتفاعلات).</td> </tr> <tr> <td>إزالة مادة متفاعلة</td> <td>ينزاح الامتزان من جهة (النواتج) إلى نحو جهة (المتفاعلات).</td> </tr> </table> مثال تطبيقي حسب التفاعل التالي : $CO(g) + 3H_2(g) \rightleftharpoons CH_4(g) + H_2O(g)$ بين أثر التغيرات التالية على الامتزان حسب مبدأ لوتشاتلييه : <table border="1"> <tr> <td>١- زيادة كمية H_2 .</td> <td>٢- نقص كمية CH_4 .</td> </tr> <tr> <td>١- عند زيادة كمية H_2 ينزاح الامتزان نحو فيزداد تركيز</td> <td>٢- عند نقص كمية CH_4 ينزاح الامتزان نحو فيزداد تركيز</td> </tr> </table> ٤. أثر التغير في الضغط والحجم على الامتزان حسب مبدأ لوتشاتلييه : <table border="1"> <tr> <td>ملاحظة</td> <td>١- الضغط لا يؤثر إلا على المادة ٢- الضغط المبدول بواسطة الغاز المثالي يعتمد على عدد الغاز التي تتصادم مع جدران الوعاء. ٣- كلما زاد عدد جسيمات الغاز في الوعاء زاد ٤- الضغط يتناسب مع التركيز مع الحجم. ٥- عند عدد المولات فإن زيادة أو نقص الضغط لا يؤثر على حالة الامتزان.</td> </tr> </table> * يمكن تلخيص أثر التغير في الضغط والحجم على حالة الامتزان وثابت الامتزان حسب مبدأ لوتشاتلييه كما يلي : <table border="1"> <tr> <th>العامل المؤثر</th> <th>حالة الامتزان</th> <th>ثابت الامتزان K_{eq}</th> </tr> <tr> <td>زيادة الضغط (نقص الحجم)</td> <td>ينزاح الامتزان من الجهة التي فيها عدد مولات نحو الجهة التي فيها عدد مولات</td> <td rowspan="2"></td> </tr> <tr> <td>نقص الضغط (زيادة الحجم)</td> <td>ينزاح الامتزان من الجهة التي فيها عدد مولات نحو الجهة التي فيها عدد مولات</td> </tr> </table>				مبدأ لوتشاتلييه	إذا بذل على نظام في حالة فإن ذلك يؤدي إلى إزاحة النظام في اتجاه أثر هذا الجهد .	تعريف الجهد	هو أي يؤثر في نظام معين.	طريقة تطبيق مبدأ لوتشاتلييه في الصناعة	تعتمد طريقة مبدأ لوتشاتلييه في الصناعة على : تعديل أي عامل يؤدي إلى الامتزان نحو في التفاعل.	العوامل المؤثرة في الامتزان الكيمياء	١- التغير في ١- التغير في ١- التغير في ١- التغير في ١- التغير في ١- التغير في	استفسار	هل من الممكن أن يغير الكيمياء حالة الامتزان بتغيير التراكيز.	الإجابة	يمكن ذلك لأن تغيير تراكيز النواتج أو المتفاعلات يؤثر في حالة الامتزان. إذ تنص نظرية التصادم على أن الجسيمات يجب أن تتصادم حتى تتفاعل وأن عدد التصادمات بين جسيمات المواد المتفاعلة يعتمد على	العامل المؤثر	حالة الامتزان	ثابت الامتزان K_{eq}	إضافة مادة متفاعلة	ينزاح الامتزان من جهة (المتفاعلات) إلى نحو جهة (النواتج).		إزالة مادة ناتجة	ينزاح الامتزان من جهة (المتفاعلات) إلى نحو جهة (النواتج).	إضافة مادة ناتجة	ينزاح الامتزان من جهة (النواتج) إلى نحو جهة (المتفاعلات).	إزالة مادة متفاعلة	ينزاح الامتزان من جهة (النواتج) إلى نحو جهة (المتفاعلات).	١- زيادة كمية H_2 .	٢- نقص كمية CH_4 .	١- عند زيادة كمية H_2 ينزاح الامتزان نحو فيزداد تركيز	٢- عند نقص كمية CH_4 ينزاح الامتزان نحو فيزداد تركيز	ملاحظة	١- الضغط لا يؤثر إلا على المادة ٢- الضغط المبدول بواسطة الغاز المثالي يعتمد على عدد الغاز التي تتصادم مع جدران الوعاء. ٣- كلما زاد عدد جسيمات الغاز في الوعاء زاد ٤- الضغط يتناسب مع التركيز مع الحجم. ٥- عند عدد المولات فإن زيادة أو نقص الضغط لا يؤثر على حالة الامتزان.	العامل المؤثر	حالة الامتزان	ثابت الامتزان K_{eq}	زيادة الضغط (نقص الحجم)	ينزاح الامتزان من الجهة التي فيها عدد مولات نحو الجهة التي فيها عدد مولات		نقص الضغط (زيادة الحجم)	ينزاح الامتزان من الجهة التي فيها عدد مولات نحو الجهة التي فيها عدد مولات
مبدأ لوتشاتلييه	إذا بذل على نظام في حالة فإن ذلك يؤدي إلى إزاحة النظام في اتجاه أثر هذا الجهد .																																								
تعريف الجهد	هو أي يؤثر في نظام معين.																																								
طريقة تطبيق مبدأ لوتشاتلييه في الصناعة	تعتمد طريقة مبدأ لوتشاتلييه في الصناعة على : تعديل أي عامل يؤدي إلى الامتزان نحو في التفاعل.																																								
العوامل المؤثرة في الامتزان الكيمياء	١- التغير في ١- التغير في ١- التغير في ١- التغير في ١- التغير في ١- التغير في																																								
استفسار	هل من الممكن أن يغير الكيمياء حالة الامتزان بتغيير التراكيز.																																								
الإجابة	يمكن ذلك لأن تغيير تراكيز النواتج أو المتفاعلات يؤثر في حالة الامتزان. إذ تنص نظرية التصادم على أن الجسيمات يجب أن تتصادم حتى تتفاعل وأن عدد التصادمات بين جسيمات المواد المتفاعلة يعتمد على																																								
العامل المؤثر	حالة الامتزان	ثابت الامتزان K_{eq}																																							
إضافة مادة متفاعلة	ينزاح الامتزان من جهة (المتفاعلات) إلى نحو جهة (النواتج).																																								
إزالة مادة ناتجة	ينزاح الامتزان من جهة (المتفاعلات) إلى نحو جهة (النواتج).																																								
إضافة مادة ناتجة	ينزاح الامتزان من جهة (النواتج) إلى نحو جهة (المتفاعلات).																																								
إزالة مادة متفاعلة	ينزاح الامتزان من جهة (النواتج) إلى نحو جهة (المتفاعلات).																																								
١- زيادة كمية H_2 .	٢- نقص كمية CH_4 .																																								
١- عند زيادة كمية H_2 ينزاح الامتزان نحو فيزداد تركيز	٢- عند نقص كمية CH_4 ينزاح الامتزان نحو فيزداد تركيز																																								
ملاحظة	١- الضغط لا يؤثر إلا على المادة ٢- الضغط المبدول بواسطة الغاز المثالي يعتمد على عدد الغاز التي تتصادم مع جدران الوعاء. ٣- كلما زاد عدد جسيمات الغاز في الوعاء زاد ٤- الضغط يتناسب مع التركيز مع الحجم. ٥- عند عدد المولات فإن زيادة أو نقص الضغط لا يؤثر على حالة الامتزان.																																								
العامل المؤثر	حالة الامتزان	ثابت الامتزان K_{eq}																																							
زيادة الضغط (نقص الحجم)	ينزاح الامتزان من الجهة التي فيها عدد مولات نحو الجهة التي فيها عدد مولات																																								
نقص الضغط (زيادة الحجم)	ينزاح الامتزان من الجهة التي فيها عدد مولات نحو الجهة التي فيها عدد مولات																																								

الأهداف :
١. تصف العوامل المتعددة التي تؤثر في الامتزان الكيمياء.

٢. تفسر كيف يطبق مبدأ لوتشاتلييه على أنظمة في حالة اتزان.

مثال تطبيقي (عدد المولات متساوي)	حسب التفاعل التالي : $\text{CO (g)} + \text{NO}_2 \text{ (g)} \rightleftharpoons \text{CO}_2 \text{ (g)} + \text{NO (g)}$ بين أثر زيادة الضغط (إنقاص الحجم) على حالة الاتزان .
الحل	لا حظ أن عدد مولات المتفاعلات الغازية عدد مولات النواتج الغازية. لذلك فإن زيادة أو نقص الضغط (نقص أو زيادة الحجم) لا يؤثران على الاتزان.
مثال تطبيقي (عدد المولات غير متساوي)	حسب التفاعل التالي : $\text{CO (g)} + 3\text{H}_2 \text{ (g)} \rightleftharpoons \text{CH}_4 \text{ (g)} + \text{H}_2\text{O (g)}$ بين أثر : ١- زيادة الضغط (إنقاص الحجم) على حالة الاتزان حسب مبدأ لوتشاتلييه . ٢- انقاص الضغط (زيادة الحجم) على حالة الاتزان حسب مبدأ لوتشاتلييه .
الحل	١- ينزاح الاتزان نحو وبذلك يزداد تركيز ويقل تركيز ٢- ينزاح الاتزان نحو وبذلك يزداد تركيز ويقل تركيز
تدريب	حسب التفاعل التالي : $2\text{NH}_3 \text{ (g)} \rightleftharpoons \text{N}_2 \text{ (g)} + 3\text{H}_2 \text{ (g)}$ بين أثر : ١- زيادة الضغط (إنقاص الحجم) على حالة الاتزان حسب مبدأ لوتشاتلييه . ٢- انقاص الضغط (زيادة الحجم) على حالة الاتزان حسب مبدأ لوتشاتلييه .
الحل	١- ينزاح الاتزان نحو وبذلك يزداد تركيز ويقل تركيز ٢- ينزاح الاتزان نحو وبذلك يزداد تركيز ويقل تركيز

٣. أثر النغير في درجة الحرارة على الاتزان حسب مبدأ لوتشاتلييه :

* يمكن تلخيص أثر النغير في درجة الحرارة على حالة الاتزان وثابت الاتزان حسب مبدأ لوتشاتلييه كما يلي :

نوع التفاعل	العامل المؤثر	حالة الاتزان	ثابت الاتزان K_{eq}
(طارد للحرارة)	زيادة درجة الحرارة	ينزاح الاتزان من جهة إلى نحو جهة	قيمه
	خفض درجة الحرارة	ينزاح الاتزان من جهة إلى نحو جهة	قيمه
(ماص للحرارة)	زيادة درجة الحرارة	ينزاح الاتزان من جهة إلى نحو جهة	قيمه
	خفض درجة الحرارة	ينزاح الاتزان من جهة إلى نحو جهة	قيمه
درجة الحرارة K_{eq} و	أي نغير في درجة الحرارة ينتج عنه نغير في K_{eq} . تزداد قيمة ثابت الاتزان درجة الحرارة في التفاعلات الماصة للحرارة. تقل قيمة ثابت الاتزان درجة الحرارة في التفاعلات الطاردة للحرارة.		
ملاحظة	إذا كان التفاعل لا ماص ولا طارد للحرارة فإن زيادة درجة الحرارة أو نقصها لا يؤثر على حالة الاتزان ولا على ثابت الاتزان.		
مثال لتفاعل طارد للحرارة $\Delta H < 0$	حسب التفاعل التالي : $\text{CO (g)} + 3\text{H}_2 \text{ (g)} \rightleftharpoons \text{CH}_4 \text{ (g)} + \text{H}_2\text{O (g)}$ $\Delta H = -206.5 \text{ KJ}$ بين أثر : ١- زيادة درجة الحرارة على حالة وثابت الاتزان وكميات المواد في التفاعل حسب مبدأ لوتشاتلييه . ٢- خفض درجة الحرارة على حالة وثابت الاتزان وكميات المواد في التفاعل حسب مبدأ لوتشاتلييه .		
الحل	التفاعل طارد للحرارة لأن طاقة التفاعل ΔH بالسالب. لذا نعتبر الحرارة وكأنها مادة ناتجة : حرارة + $\text{CO (g)} + 3\text{H}_2 \text{ (g)} \rightleftharpoons \text{CH}_4 \text{ (g)} + \text{H}_2\text{O (g)}$ ١- زيادة درجة الحرارة يجعل التفاعل ينزاح نحو وبذلك يزداد تركيز ويقل تركيز أما قيمة ثابت الاتزان ٢- خفض درجة الحرارة يجعل التفاعل ينزاح نحو وبذلك يزداد تركيز ويقل تركيز أما قيمة ثابت الاتزان		
مثال لتفاعل ماص للحرارة $\Delta H > 0$	حسب التفاعل التالي : $\text{N}_2\text{O}_4 \text{ (g)} \rightleftharpoons 2\text{NO}_2 \text{ (g)}$ $\Delta H = 5503 \text{ KJ}$ بين أثر : ١- زيادة درجة الحرارة على حالة وثابت الاتزان وكميات المواد في التفاعل حسب مبدأ لوتشاتلييه . ٢- خفض درجة الحرارة على حالة وثابت الاتزان وكميات المواد في التفاعل حسب مبدأ لوتشاتلييه .		
الحل	التفاعل ماص للحرارة لأن طاقة التفاعل ΔH بالموجب. لذا نعتبر الحرارة وكأنها مادة متفاعلة : حرارة + $\text{N}_2\text{O}_4 \text{ (g)} \rightleftharpoons 2\text{NO}_2 \text{ (g)}$ ١- زيادة درجة الحرارة يجعل التفاعل ينزاح نحو وبذلك يزداد تركيز ويقل تركيز أما قيمة ثابت الاتزان ٢- خفض درجة الحرارة يجعل التفاعل ينزاح نحو وبذلك يزداد تركيز ويقل تركيز أما قيمة ثابت الاتزان		

٤. أثر المواد الحافزة على الاتزان :

أهميتها	تزيد من سرعة التفاعل وسرعة التفاعل الخلفي
تأثيرها على الاتزان	التفاعل ليصل إلى حالة الاتزان دون نغير كمية النواتج المتكونة.

٣ ث كيمياء	الصف المادة	الفصل الرابع الاتزان الكيميائي استعمال ثوابت الاتزان 4 - 3	
Calculating Equilibrium Concentrations		حساب التراكيز عند الاتزان	تقويم ختامي للدرس
10	الدرجة	اسم الطالب	
42		الزمن : ١٠ دقائق	
		أجب عن جميع الأسئلة التالية :	
		حساب التراكيز عند الاتزان : * إذا كانت قيمة ثابت الاتزان K_{eq} لتفاعل ما معلومة فإنه يمكنك من حساب تركيز أحد المواد بمعلومية تراكيز المواد الأخرى في معادلة التفاعل. * يمكن حساب تركيز مادة ما من معادلة ثابت الاتزان.	
		مثال تطبيقي : ثابت الاتزان K_{eq} للتفاعل : $CH_4(g) + H_2O(g) \rightleftharpoons CO(g) + 3H_2(g)$ يساوي 3.933 أوجد تركيز CH_4 علما بأن التراكيز : $[CO] = 0.85$ ، $[H_2] = 1.333$ ، $[H_2O] = 0.286$	
$K_{eq} = \frac{[CH_4][H_2O]}{[CO][H_2]^3}$		$[CH_4] = K_{eq} \frac{[CO][H_2]^3}{[H_2O]}$	
		$[CH_4] = 3.933 \frac{(0.85)(1.333)^3}{(0.286)} = 27.7 \text{ mol/L}$	
		مثال 4.4 : ص 141 حساب تراكيز الاتزان. يتفكك كبريتيد الهيدروجين الذي يتميز برائحة كريهة تشبه رائحة البيض الفاسد عند 1405 K إلى هيدروجين وجزئ كبريت حسب المعادلة الآتية : $2H_2S(g) \rightleftharpoons 2H_2(g) + S_2(g)$ ما تركيز غاز الهيدروجين عند الاتزان إذا كانت ثابت الاتزان يساوي 2.27×10^{-3} وتركيز $[H_2S] = 0.184$ ، $[S_2] = 0.0540$ ؟	
$K_{eq} = \frac{[H_2]^2 [S_2]}{[H_2S]^2}$		$[H_2]^2 = K_{eq} \frac{[H_2S]^2}{[S_2]}$	
$[H_2]^2 = 1.4232 \times 10^{-3}$		$[H_2] = \sqrt{1.4232 \times 10^{-3}} = 0.0377 \text{ mol/L}$	
		18 - ينتج الميثانول عن تفاعل أول أكسيد الكربون مع الهيدروجين : $CO(g) + 2H_2(g) \rightleftharpoons CH_3OH(g)$ فإذا كان $K_{eq} = 10.5$ عند درجة حرارة محددة . فاحسب التراكيز الآتية : -a $[CO]$ في خليط اتزان يحتوي على $[H_2] = 0.933 \text{ mol/L}$ ، $[CH_3OH] = 1.32 \text{ mol/L}$	
		-b $[H_2]$ في خليط اتزان يحتوي على $[CO] = 1.09 \text{ mol/L}$ ، $[CH_3OH] = 0.325 \text{ mol/L}$	
		-c $[CH_3OH]$ في خليط اتزان يحتوي على $[H_2] = 0.0661 \text{ mol/L}$ ، $[CO] = 3.85 \text{ mol/L}$	
		19 - في التفاعل العام : $A + B \rightleftharpoons C + D$ إذا سمح لـ 1.0 mol/L من A بالتفاعل مع 1.0 mol/L من B في دورق حجمه 1L إلى أن يصل إلى حالة اتزان . فإذا كان تركيز A عند الاتزان 0.450 mol/L فما تراكيز المواد الأخرى عند الاتزان ؟ وما قيمة K_{eq} ؟	

الأهداف :

1. تحدد التراكيز عند الاتزان للمتفاعلات والنواتج.

الفصل الرابع		الاتزان الكيميائي		الصف ٣											
استعمال ثوابت الاتزان 3 - 4				المادة كيمياء											
تقويم ختامي للدرس		ثابت حاصل الذائبية (Ksp)		The Solubility Product Constant											
اسم الطالب		الدرجة		١٠											
الزمن : ١٠ دقائق															
أجب عن جميع الأسئلة التالية :															
المركبات الأيونية و مدى الذائبية :															
ذائبية المركبات الأيونية		عند الذوبان جميع المركبات الأيونية تتفكك إلى أيونات إلا أن : ١ - بعضها يذوب بسرعة في الماء ومنها NaCl(s) → Na+(aq) + Cl-(aq) ٢ - و بعضها يذوب قليلا في الماء ومنها BaSO4(s) ⇌ Ba2+(aq) + SO42-(aq)													
ملاحظة		سرعة الذوبان للمركبات القليلة الذوبان ومنها BaSO4 عندما تكون تراكيز الأيونات إلى أقصى حد . ومع ذلك يكون المحلول عند الاتزان محلولاً													
كتابة تعبير ثابت حاصل الذائبية (Ksp) :															
ثابت حاصل الذائبية Ksp		تعريفه هو ناتج تراكيز الأيونات كل منها مرفوع يساوي معاملها في المعادلة الكيميائية. أهميته يعبر عن ثابت الاتزان للمركبات الذوبان. دلالة قيمته مقدار Ksp الصغير يعني أن النواتج لا يزداد تركيزها عند الاتزان.													
ملاحظة		تعتمد قيمة Ksp فقط على الأيونات في المحلول المشبع.													
الجدول 4.3		يعرض الجدول ثوابت حاصل الذائبية لنواتج بعض المركبات الأيونية . والتي تم تحديدها عن طريق إجراء تجارب.													
مثال تطبيقي		اكتب تعبير ثابت حاصل الذائبية لكبريتات الباريوم BaSO4 الذائبة في الماء إذا كان Ksp لهذه العملية 1.1X10-10 عند درجة حرارة 298 K . BaSO4(s) ⇌ Ba2+(aq) + SO42-(aq)													
الحل		Ksp = [Ba2+] [SO42-] = 1.1X10-10													
استعمال ثابت حاصل الذائبية (Ksp) :															
استعماله		١ - يستعمل في حساب ذائبية المركبات الذوبان بالمولارية والتي يرمز لها بالرمز (s) . ٢ - يستعمل في حساب تركيز المجهولة في قانون حاصل الذائبية والتي يرمز لها بالرمز (x) .													
ذائبية مركب ما في الماء		هي كمية المادة التي في معين من عند درجة حرارة معينة.													
طريقة حساب الذائبية (s) للمركبات الأيونية بوحدة mol/l عند 298 K بمعلومية معادلة الاتزان وقيمة ثابت حاصل الذائبية.															
١ - اكتب معادلة الاتزان للمركب الأيوني .		AgI(s) ⇌ Ag+(aq) + I-(aq)													
٢ - اكتب صيغة ثابت حاصل الذائبية Ksp من معادلة الاتزان .		Ksp = [Ag+] [I-] حيث Ksp = 8.5X10-17													
٣ - نشير إلى ذائبية المركب الأيوني بـ (s) . ونشير أيضا إلى كل أيون بـ s حسب عدد مولات كل أيون في المعادلة (والتي تعني التركيز [] عند الاتزان)		<table><tr><td>AgI(s)</td><td>⇌</td><td>Ag+(aq)</td><td>+</td><td>I-(aq)</td></tr><tr><td>s</td><td></td><td>s</td><td></td><td>s</td></tr></table>				AgI(s)	⇌	Ag+(aq)	+	I-(aq)	s		s		s
AgI(s)	⇌	Ag+(aq)	+	I-(aq)											
s		s		s											
٤ - نعوض بقيمة s بدلا من التركيز [] في صيغة ثابت حاصل الذائبية Ksp.		8.5X10-17 = [Ag+] [I-] = (s) (s) = s2													
٥ - نوجد قيمة s التي تشير إلى مقدار الذائبية للمركب .		s2 = 8.5X10-17 s = √8.5X10-17 9.2X10-9 mol/L													
مثال [1] : اكتب العلاقة بين حاصل الذائبية (Ksp) والذائبية (s) لمركب أيوني صيغته MY2 :															
العلاقة بين Ksp و s		Ksp		معادلة التفكك											
Ksp = (1s) (2s)2 = s 22 s2 = 4 s3		Ksp = [M2+] [Y-]2		MY2(s) ⇌ M2+(aq) + 2Y-(aq) S 1S 2S											

مثال 4.5 : ص 144 حساب الذائبية المولارية.

- استعمل قيمة K_{sp} في الجدول لحساب ذائبية كربونات النحاس CuCO_3 بوحدة mol/l عند 298 K . ($K_{sp} = 2.5 \times 10^{-10}$)
الحل

$\text{CuCO}_3(s) \rightleftharpoons \text{Cu}^{2+}_{(aq)} + \text{CO}_3^{2-}_{(aq)}$			١- اكتب معادلة كيميائية لاتزان الذائبية.										
$K_{sp} = [\text{Cu}^{2+}] [\text{CO}_3^{2-}] = 2.5 \times 10^{-10}$			٢- اكتب صيغة ثابت حاصل الذائبية K_{sp} من معادلة الاتزان .										
<table><tr><td>$\text{CuCO}_3(s)$</td><td>$\rightleftharpoons$</td><td>$\text{Cu}^{2+}_{(aq)}$</td><td>+</td><td>$\text{CO}_3^{2-}_{(aq)}$</td></tr><tr><td>s</td><td></td><td>s</td><td></td><td>s</td></tr></table>			$\text{CuCO}_3(s)$	$\rightleftharpoons$	$\text{Cu}^{2+}_{(aq)}$	+	$\text{CO}_3^{2-}_{(aq)}$	s		s		s	٣- نشير الى ذائبية المركب CuCO_3 بـ (s) . ونشير أيضا إلى كل أيون بـ s حسب عدد مولات كل أيون في المعادلة (والتي تعني التركيز [] عند الاتزان)
$\text{CuCO}_3(s)$	$\rightleftharpoons$	$\text{Cu}^{2+}_{(aq)}$	+	$\text{CO}_3^{2-}_{(aq)}$									
s		s		s									
$2.5 \times 10^{-10} = [\text{Cu}^{2+}] [\text{CO}_3^{2-}] = (s)(s) = s^2$			٤- نعوض بقيمة s بدلا من التركيز [] في صيغة ثابت حاصل الذائبية K_{sp} .										
$s^2 = 2.5 \times 10^{-10}$	$s = \sqrt{2.5 \times 10^{-10}}$	$1.6 \times 10^{-5} \text{ mol/L}$	٥- نوجد قيمة s التي تشير الى مقدار الذائبية للمركب .										

نُجريات :

20 - استعمل البيانات في الجدول 4-3 لحساب الذائبية المولارية mol/l للمركبات الأيونية الآتية عند درجة حرارة 298 K :
-a PbCrO_4 ($K_{sp} = 2.3 \times 10^{-13}$)

($K_{sp} = 1.8 \times 10^{-10}$)

-b AgCl

($K_{sp} = 3.4 \times 10^{-9}$)

-c CaCO_3

21 - إذا علمت أن K_{sp} لكربونات الرصاص PbCO_3 يساوي 7.40×10^{-14} عند 298 K . فما ذائبية كربونات الرصاص بـ g/l ؟

مثال 4.6 : ص 145 حساب تركيز الأيون [x].

- هيدروكسيد الماغنيسيوم مادة صلبة بيضاء يمكن الحصول عليها من مياه البحر واستعمالها في صنع الكثير من الأدوية الطبية.
وخصوصا في الأدوية التي تعمل على معادلة حموضة المعدة الزائدة . احسب تركيز أيون الهيدروكسيد في محلول هيدروكسيد الماغنيسيوم المشبع Mg(OH)_2 عند 298 K (إذا علمت أن $K_{sp} = 5.6 \times 10^{-12}$).

$\text{Mg(OH)}_2(s) \rightleftharpoons \text{Mg}^{2+}_{(aq)} + 2\text{OH}^{-}_{(aq)}$				١- اكتب معادلة كيميائية موزونة للاتزان.
$K_{sp} = [\text{Mg}^{2+}] [\text{OH}^{-}]^2 = 5.6 \times 10^{-12}$				٢- اكتب صيغة ثابت حاصل الذائبية K_{sp} من معادلة الاتزان .
$\text{Mg(OH)}_2(s)$	$\rightleftharpoons$	$\text{Mg}^{2+}_{(aq)}$	$+ 2\text{OH}^{-}_{(aq)}$	٣- لمعرفة تركيز أيون $[\text{OH}^{-}]$ نعوض عن عدد المولات في المعادلة بـ X .
		X	2X	
$5.6 \times 10^{-12} = [\text{Mg}^{2+}] [\text{OH}^{-}]^2 = (X) (2X)^2 = 4 X^3$				٤- نعوض بقيمة X بدلا من التركيز [] في صيغة ثابت حاصل الذائبية K_{sp} .
$4 X^3 = 5.6 \times 10^{-12}$	$X^3 = 5.6 \times 10^{-12} / 4$	$X^3 = 1.4 \times 10^{-12}$	٥- نوجد قيمة X والتي تساوي تركيز أيون $[\text{Mg}^{2+}]$ في المعادلة الموزونة.	
$X = [\text{Mg}^{2+}] =$	$\sqrt[3]{1.4 \times 10^{-12}}$	$1.1 \times 10^{-4} \text{ mol/L}$		
$[\text{OH}^{-}] = 2 [\text{Mg}^{2+}] = 2(1.1 \times 10^{-4} \text{ mol/l}) = 2.2 \times 10^{-4} \text{ mol/L}$				٦- نوجد قيمة تركيز أيون $[\text{OH}^{-}]$.

٢. تحسب ذائبية مركب من ثابت حاصل الذائبية.

22 - استعمل قيم K_{sp} في الجدول 4-3 لحساب :

-a $[Ag^+]$ في محلول **AgBr** عند الاتزان . $(K_{sp} = 5.4 \times 10^{-13})$

-b $[F^-]$ في محلول مشبع من **CaF₂** . $(K_{sp} = 3.5 \times 10^{-11})$

-c $[Ag^+]$ في محلول **Ag₂CrO₄** عند الاتزان . $(K_{sp} = 1.1 \times 10^{-12})$

23 - احسب ذائبية **Ag₃PO₄** . $(K_{sp} = 2.6 \times 10^{-18})$

24 - ذائبية كلوريد الفضة $(AgCl) = 1.86 \times 10^{-4} \text{ g/100g}$ في الماء عند درجة حرارة 298 K . احسب K_{sp} لـ **AgCl** .

الفصل الرابع	الاتزان الكيميائي استعمال ثوابت الاتزان 3 - 4	الصف المادة	الصف المادة	الصف المادة	الصف المادة												
توقع الرواسب و حساب تراكيز الأيون.			تقويم ختامي للدرس														
اسم الطالب		الدرجة															
10		الزمن : 10 دقائق															
أجب عن جميع الأسئلة التالية :																	
نوقع الرواسب :																	
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;"> ما المطلوب لتوقع تكون راسب </td> <td style="width: 50%;"> لتوقع تكون راسب عند خلط محلولين عليك أولاً حساب تركيز </td> </tr> <tr> <td> طريقة توقع الرواسب </td> <td> نوجد قيمة Q_{sp} (ثابت الحاصل الأيوني) ونقارن فيها قيمة K_{sp} (ثابت حاصل الذائبية) . </td> </tr> <tr> <td> ثابت الحاصل الأيوني Q_{sp} </td> <td> هو قيمة افتراضية لثابت حاصل الذائبية تحسب في لحظة ما خلال التفاعل للتنبؤ ما إذا كان المحلول مشبعاً أم لا. </td> </tr> <tr> <td> العلاقة بين Q_{sp} و K_{sp} </td> <td> إذا كان $Q_{sp} < K_{sp}$ فإن المحلول ولا يتكون إذا كان $Q_{sp} = K_{sp}$ فإن المحلول ولا يحدث تغير. إذا كان $Q_{sp} > K_{sp}$ فإنه سوف يتكون وتقل تراكيز </td> </tr> <tr> <td> ملاحظة مهمة </td> <td> *إذا خلط حجمين متساويين من محلولين فإن عدد الأيونات نفسه سوف يذوب في ضعف الحجم الأصلي وبالتالي ينقص التركيز بمقدار النصف. (أي أن مرج المحاليل يخفف تركيزها إلى النصف) لذا نقسم تراكيز الأيونات الممزوجة في المخلوط على 2 للحصول على التركيز الأصلي لكل أيون. </td> </tr> </table>						ما المطلوب لتوقع تكون راسب	لتوقع تكون راسب عند خلط محلولين عليك أولاً حساب تركيز	طريقة توقع الرواسب	نوجد قيمة Q_{sp} (ثابت الحاصل الأيوني) ونقارن فيها قيمة K_{sp} (ثابت حاصل الذائبية) .	ثابت الحاصل الأيوني Q_{sp}	هو قيمة افتراضية لثابت حاصل الذائبية تحسب في لحظة ما خلال التفاعل للتنبؤ ما إذا كان المحلول مشبعاً أم لا.	العلاقة بين Q_{sp} و K_{sp}	إذا كان $Q_{sp} < K_{sp}$ فإن المحلول ولا يتكون إذا كان $Q_{sp} = K_{sp}$ فإن المحلول ولا يحدث تغير. إذا كان $Q_{sp} > K_{sp}$ فإنه سوف يتكون وتقل تراكيز	ملاحظة مهمة	*إذا خلط حجمين متساويين من محلولين فإن عدد الأيونات نفسه سوف يذوب في ضعف الحجم الأصلي وبالتالي ينقص التركيز بمقدار النصف. (أي أن مرج المحاليل يخفف تركيزها إلى النصف) لذا نقسم تراكيز الأيونات الممزوجة في المخلوط على 2 للحصول على التركيز الأصلي لكل أيون.		
ما المطلوب لتوقع تكون راسب	لتوقع تكون راسب عند خلط محلولين عليك أولاً حساب تركيز																
طريقة توقع الرواسب	نوجد قيمة Q_{sp} (ثابت الحاصل الأيوني) ونقارن فيها قيمة K_{sp} (ثابت حاصل الذائبية) .																
ثابت الحاصل الأيوني Q_{sp}	هو قيمة افتراضية لثابت حاصل الذائبية تحسب في لحظة ما خلال التفاعل للتنبؤ ما إذا كان المحلول مشبعاً أم لا.																
العلاقة بين Q_{sp} و K_{sp}	إذا كان $Q_{sp} < K_{sp}$ فإن المحلول ولا يتكون إذا كان $Q_{sp} = K_{sp}$ فإن المحلول ولا يحدث تغير. إذا كان $Q_{sp} > K_{sp}$ فإنه سوف يتكون وتقل تراكيز																
ملاحظة مهمة	*إذا خلط حجمين متساويين من محلولين فإن عدد الأيونات نفسه سوف يذوب في ضعف الحجم الأصلي وبالتالي ينقص التركيز بمقدار النصف. (أي أن مرج المحاليل يخفف تركيزها إلى النصف) لذا نقسم تراكيز الأيونات الممزوجة في المخلوط على 2 للحصول على التركيز الأصلي لكل أيون.																
مثال 4.7 : ص 147 نوقع لكون راسب.																	
- توقع ما إذا كان سيتكون راسب $PbCl_2$ عند إضافة 100 ml من 0.0100 M NaCl إلى 100 ml من 0.0200 M $Pb(NO_3)_2$ علماً بأن K_{sp} للمركب يساوي 1.7×10^{-5}.																	
الحل																	
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;"> 1- اكتب معادلة ذوبان $PbCl_2$. </td> <td style="width: 50%;"> $PbCl_2(s) \rightleftharpoons Pb^{2+}(aq) + 2Cl^{-}(aq)$ </td> </tr> <tr> <td> 2- اكتب صيغة ثابت الحاصل الأيوني Q_{sp}. </td> <td> $Q_{sp} = [Pb^{2+}] [Cl^{-}]^2$ </td> </tr> <tr> <td> 3- نحسب تركيز كل أيون في المخلوط. علماً بأن مزج المحاليل يخفف تركيزها إلى النصف لذا نقسم تركيز $[Pb^{2+}]$ و $[Cl^{-}]$ على 2. </td> <td> $[Pb^{2+}] = \frac{0.0200\text{ M}}{2} = 0.0100\text{ M}$ $[Cl^{-}] = \frac{0.0100\text{ M}}{2} = 0.00500\text{ M}$ </td> </tr> <tr> <td> 4- نعوض بتركيز $[Pb^{2+}]$ و $[Cl^{-}]$ في Q_{sp} </td> <td> $Q_{sp} = (0.0100) (0.00500)^2 = 2.5 \times 10^{-7}$ </td> </tr> <tr> <td> 5- نقارن بين Q_{sp} و K_{sp}. </td> <td> $Q_{sp} (2.5 \times 10^{-7}) < K_{sp} (1.7 \times 10^{-5})$ </td> </tr> <tr> <td> 6- نتيجة التوقع. </td> <td> لا يتكون راسب. </td> </tr> </table>						1- اكتب معادلة ذوبان $PbCl_2$.	$PbCl_2(s) \rightleftharpoons Pb^{2+}(aq) + 2Cl^{-}(aq)$	2- اكتب صيغة ثابت الحاصل الأيوني Q_{sp}.	$Q_{sp} = [Pb^{2+}] [Cl^{-}]^2$	3- نحسب تركيز كل أيون في المخلوط. علماً بأن مزج المحاليل يخفف تركيزها إلى النصف لذا نقسم تركيز $[Pb^{2+}]$ و $[Cl^{-}]$ على 2.	$[Pb^{2+}] = \frac{0.0200\text{ M}}{2} = 0.0100\text{ M}$ $[Cl^{-}] = \frac{0.0100\text{ M}}{2} = 0.00500\text{ M}$	4- نعوض بتركيز $[Pb^{2+}]$ و $[Cl^{-}]$ في Q_{sp}	$Q_{sp} = (0.0100) (0.00500)^2 = 2.5 \times 10^{-7}$	5- نقارن بين Q_{sp} و K_{sp}.	$Q_{sp} (2.5 \times 10^{-7}) < K_{sp} (1.7 \times 10^{-5})$	6- نتيجة التوقع.	لا يتكون راسب.
1- اكتب معادلة ذوبان $PbCl_2$.	$PbCl_2(s) \rightleftharpoons Pb^{2+}(aq) + 2Cl^{-}(aq)$																
2- اكتب صيغة ثابت الحاصل الأيوني Q_{sp}.	$Q_{sp} = [Pb^{2+}] [Cl^{-}]^2$																
3- نحسب تركيز كل أيون في المخلوط. علماً بأن مزج المحاليل يخفف تركيزها إلى النصف لذا نقسم تركيز $[Pb^{2+}]$ و $[Cl^{-}]$ على 2.	$[Pb^{2+}] = \frac{0.0200\text{ M}}{2} = 0.0100\text{ M}$ $[Cl^{-}] = \frac{0.0100\text{ M}}{2} = 0.00500\text{ M}$																
4- نعوض بتركيز $[Pb^{2+}]$ و $[Cl^{-}]$ في Q_{sp}	$Q_{sp} = (0.0100) (0.00500)^2 = 2.5 \times 10^{-7}$																
5- نقارن بين Q_{sp} و K_{sp}.	$Q_{sp} (2.5 \times 10^{-7}) < K_{sp} (1.7 \times 10^{-5})$																
6- نتيجة التوقع.	لا يتكون راسب.																
تجربيات :																	
25 - استعمل قيم K_{sp} من الجدول 4-3 لتتوقع ما إذا سيتكون راسب عند خلط كميات متساوية من المحاليل الآتية : a- 0.030 M NaF و 0.10 M $Pb(NO_3)_2$ ؟ هل سيتكون راسب من PbF_2 أم لا . ($K_{sp}(PbF_2) = 3.3 \times 10^{-8}$)																	
b- 0.010 M $AgNO_3$ و 0.25 M K_2SO_4 ؟ هل سيتكون راسب من Ag_2SO_4 أم لا . ($K_{sp}(Ag_2SO_4) = 1.2 \times 10^{-5}$)																	
26 - هل يتكون راسب عند إضافة 250 ml من 0.20 M $MgCl_2$ إلى 750 ml من 0.0025 M NaOH ؟																	

الفصل الرابع		الاتزان الكيميائي		الصف ٣
استعمال ثوابت الاتزان 3 - 4				المادة كيمياء
تقويم ختامي للدرس		تأثير الأيون المشترك		The Common Ion Effect
اسم الطالب		الدرجة		
١٠				
الزمن : ١٠ دقائق				
أجب عن جميع الأسئلة التالية :				
٤٧				
تفسير تأثير الأيون المشترك.				
١. تأثير الأيون المشترك :				
ذائبة كرومات الرصاص PbCrO4		* تذوب كرومات الرصاص PbCrO4 في الماء النقي أكبر من ذائبيتها في محلول كرومات البوتاسيوم K2CrO4 .		
		* معادلة اتزان الذائبة لـ PbCrO4 وتعبير ثابت حاصل الذائبة Ksp .		
		$PbCrO_4(s) \rightleftharpoons Pb^{2+}_{(aq)} + CrO_4^{2-}_{(aq)}$		
		$K_{sp} = [Pb^{2+}] [CrO_4^{2-}]$		
ملاحظة		يسمى الأيون CrO_4^{2-} أيونا لأنه جزء من المركبين PbCrO4 و K2CrO4 .		
الأيون المشترك		تعريفه	هو أيون في تركيب أو أكثر من المركبات	
		أثره	يسبب الذوبانية بسبب وجود أيون	
تأثير الأيون المشترك		تعريفه	هو ذائبة المادة بسبب وجود مشترك.	
٢. تطبيق مبدأ لوشاتلييه :				
مثال		* المادة الصلبة الصفراء من كرومات الرصاص PbCrO4 في قاع الكأس في اتزان مع المحلول.		
		$PbCrO_4(s) \rightleftharpoons Pb^{2+}_{(aq)} + CrO_4^{2-}_{(aq)}$		
		* عند إضافة محلول نترات الرصاص Pb(NO3)2 إلى محلول مشبع من كرومات الرصاص PbCrO4 يترسب المزيد من كرومات الرصاص PbCrO4 الصلب (علل) لأن أيونات مشتركة بينهما فتتخفص من ذائبة كرومات الرصاص PbCrO4.		
حسب مبدأ لوشاتلييه		إن إضافة أيون Pb^{2+} إلى اتزان الذائبة يزيد من جهد الاتزان ولإزالة الجهد يزاح الاتزان نحو لتكوين المزيد من الراسب الصلب PbCrO4.		
أهميته		الذوبانية المنخفضة لكبريتات الباريوم BaSO4 تساعد على التأكد من أن كمية أيون الباريوم السام الممتص في الجهاز الهضمي لدرجة لا تؤذي المريض عند تعرضه للأشعة السينية . ولمزيد من الوقاية تضاف كبريتات الصوديوم Na2SO4 لتوفير الأيون المشترك SO_4^{2-} .		
		$BaSO_4(s) \rightleftharpoons Ba^{2+}_{(aq)} + SO_4^{2-}_{(aq)}$		
		وحسب مبدأ لوشاتلييه : أيون SO_4^{2-} الذي مصدره Na2SO4 يعمل على إزاحة الاتزان نحو لإنتاج المزيد من BaSO4 الصلب ويقتل عدد أيونات Ba^{2+} الضارة في المحلول.		