





وزارة التربية والتعليم  
Ministry of Education



الجمهورية العربية السورية  
الجمهورية العربية السورية

وزارة التربية والتعليم  
وزارة التربية والتعليم

الدراسة العلمية والتجريبية في مادة العلوم (بنسبة ١٠٠٪)




# ملخص مادة العلوم

## لصف الثالث متوسط

### الفصل الدراسي الأول

لشهر ١٤٣٢ هـ / ١٤٣٣ هـ

معلم المادة : أ- عدنان امالكي



# فهرس المحتويات

١. أسلوب العلم	الفصل الأول	الوحدة الأولى
٢. عمل العلم		
٣. العلم والتقنية والمجتمع		
٤. الزلازل	الفصل الثاني	الوحدة الثانية
٥. البراكين		
٦. الصفائح الأرضية وعلاقتها بالزلازل والبراكين		
٧. نماذج الذرة	الفصل الثالث	الوحدة الثالثة
٨. الذرة		
٩. مقدمة في الجدول الدوري	الفصل الرابع	
١٠. العناصر الممثلة		
١١. العناصر الانتقالية		
١٢. اتحاد الذرات	الفصل الخامس	الوحدة الثالثة
١٣. ارتباط العناصر		
١٤. الصيغ والمعادلات الكيميائية	الفصل السادس	
١٥. سرعة التفاعلات الكيميائية		

## ( الدرس الأول : أسلوب العلم )

١. تعريف العلم	هو طريقة أو عملية تستخدم لاكتشاف ما حولك ويوفر إجابات لتساؤلاتك
٢. تعريف التقنية	هي تطبيق العلم لصناعة منتجات وأدوات يستخدمها الناس

- استخدام الحواس فقط قد يؤدي إلى فهم غير صحيح في تفسير المشكلات والظواهر
- استخدام الأدوات والأجهزة العلمية تعطي قياسات رقمية دقيقة
- استخدام المعرفة السابقة لتوقع نتائج الاستقصاء أو حل مشكلة ما يساعد في عدم إهدار الوقت والجهد
- يتواصل العلماء مع الآخرين لنقل تجاربهم وأفكارهم

□ مهارات العلم الأساسية :-

١- الملاحظة

٢- القياس ( تفسير البيانات )

٣- المقارنة ( التصنيف )

( الدرس الثاني : عمل العلم )

□ تحديد المشكلة :

□ حل المشكلات :

- تعريف الطرائق العلمية : هي خطوات تتبع لحل المشكلات
- هناك طريقتان لحل المشكلات

١. البحث الوصفي : هو بحث يجيب عن الأسئلة من خلال الملاحظات

٢. البحث التجريبي : هو بحث يجيب عن الأسئلة من خلال اختبار الفرضيات ( التجربة )

◀ أولاً / البحث الوصفي

يعتمد البحث الوصفي على الخطوات التالية :-

- تحديد الهدف من البحث
- وصف تصميم البحث
- الموضوعية : و تكون الموضوعية بالابتعاد عن التحيز من خلال :
  - تحويل البيانات إلى قياسات رقمية
  - استخدام عينات عشوائية

□ الأجهزة والمواد والنماذج :


- اختيار الأجهزة العلمية والأدوات المناسبة
- استخدام النماذج




تعريف النماذج	هي أشياء تحدث ببطء شديد أو بسرعة كبيرة وقد تكون كبيرة أو صغيرة
فائدة النماذج	توفير الوقت والمال
أمثلة على النماذج	الرسوم البيانية ، الجداول ، الرسوم ثلاثية الأبعاد في الحاسوب والبراكين وتصميم الطائرات والمباني

• القياسات العلمية :


■ ثالثاً : الحجم



■ أولاً : الطول



■ ثانياً : الكتلة



■ ملاحظات هامة :

١. اللون الأحمر يدل على الوحدات في النظام الدولي
٢. التحويل من وحدة كبيرة إلى وحدة صغيرة **نضرب** في معامل التحويل
٣. التحويل من وحدة صغيرة إلى وحدة كبيرة **نقسم** على معامل التحويل

اسم الوحدة	اختصارها
كيلو متر	كم
متر	م
سنتي متر	سم
ملي متر	ملم
كيلو جرام	كجم
جرام	جم
ملي جرام	ملجم

## □ البيانات :

تكون البيانات في صورة منظمة على هيئة

أ- جداول البيانات

ب- الرسوم البيانية

- تنظيم البيانات يساعد على التفسير والتحليل

## □ استخلاص النتائج : ولها حالتان

- النتائج تدعم توقعك
- النتائج لا تدعم توقعك فيتم الاحتفاظ بها للاستفادة منها في مجال آخر

## ثانيا / البحث التجريبي

وخطوات تصميم البحث التجريبي هي كما يلي :

- تكوين فرضية :
- تعريف الفرضية : هو توقع أو تخمين قابل للاختبار
- المتغيرات :

تعريف المتغير المستقل	هو عامل يتغير أثناء التجربة
تعريف المتغير التابع	هو عامل يمكن قياسه أثناء التجربة
تعريف الثابت	هو عامل لا يتغير أثناء التجربة

• تعريف العينة الضابطة : هي عينة لا تتعرض لتأثير المتغير المستقل وتعامل مثل بقية المجموعات التجريبية

- فائدة العينة الضابطة : من أجل مقارنة نتائجها مع العينات التي تعرضت لتأثير المتغير المستقل

• عدد المحاولات ( إجراء التجربة عدة مرات لتكون النتائج أكثر دقة )


• تحليل النتائج

• التواصل مع علماء آخرين ونقل ما توصلوا إليه

## ( الدرس الثالث : العلم والتقنية والمجتمع )

تعريف تقنية المعلومات هي وسائل يستخدمها العلماء أو الناس ليتواصلوا مع الآخرين مثل الهاتف النقال والحوايب والانترنت

- تؤدي الاكتشافات الجديدة إلى تقنيات جديدة توفر لحياتك أكثر رفاية وأكثر صحة
- تؤدي تقنية المعلومات إلى انتشار المعلومات على نطاق واسع من العالم
- يساهم تطور التقنية في تغيير بعض النظريات القديمة




## ( الدرس الأول: الزلازل )

- تعريف المطاوعة : [ هو تعرض الصخور لقوة كافية ليتغير شكلها ]
- تعريف الارتداد المرن : [ هو عودة حواف الأجزاء المكسورة سريعاً إلى مكانها الأصلي بعد انكسارها ]
- تعريف الزلازل : [ هزة أرضية ناتجة عن تكسر الصخور بسبب حركة الصفائح الأرضية ]


## □ الصدوع وأنواعها :

تعريف الصدع : هو كسر يحدث في الصخور نتيجة حركتها


سببه	أنواع الصدوع
قوى الشد	١. الصدع العادي
قوى الضغط	٢. الصدع العكسي
قوى القص	٣. الصدع الجانبي أو الإنزلاقي ( المضربي )



الصدع الانزلاقي أو الجانبي



الصدع العكسي




الصدع العادي

## □ الموجات الزلزالية :



- تعريف الموجات الزلزالية : هي تلك الموجات التي يتكون منها الزلزال وتشمل الموجات الأولية والثانوية والموجات السطحية
- تعريف بؤرة الزلزال : هي نقطة تقع في باطن الأرض تتحرر عندها الطاقة مسببة هزة أرضية
- تعريف المركز السطحي للزلزال : هي نقطة تقع على سطح الأرض فوق بؤرة الزلزال مباشرة

أنواع الموجات الزلزالية	مميزاتها
١. موجات أولية ( P )	<ul style="list-style-type: none"> <li>• تهتز جزيئات الصخر في نفس اتجاه حركة الموجة ( للامام والخلف ) ( موجات طولية )</li> <li>• تكون في باطن الأرض</li> <li>• موجات سريعة جدا</li> </ul>
٢. موجات ثانوية ( S )	<ul style="list-style-type: none"> <li>• تهتز جزيئات الصخر عموديا على اتجاه حركة الموجة ( موجات مستعرضة )</li> <li>• تكون في باطن الأرض</li> <li>• اقل سرعة من الموجات الأولية</li> </ul>
٣. موجات سطحية	<ul style="list-style-type: none"> <li>• حركتها معقدة ( ناتجة من حركة الموجتان الأولية والثانوية ) ( موجة )</li> <li>• اقل سرعة من الموجات الأولية والثانوية ( بطيئة )</li> <li>• تكون على سطح الأرض</li> <li>• تمتد لمسافات طويلة</li> <li>• ينتج عنها معظم الدمار الذي يحصل على سطح الأرض</li> <li>• سعتها أكبر من سعة الموجات الأولية والثانوية</li> </ul>




• كيفية تحديد المركز السطحي للزلزال :

١. اختيار ثلاث محطات رصد
٢. رسم دائرة حول كل محطة رصد نصف قطرها يمثل بعد المحطة عن المركز السطحي للزلزال
٣. نقطة تقاطع الدوائر الثلاث تمثل المركز السطحي للزلزال



□ أجهزة قياس الزلازل :

الفرق بين قوة الزلزال وشدة الزلزال	الوظيفة	الأجهزة
○ تعريف قوة الزلزال : هي مقدار الطاقة المتحررة من الزلزال	قياس قوة الزلزال	١. مقياس ريختر [ السيزموجراف ] ▪ تعريف السيزموجراف : ( هو جهاز يستخدم لقياس الموجات الزلزالية ) 
○ تعريف شدة الزلزال : هو مقدار التدمير الجيولوجي والبنائي للزلزال	قياس شدة الزلزال	٢. مقياس ميركالي



## □ التسونامي :

• تعريف التسونامي : هو موجة زلزالية بحرية تحدث في قاع المحيط ولها القدرة على إحداث تدمير كبير

### • مراحل تطور التسونامي :

١. حدوث صدع ( كسر ) في قاع المحيط
٢. ينتج عن هذا الكسر تكون موجة في مكان الكسر تنتقل عبر المحيط بسرعة تتراوح بين ٥٠٠ إلى ٩٥٠ كم / ساعة
٣. في نفس اللحظة التي تكونت فيها الموجة الناتجة في موقع الكسر يحدث انحسار لمياه الشاطئ
٤. عند تقدم الموجة نحو الشاطئ تقل سرعتها نتيجة الاحتكاك بقاع البحر مما يؤدي على تراكم هذه الموجات وتجمعها وتكون موجة قد يصل ارتفاعها إلى ٣٠ م

## □ السلامة من الزلازل :

١. وضع الأشياء الثقيلة في الرفوف المنخفضة
٢. وضع حساسات ثقيل خطوط الغاز تلقائيا واستخدام أنابيب للغاز والماء يمكن أن تنتهي ( مرنة ) وبالتالي منع كسرها
٣. تزويد المباني بدعائم مطاطية ماصة للصدمات وكذلك دعائم فولاذية قوية تتحمل الهزات الأرضية
٤. التنبؤ بحدوث الزلازل من خلال الملاحظات والدراسات ومحطات رصد الزلازل

( الدرس الثاني: البراكين )

□ تعريف البركان :

[ هو جبل مخروطي تتدفق منه الماجما الساخنة والمواد الصلبة والغازات إلى سطح الأرض عبر الفوهة ]

□ تعريف اللابة : [ هي صخور منصهرة تتدفق على سطح الأرض عبر الفوهة ]




□ مخاطر البراكين :

١. تدمير المدن والقرى

٢. إغلاق الموانئ والمطارات ( حجب الرؤية بسبب الدخان )

٣. تلوث الهواء ( بسبب الغازات السامة .. غاز ثاني أكسيد الكربون وغيره ومن الغازات الأخرى )


أشكال البراكين

مثال	المميزات والخصائص	أشكال البراكين	على شكل جبال وتأخذ أشكالاً مختلفة
( بركان ليمار )	 <ul style="list-style-type: none"> <li>• سليكا قليلة</li> <li>• ثوران منخفض</li> <li>• كبيرة الحجم</li> <li>• قليلة الانحدار</li> </ul>	١. البراكين الدرعية	أشكالاً مختلفة
( بركان حرة البرك )	 <ul style="list-style-type: none"> <li>• سليكا عالية</li> <li>• ثوران عنيف</li> <li>• صغيرة الحجم</li> <li>• شديدة الانحدار</li> </ul>	٢. البراكين المخروطية	
( بركان جبل القدر )	 <ul style="list-style-type: none"> <li>• سليكا متغيرة</li> <li>• ثوران من متوسط إلى قوي</li> <li>• متوسطة الحجم</li> </ul>	٣. البراكين المركبة	
( حرة رهط )	<ul style="list-style-type: none"> <li>• تكون الماجما ذات سيوله عالية وتنساب بسهولة</li> <li>• تغطي أكبر مساحة من سطح الأرض</li> </ul>	١. ثوران الشقوق ( البراكين الشقية )	شقوق على شكل

■ ملاحظات هامة :



الماجما : هي مواد منصهرة في باطن الأرض [ تحوي صخور منصهرة + معادن منصهرة + غازات وبخار الماء ]

( الدرس الثالث: حركة الصفائح الأرضية وعلاقتها بالزلازل والبراكين )



١. الغلاف الصخري : هو عبارة عن الصفائح الأرضية المكونة من القشرة الأرضية والجزء العلوي من الستار ( الوشاح ).
٢. الغلاف المائي : هو طبقة لدنة من الستار ( الوشاح ).
٣. الصفيحة : هي قطع من الغلاف الصخري .
٤. حفر الانهدام : هي شقوق طويلة ناتجة من تباعد الصفائح الأرضية بعضها عن بعض .
٥. البقعة الساخنة : هي مادة ناتجة من الصخور المنصهرة والمندفة من باطن الأرض إلى سطح الأرض .

□ الفرضية المفسرة لحركة الصفائح :




حركة الصفائح ناتجة عن تيارات الحمل المتولدة في منطقة الستار ( الوشاح ) والتي يتم تسخينها من لب الأرض

□ أنواع الصفائح الأرضية :

نوع الصفائح	الموقع	الخصائص والمميزات
١. صفيحة محيطية	تقع أسفل المحيط	أكبر كثافة وأقل سمك من الصفائح القارية
٢. صفيحة قارية	تقع أسفل القارات	أقل كثافة وأكبر سمك من الصفائح المحيطية

## حدود الصفائح


تعريف حدود الصفائح : [ هي الحدود الفاصلة بين الصفائح الأرضية ] وتقسّم حسب حركتها إلى :



### ملاحظات هامة :

- 1- تتشكل معظم البراكين على حدود الصفائح
- 2- من الأمثلة على البقع الساخنة ( ما يحدث أسفل جزر هاواي ) .
- 3- تتحرك صفيحة المحيط الهادي باتجاه الشمال والشمال الغربي .
- 4- تتحرك الصفيحة العربية ( الجزيرة العربية ) بشكل دوراني باتجاه الشمال الشرقي .
- 5- يتركز النشاط الزلزالي والبركاني في المملكة العربية السعودية على امتداد البحر الأحمر وحتى خليج العقبة وتمثل هذه المناطق حدود تباعد بين الصفيحة العربية والصفيحة الإفريقية ومن أمثلة تلك الحرات ( حرة رهط ) و ( الشاقة ) .
- 6- تم دراسة باطن الأرض اعتماداً على الموجات الأولية والثانوية واختلاف سرعتها حسب نوع الوسط ( صلب أو سائل ) ، وتوصل العلماء من خلال تجاربهم إلى :

الوسط	كثافته	سرعة الموجات الأولية ( P )
القشرة	٢.٨ جم / سم <sup>٣</sup>	٦ كم / ثانية
أعلى الستار	٣.٣ جم / سم <sup>٣</sup>	٨ كم / ثانية



✓ مثال ( ١ ) :

احسب الزمن الذي تستغرقه موجات ( P ) للانتقال مسافة ٣٠٠ كم في الستار العلوي ؟

المعطيات :

المسافة = ٣٠٠ كم

سرعة الموجة الأولية في الستار العلوي = ٨ كم / ث

المطلوب :

الزمن = ؟؟؟؟

الحل :

$$\frac{\text{المسافة}}{\text{السرعة}} = \text{الزمن}$$

$$\frac{300}{8} = \text{الزمن} = 37.5 \text{ ث}$$

✓ مثال ( ٢ ) :

احسب الزمن الذي تستغرقه موجات ( P ) للانتقال مسافة ٥٠٠ كم في القشرة ؟

المعطيات :

المسافة = ٥٠٠ كم

سرعة الموجة الأولية في القشرة = ٦ كم / ث

المطلوب :

الزمن = ؟؟؟؟

الحل :

$$\frac{\text{المسافة}}{\text{السرعة}} = \text{الزمن}$$

$$\frac{500}{6} = \text{الزمن} = 83.3 \text{ ث}$$

## ( الدرس الأول : نماذج الذرة )


## □ الآراء القديمة حول بنية المادة :

- المادة تتكون من جسيمات صغيرة أطلق عليها ( الذرات ) ( atoms ) وتعني غير قابلة للتقسيم.
- الآراء القديمة حول بنية الذرة قائمة على التفكير المجرد والجدل والمناقشات بعيد عن التجارب العملية

- **تعريف العنصر :** هو مادة تتكون من نوع واحد من الذرات غير قابل للتقسيم أو التجزئة
- **أمثلة :** عنصر الحديد ، عنصر النحاس ، عنصر الأكسجين ، عنصر الكربون

## □ نموذج دالتون للذرة :

1. تتكون المادة من ذرات
2. الذرة غير قابلة للتقسيم
3. ذرات العنصر الواحد متشابهة
4. ذرات العناصر المختلفة تختلف بعضها عن بعض




نموذج دالتون للذرة

## □ نموذج دالتون: [ الذرة عبارة عن كرة ممتلئة ومتجانسة غير قابلة للانقسام ]

## □ الإثبات العلمي ( تجربة وليام كروكس لإثبات نموذج دالتون ) :

## • الأدوات ( تركيب جهاز أنبوب كروكس ) :

1. أنبوب زجاجي يحوي كمية قليلة من الغاز بداخله
2. قطعتان من مادة فلزية تسمى أحدهما ( الكاثود ) والأخرى ( الأنود )
3. أسلاك
4. جسم مثبت في منتصف الأنبوب على شكل ( + )

• **تعريف الكاثود ( المهبط ) :** [ هو مادة فلزية يحمل شحنة سالبة ( - ) ]• **تعريف الأنود ( المصعد ) :** [ هو مادة فلزية يحمل شحنة موجبة ( + ) ]

الاستنتج	المشاهدة
افترض أن التوهج الأخضر هو سبيل من الجسيمات الصغيرة سميت بالأشعة المهبطية لأنها تنتج من المهبط <b>ملحوظة :</b> سمي أنبوب كروكس ( بأنبوب الأشعة المهبطية ) ( CRT )	عند توصيل الأنابيب بأقطاب البطارية يتوهج الأنبوب باللون الأخضر ويظهر ظل الجسم الموجود وسط الأنبوب على الطرف المقابل ( المصعد )


## □ اكتشاف الجسيمات المشحونة [ نموذج طومسون ] :

حاول طومسون تفسير التوهج الأخضر الذي حدث في أنبوب كروكس وهل هو ضوء أم جسيمات مشحونة

الاستنتج	المشاهدة	أدوات التجربة
استنتج أن التوهج الذي حدث في أنبوب كروكس ليس ضوء وإنما جسيمات مشحونة بشحنة ( سالبة ) لأنها انجذبت نحو المصعد ذو الشحنة الموجبة	انحناء الشعاع عند تقريب المغناطيس من الأنبوب حتى عند استبدال المهبط بأنواع أخرى من الفلزات أو استبدال الغاز بأنواع أخرى من الغازات	1. أنبوب كروكس 2. مغناطيس 3. أقطاب مهبطية ( الكاثود ) من فلزات مختلفة وأنواع أخرى من الغازات

## □ نموذج طومسون :

## [ الذرة عبارة عن كرة متعادلة من الشحنات الموجبة والسالبة ]



نموذج طومسون


## □ نموذج رذرفورد :

أدوات التجربة	المشاهدة	الاستنتاج
١. مصدر للجسيمات الموجبة (جسيمات ألفا)	١. معظم الأشعة تنفذ	معظم حجم الذرة فراغ
٢. صفيحة رقيقة من الذهب	٢. قليل من الأشعة تنحرف	هناك جسيمات موجبة الشحنة أدت إلى انحراف الأشعة
٣. شاشة فلورسنتية تتوهج بالضوء عند سقوط جسيمات مشحونة عليها	٣. قليل من الأشعة تتردد (تنعكس)	تتركز كتلة الذرة في منطقة صغيرة أطلق عليها (النواة)

### تعريف جسيمات ألفا ( $\alpha$ ) :

[ هي عبارة عن ذرة أيون الهيليوم وتحتوي على بروتونين ونيوترونين وهي جسيمات موجبة الشحنة ]

**نموذج رذرفورد : [ تتركز كتلة الذرة في منطقة النواة التي تحوي على البروتونات الموجبة وبقية حجم الذرة فراغ ويحوي على الإلكترونات ]**



نموذج رذرفورد للذرة

### النموذج النووي للذرة :

كان نموذج رذرفورد يخلو من ( النيوترونات ) والتي أضيفت فيما بعد ضمن مكونات النواة لمعالجة النقص في كتلة الذرة حيث وجد من خلال التجارب أن كتلة الذرة ضعف كتلة بروتوناتها وحسب هذا النموذج يصبح للذرة نواة تحوي كل من ( البروتونات والنيوترونات ) ويوجد خارج هذه النواة الكترونات تدور حول النواة


- كتلة النيوترون = كتلة البروتون

جسيمات الذرة	التعريف
١. الإلكترون	هو جسيم سالب الشحنة ( - ) ويوجد حول النواة.
٢. البروتون	هو جسيم موجب الشحنة ( + ) ويوجد داخل النواة.
٣. النيوترون	هو جسيم متعادل ( لا يحمل شحنة موجبة ولا شحنة سالبة ) وكتلته تساوي كتلة البروتون ويوجد داخل النواة .

### ◀ تطورات في ترتيب الإلكترونات في الذرة :

نموذج نيلز بور

١. تتحرك الإلكترونات حول النواة في مدارات دائرية ثابتة
٢. لكل مدار طاقة محددة
٣. إذا انتقل الإلكترون من مداره إلى مدار آخر فإنه إما إن يمتص طاقة أو يفقد طاقة





### □ النموذج الذري الحديث :

١. تتألف المادة من ( ذرات )
٢. تتألف الذرة من :
  - أ- نواة تحوي بروتونات ( موجبة ) ونيوترونات ( متعادلة )
  - ب- الكترونات سالبة الشحنة وتوجد حول النواة
٣. تتواجد الإلكترونات حول النواة في كل الاتجاهات والأبعاد مشكلة غيمة أو سحابة الكترونية
٤. تمتلك الإلكترونات خصائص موجية وخصائص جسيمية
٥. لا يمكن تحديد موقع الإلكترون بدقة في لحظة معينة

### • تعريف السحابة الإلكترونية :

[ هي منطقة تحيط بالنواة يحتمل وجود الإلكترون فيها في أي مكان وفي كافة الاتجاهات والأبعاد ]



السحابة الإلكترونية

( الدرس الثاني : النواة )

□ مقبولة :

- تختلف العناصر باختلاف عدد بروتوناتها


- تعريف العدد الذري : [ هو عدد البروتونات الموجودة في نواة العنصر ]
- تعريف عدد الكتلة : [ هو مجموع كل من عدد البروتونات وعدد النيوترونات في نواة العنصر ]

◀ [ قوانين هامة ] :

1. العدد الذري = عدد البروتونات

2. عدد البروتونات = عدد الالكترونات

3. عدد الكتلة = عدد البروتونات + عدد النيوترونات



○ ملحوظة هامة : عدد الكتلة دائما أكبر من العدد الذري .... علل !

- تعريف النظائر : [ هي ذرات لنفس العنصر لها نفس عدد البروتونات وتختلف في عدد النيوترونات ]

• أمثلة على النظائر : نظائر الكربون  $^{12}_6\text{C}$  ،  $^{13}_6\text{C}$  ،  $^{14}_6\text{C}$

نظائر الهيدروجين  $^1_1\text{H}$  ،  $^2_1\text{H}$  ،  $^3_1\text{H}$

نظائر النيتروجين  $^{12}_7\text{N}$  ،  $^{13}_7\text{N}$  ،  $^{14}_7\text{N}$  ،  $^{15}_7\text{N}$

س / أكمل الجدول التالي :

النظير	العدد الذري	عدد النيوترونات	عدد الكتلة	عدد الالكترونات
$^{12}_6\text{C}$	6	6	12	6
$^{13}_6\text{C}$	6	7	13	6
$^{14}_6\text{C}$	6	8	14	6
$^1_1\text{H}$	1	صفر	1	1
$^2_1\text{H}$	1	1	2	1
$^3_1\text{H}$	1	2	3	1
$^{12}_7\text{N}$	7	5	12	7
$^{13}_7\text{N}$	7	6	13	7
$^{14}_7\text{N}$	7	7	14	7
$^{15}_7\text{N}$	7	8	15	7



□ تعريف القوة النووية الهائلة :

( هي قوة تحافظ على تماسك البروتونات عندما تكون متقاربة من بعضها البعض في نواة الذرة )



## □ التحلل الإشعاعي :

- تعريف التحلل الإشعاعي : [ هو تحرير جسيمات وطاقة من أنوية الذرات غير المستقرة ]
- تعريف التحول : [ هو تغير العنصر غير المستقر إلى عنصر آخر عن طريق عملية التحلل الإشعاعي ]
- أمثلة على التحلل الإشعاعي :

وجه المقارنة	جسيمات ألفا	جسيمات بيتا
التعريف	[ هي جسيمات تحوي على بروتونين ونيوترونين وذات شحنة موجبة وتمثل أيون الهيليوم ]	[ هي عبارة عن إلكترونات سالبة الشحنة وذات طاقة عالية تصدر من نواة الذرة ]
العدد الذري ( عدد البروتونات )	يقل بمقدار ( ٢ )	يزداد بمقدار ( ١ )
عدد النيوترونات	يقل بمقدار ( ٢ )	يقل بمقدار ( ١ )
عدد الكتلة	يقل بمقدار ( ٤ )	يبقى ثابت
تغير هوية العنصر	يفقد عنصر الأميريسيوم - ٢٤١ بروتونين ونيوترونين ويتحول إلى عنصر آخر أكثر استقراراً	يتحلل النيوترون الزائد إلى بروتون موجب يبقى داخل النواة وإلكترون سالب يخرج خارج النواة على هيئة جسيمات بيتا ويتحول إلى عنصر آخر أكثر استقراراً
أمثلة عليها	جهاز كاشف الدخان ( تحلل نظير عنصر الأميريسيوم - ٢٤١ )	تحلل نظير الهيدروجين - ٣ إلى نظير الهيليوم - ٣
معادلته	${}_{95}^{241}\text{Am} \longrightarrow {}_{93}^{237}\text{Np} + {}_2^4\text{He}^{+2}$ <p>( جسيمات ألفا )</p>	${}^1_3\text{H} \longrightarrow {}^2_3\text{H} + e^{-}$ <p>( جسيم بيتا )</p>
معدله		

### ❖ فكرة العمل التي يقوم عليها جهاز كاشف الدخان :

- تقوم الفكرة على استخدام عنصر الأميريسيوم - ٢٤١ حيث أن هذا العنصر يطلق الطاقة وجسيمات ألفا.
- تلعب جسيمات ألفا دور في تأين ذرات الهواء وتحرير الإلكترونات وبالتالي تمرير التيار الكهربائي داخل الدائرة الكهربائية وعندها يبقى الجهاز صامتا.
- عند دخول الدخان إلى الجهاز فإنه يمنع انتقال جسيمات ألفا ويمنع تأين الهواء وتحرير الإلكترونات مما يسبب قطع التيار الكهربائي وعندها ينطلق صوت الإنذار.

## □ معدل التحلل ( عمر النصف ) :

- تعريف عمر النصف : [ هو الزمن اللازم لتحلل نصف كمية العنصر ]

### ◀ حساب معدل التحلل [ عمر النصف ] :

(١) - عمر النصف = $\frac{\text{المدة الزمنية}}{\text{عدد الفترات}}$	(٢) - الكتلة المتبقية = $\frac{\text{الكتلة في البداية}}{2^{\text{عدد الفترات}}}$
---	---

مثال (١)

صفحة (١٠٣)

### ○ المعطيات :

- عمر النصف = ١٢.٥ سنة
- الكتلة في البداية = ٢٠ جم
- المدة الزمنية = ٥٠ سنة

### ○ المطلوب :

الكتلة المتبقية = ؟؟؟؟

### ○ الحل :

$$\text{عدد الفترات} = \frac{\text{المدة الزمنية}}{\text{عمر النصف}} = \frac{50}{12.5} = 4 \text{ فترات}$$

$$\text{الكتلة المتبقية} = \frac{\text{الكتلة في البداية}}{2^{\text{عدد الفترات}}} = \frac{20}{2^4} = \frac{20}{16} = 1.25 \text{ جم}$$

al\_no0or2008@hotmail.com

○ الحل :

$$\text{عدد الفترات} = \frac{\text{المدة الزمنية}}{\text{عمر النصف}} \leftarrow \text{عدد الفترات} = \frac{17190}{5730} = 3 \text{ فترات}$$

○ المعطيات :

عمر النصف = ٥٧٣٠ سنة  
الكتلة في البداية = ١٠٠ جم  
المدة الزمنية = ١٧١٩٠ سنة

○ المطلوب :

الكتلة المتبقية = ؟؟؟؟

$$\text{الكتلة المتبقية} = \frac{\text{الكتلة في البداية}}{(\text{عدد الفترات})^2} = \frac{100}{(3)^2} = \frac{100}{9} = 11.11 \text{ جم}$$



### □ التاريخ الكربوني :

- يُستخدم نظير الكربون - ١٤ في معرفة أعمار الكائنات الحية فقط ويبلغ عمر النصف له ( ٥٧٣٠ سنة ) .  
( وذلك من خلال قياس نسبة نظير الكربون - ١٤ إلى نظير الكربون - ١٢ )

النظير	قبل وفاة الكائن الحي	بعد وفاة الكائن الحي
نظير الكربون - ١٢ ( عنصر مستقر وثابت لا يتحلل )	تكون نسبة نظير الكربون - ١٤ إلى نظير الكربون - ١٢ ثابتة لان ما يفقد يتم تعويضه	تقل نسبة نظير الكربون - ١٤ إلى نظير الكربون - ١٢ لان نظير الكربون - ١٤ تقل نسبته نتيجة التحلل فهو عنصر غير مستقر ومشع ولا يتم تعويضه بعد موت الكائن الحي
نظير الكربون - ١٤ ( عنصر غير مستقر ويتحلل مع الوقت )		

- يستخدم العلماء تحلل نظير اليورانيوم- ٢٣٨ إلى الرصاص - ٢٠٦ في تحديد عمر الصخور.

### □ التخلص من النفايات المشعة :

يتم التخلص من النظائر المشعة عن طريق طمرها تحت الأرض بعمق يصل إلى ( ٦٥٥ م )

### □ أنواع النظائر المشعة :

١. نظائر طبيعية

٢. نظائر مصنعة ( من صنع الإنسان ) [ ويتم ذلك بتحويل العناصر المستقرة إلى عناصر غير مستقرة من خلال قذف النواة بجسيمات ( تسمى قذيفة ) وتقوم النواة بامتصاص هذا الجسيم فيتحول العنصر المستهدف إلى عنصر آخر جديد عدده الذري كبير وغير مستقر ]

- ✓ ملحوظة : يستخدم في عملية قذف النواة ما يسمى [ بالمسرعات الذرية ] والتي تعمل على تسريع الجسيم وإطلاقه بسرعة كبيرة باتجاه العنصر المستهدف يستطيع من خلالها أن يصل إلى نواة الهدف

### □ استخدامات النظائر المشعة :

- تسلك النظائر سلوك العنصر المستقر
- النظائر المستخدمة لإغراض طبية تمتاز بأن لها عمر نصف قصير ( قد يكون عمر النصف لها بالساعات ) وهي غالبا نظائر مصنعة .

أولاً تطبيقات النظائر المشعة	○ يستعمل اليود - ١٣١ لتشخيص المشاكل المتعلقة بالغدة الدرقية ○ يستعمل التكنيتيوم - ٩٩ لتتبع عمليات الجسم المختلفة [ عمر النصف له يقدر بـ ٦ ساعات ] ○ تستخدم النظائر المشعة في الكشف عن الأورام السرطانية ومشاكل الهضم ومشاكل الدورة الدموية والتمزقات والكسور
ثانياً تطبيقات النظائر المشعة	○ يستخدم الفسفور - ٣٢ لحقن جذور النباتات لمعرفة مدى الاستفادة من الفسفور في عمليتي النمو والتكاثر ○ تستخدم النظائر المشعة في المبيدات الحشرية لمعرفة مدى تأثيرها على النظام البيئي ○ تستخدم النظائر المشعة في الأسمدة لمعرفة كيفية امتصاص النبات للأسمدة ○ تستخدم النظائر المشعة في قياس مصادر المياه وتعقبها في المناطق الجافة ○ تستخدم النظائر المشعة ( العناصر المتتعبة ) في دراسة الظروف البيئية بصورة عامة

## ( الدرس الأول : مقدمة في الجدول الدوري )

## تطورات الجدول الدوري :

جدول مندليف	- رتب مندليف العناصر حسب الزيادة في عدد الكتلة
جدول موزلي	- رتب العناصر حسب الزيادة في العدد الذري ( عدد البروتونات )
الجدول الدوري الحديث	<ol style="list-style-type: none"> <li>رتب العناصر حسب الزيادة في العدد الذري ( عدد البروتونات )</li> <li>وُضعت العناصر في الجدول الدوري في ( ١٨ ) مجموعة ، و ( ٧ ) دورات</li> <li>قُسم الجدول إلى المناطق التالية: <ol style="list-style-type: none"> <li>العناصر الممتلئة وتشمل المجموعتان ( ١ ، ٢ ) والمجموعات من ( ١٣ ) إلى ( ١٨ )</li> <li>العناصر الانتقالية . وتشمل المجموعات من ( ٣ ) إلى ( ١٢ )</li> <li>العناصر الانتقالية الداخلية ، وتضم كل من : <ul style="list-style-type: none"> <li>سلسلة اللانثانيدات</li> <li>سلسلة الأكتينيدات</li> </ul> </li> </ol> </li> </ol>

- تعريف المجموعة : صف عمودي يحوي عناصر لها خواص كيميائية وفيزيائية متشابهة
- تعريف الدورة : صف أفقي يحوي عناصر تتغير خصائصها بشكل تدريجي يمكن توقعه
- تعريف العناصر الممتلئة : هي عناصر المجموعتان ( ١ ، ٢ ) والمجموعات ( ١٣ - ١٨ ) في الجدول الدوري وتشمل الفلزات واللافلزات وأشباه الفلزات
- تعريف العناصر الانتقالية : هي عناصر المجموعات ( ٣ - ١٢ ) في الجدول الدوري وجميعها عناصر فلزية

## مقارنة بين خصائص كل من الفلزات واللافلزات وأشباه الفلزات :

خصائص الفلزات	خصائص اللافلزات	خصائص أشباه الفلزات
<ol style="list-style-type: none"> <li>لها لمعان وعادة تكون صلبة</li> <li>قابلة للطرق والسحب</li> <li>موصلة جيدة للكهرباء والحرارة</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>هشة وليينة</li> <li>غير قابلة للطرق والسحب</li> <li>رديئة التوصيل الكهربائي والحراري</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>لها لمعان بسيط</li> <li>موصلة للكهرباء والحرارة في درجات الحرارة العالية</li> <li>هشة وليينة</li> </ol>
مثال النحاس - الذهب - الألومنيوم - الرصاص	مثال الهيدروجين - الهيليوم - الزينون - الفلور	مثال الجرمانيوم - السيلكون

## مفتاح العنصر :

- هو صندوق يحوي معلومات عن العنصر ، ومن هذه المعلومات
- اسم العنصر
  - رمز العنصر
  - العدد الذري للعنصر
  - عدد الكتلة للعنصر
  - حالة العنصر [ صلب ، سائل ، غاز ]
  - نوع العنصر [ فلز ، لا فلز ، شبه فلز ]

## توضيح لبعض الرموز الواردة بالجدول الدوري وما تدل عليه :

المكعب	يدل على الحالة الصلبة للعنصر
القطرة	تدل على الحالة السائلة للعنصر
البالون	يدل على الحالة الغازية للعنصر
دائرة بداخلها دائرة صغيرة	تدل على أن العنصر مصنع

## رموز العناصر : تكتب رموز العناصر في الجدول الدوري الحديث بحرف أو حرفين مختصرين وهذه الأحرف تكون مشتقة من :

أصل التسمية	رمز العنصر	اسم العنصر بالانجليزي	اسم العنصر
كلمة إغريقية وتعني مكون الماء	H	Hydrogen	الهيدروجين
اسم ديني عند الإغريق	Th	Thorium	الثوريوم
كلمة لاتينية تعني بزوغ الضوء	Au	Gold	الذهب
كلمة إغريقية وتعني السائل الفضي	Hg	Mercury	الزئبق
من اسم العالم مندليف	Md	Mendelevium	مندليفيوم
على اسم البلد بولندا حيث ولدت ماري كوري	Po	Polonium	بولونيوم

- من اسم العنصر باللغة الانجليزية
- من الاسم اللاتيني أو الإغريقي
- من أسماء العلماء أو بلدانهم

( الدرس الثاني : العناصر الممثلة )

عناصر المجموعتان ( ١ ، ٢ ) :

❖ عناصر المجموعة ( ١ ) :

H	الهيدروجين	لا فلز
Li	الليثيوم	فلز
Na	الصوديوم	
K	البوتاسيوم	
Rb	الروبيديوم	
Cs	السيوميوم	
Fr	الفرانسيوم	

- تسمى هذه المجموعة [ بالفلزات القلوية ]
- تعريف الفلزات القلوية : هي عناصر المجموعة ( ١ ) من الجدول الدوري
- عناصر هذه المجموعة جميعها فلزات ماعدا [ الهيدروجين ]
- عناصر هذه المجموعة صلبة ولامعة وكثافتها منخفضة
- عناصر هذه المجموعة يزداد نشاطها كلما انتقلنا من أعلى إلى أسفل وتميل إلى الاتحاد بعناصر أخرى وتكوين مواد جديدة

أمثلة من عناصر هذه المجموعة مع الاستخدامات

البوتاسيوم	الصوديوم	الليثيوم
✓ يعتبر من العناصر الضرورية للجسم ✓ يوجد بكميات قليلة في البطاطس والموز	✓ يدخل في تركيب مركب (كلوريد الصوديوم) المعروف بـ ( ملح الطعام ) ✓ يعتبر من العناصر الضرورية للجسم ✓ يوجد بكميات قليلة في البطاطس والموز	✓ يدخل في صناعة بطارية الليثيوم المستخدمة في الكاميرات

❖ عناصر المجموعة ( ٢ ) :

Be	البريليوم	فلز
Mg	الماغنسيوم	
Ca	الكالسيوم	
Sr	الاسترانسيوم	
Ba	الباريوم	
Ra	الراديوم	

- تسمى هذه المجموعة [ بالفلزات القلوية الأرضية ( الترابية ) ]
- تعريف الفلزات القلوية الأرضية : هي عناصر المجموعة ( ٢ ) من الجدول الدوري
- عناصر هذه المجموعة جميعها فلزية
- عناصر هذه المجموعة نشطة وتميل إلى الاتحاد مع عناصر أخرى لتكوين مواد جديدة
- أقل نشاط من عناصر المجموعة الأولى
- عناصر هذه المجموعة أكثر صلابة وكثافة مقارنة بعناصر المجموعة الأولى
- درجة انصهارها أعلى من المجموعة الأولى

أمثلة من عناصر هذه المجموعة مع الاستخدامات

الماغنسيوم	البريليوم
✓ يدخل في تركيب كلوروفيل النباتات الخضراء	✓ يوجد في الزمرد

المجموعات من ( ١٣ ) إلى ( ١٨ ) :

❖ عناصر المجموعة ( ١٣ ) :

B	البورون	شبه فلز
Al	الألومنيوم	فلز
Ga	الجاليوم	
In	الإنديوم	
Tl	الثاليوم	

- تسمى هذه المجموعة بعائلة [ البورون ]
- عناصر هذه المجموعة فلزية ماعدا [ البورون ] الذي يعتبر عنصر شبه فلز

أمثلة من عناصر هذه المجموعة مع الاستخدامات

الجاليوم	الألومنيوم	البورون
✓ يستخدم في صناعة رقاقات الحاسوب	✓ يستخدم في صناعة علب المشروبات الغازية وأواني الطهي ومضارب البيسبول	✓ يدخل في صناعة أواني الطهي لمقاومته للحرارة والتبريد

## تابع

### ❖ عناصر المجموعة ( ١٤ ) :

- تسمى هذه المجموعة بعائلة [ الكربون ]
- يعتبر الكربون عنصر لا فلزي والسليكون والجرمانيوم من أشباه الفلزات والقصدير والزرنيخ من الفلزات

C	الكربون	لا فلز
Si	السليكون	شبه فلز
Ge	الجرمانيوم	
Sn	القصدير	فلزات
Pb	الرصاص	

### أمثلة من عناصر هذه المجموعة مع الاستخدامات

الكربون	السليكون والجرمانيوم	القصدير	الرصاص
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ له أشكال مختلفة منها الماس والجرافيت</li> <li>✓ يوجد بأجسام الكائنات الحية</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ يستخدمان في صناعة رقاقات الحاسوب ( صناعة الإلكترونيات )</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ يستخدم في حشو الأسنان</li> <li>✓ يستخدم في طلاء العلب المعدنية المستخدمة في حفظ الطعام</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ يستخدم في الطب لحماية الجسم من أشعة ( X )</li> <li>✓ يستخدم كجدار واقى حول المفاعلات النووية</li> <li>✓ يدخل في صناعة بطاريات السيارات</li> <li>✓ يستخدم في صناعة السبائك</li> </ul>

### ❖ عناصر المجموعة ( ١٥ ) :

- تسمى هذه المجموعة بعائلة [ النيتروجين ]
- يعتبر النيتروجين والفسفور من العناصر اللا فلزية والزرنيخ والانتيمون من العناصر شبه الفلزية والبيزموث من الفلزات

N	النيتروجين	لا فلز
P	الفسفور	شبه فلز
As	الزرنيخ	
Sb	الانتيمون	فلز
Bi	البيزموث	فلز

### أمثلة من عناصر هذه المجموعة مع الاستخدامات

النيتروجين	الفسفور
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ يوجد بنسبة ٨٠ % في الغلاف الجوي</li> <li>✓ يدخل في تركيب المواد الحيوية التي تعمل على تخزين المعلومات الجينية والطاقة في الجسم</li> <li>✓ يدخل في تركيب غاز الأمونيا الذي يعتبر مطهر للجراثيم</li> </ul> <p>❑ ملحوظة هامة :</p> <p>لا يستطيع الجسم أخذ حاجته من النيتروجين عند استنشاقه مباشرة من الهواء ، إذ يجب أن تقوم البكتريا بتحويل غاز النيتروجين إلى مواد يسهل على النبات امتصاصها ثم يأخذ الجسم حاجته من النيتروجين بتناوله للنبات</p>	<p>❑ أنواع الفسفور :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>١. الفسفور الأحمر</li> <li>٢. الفسفور الأبيض</li> </ol> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ يدخل في تركيب المواد الحيوية التي تعمل على تخزين المعلومات الجينية والطاقة في الجسم</li> <li>✓ يعتبر الفسفور مركب أساسي في صحة الأسنان والعظام</li> <li>✓ يعتبر الفسفور من المكونات الأساسية في الأسمدة</li> <li>✓ يعتبر الفسفور الأبيض أكثر نشاطاً من الفسفور الأحمر</li> <li>✓ يستخدم الفسفور الأحمر في صناعة رؤوس أعواد الثقاب حيث يشتعل بفعل الاحتكاك والحرارة</li> </ul>

### ❖ عناصر المجموعة ( ١٦ ) :

- تسمى هذه المجموعة بعائلة [ الأكسجين ]
- يعتبر الأكسجين والكبريت والسيلينيوم من العناصر اللا فلزية والبولونيوم من أشباه الفلزات

O	الأكسجين	لا فلز
S	الكبريت	شبه فلز
Se	السيلينيوم	
Te	التيلوريوم	فلز
Po	البولونيوم	

### أمثلة من عناصر هذه المجموعة مع الاستخدامات

الأكسجين	الكبريت	السيلينيوم
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ يوجد بنسبة ٢٠ % في الغلاف الجوي</li> <li>✓ يحتاج الجسم إلى الأكسجين لإنتاج الطاقة</li> <li>✓ يدخل في تركيب المعادن والصخور</li> <li>✓ ضروري في عملية الاشتعال لذلك تستخدم الرغوة في إطفاء الحرائق</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ صلب وأصفر اللون</li> <li>✓ يدخل في تركيب حمض الكبريتيك الذي يستخدم في الطلاء والأسمدة والمنظفات والمطاط والأنسجة الصناعية</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ عنصر نشط عند تعرضه للضوء</li> <li>✓ يستخدم في صناعة الخلايا الشمسية</li> <li>✓ يستخدم في صناعة آلات التصوير الضوئي</li> </ul>

## تابع

### ❖ عناصر المجموعة ( ١٧ ) :

F	الفلور	فلزات شبه فلز
Cl	الكلور	
Br	البروم	
I	اليود	
At	الأستاتين	

- تسمى هذه المجموعة [ بالهالوجينات ] وتعني ( مكونات الأملاح ) فهي تكون أملاح مع الفلزات القلوية
- تعريف الهالوجينات : هي عناصر المجموعة ( ١٧ ) من الجدول الدوري
- عناصر هذه المجموعة جميعها لا فلزات ما عدا الأستاتين فهو شبه فلز مشع
- أكثر عناصر هذه المجموعة نشاطا هو الفلور ثم الكلور ثم البروم ثم اليود

### أمثلة من عناصر هذه المجموعة مع الاستخدامات

الكلور	اليود
✓ يضاف الكلور إلى ماء الشرب لقتل الجراثيم	✓ يحتاجه الجسم وخصوصا ( الغدة الدرقية )

### ❖ عناصر المجموعة ( ١٨ ) :

He	الهيليوم	غازات شبه فلز
Ne	النيون	
Ar	الأرجون	
Kr	الكريبتون	
Xe	الزينون	
Rn	الرادون	

- تسمى هذه المجموعة بـ [ الغازات النبيلة ]
- تعريف الغازات النبيلة : هي عناصر المجموعة ( ١٨ ) من الجدول الدوري
- عناصر هذه المجموعة جميعها لا فلزات
- عناصر هذه المجموعة جميعها توجد بحالة [ غازية ]
- عناصر هذه المجموعة غير نشطة لذلك كانت تسمى ( بالغازات الخاملة )
- تستخدم في اللوحات الإعلانية فعند مرور التيار الكهربائي فإنها تتوهج بألوان مختلفة

### أمثلة من عناصر هذه المجموعة مع الاستخدامات

الهيليوم	الأرجون	الكريبتون	الرادون
✓ أقل كثافة من الهواء ولا يشتعل ✓ يستخدم في ملء البالونات والمناطق	✓ أكثر الغازات النبيلة تواجد في الطبيعة	✓ يستخدم مع النيتروجين في مصابيح الإنارة العادية وذلك لحفظ الفتيل من الاحتراق ✓ تستخدم مصابيح الكريبتون في إنارة أرضية مدارج المطارات	✓ يعتبر غاز مشع ✓ ناتج من تحلل اليورانيوم في التربة والصخور ✓ يعتبر غاز مضر ويسبب سرطان الرئة بسبب الإشعاعات التي يطلقها هذا الغاز في الهواء الجوي

- تعريف أشباه الموصلات : هي مواد توصل الكهرباء بدرجة أقل من الفلزات وأكثر من اللافلزات

## ( الدرس الثالث : العناصر الانتقالية والعناصر الانتقالية الداخلية )

## أ- العناصر الانتقالية :

- هي عناصر المجموعات من ( ٣ ) إلى ( ١٢ )
- تعتبر جميعها عناصر فلزية
- تحوي على عناصر صلبة وعناصر مصنعة وعناصر سائل وهو ( الزئبق )
- تحوي على ثلاثة عناصر متشابهة في الخصائص تعرف بثلاثية الحديد [ الحديد والكوبالت والنيكل ]
- توجد متحدة مع عناصر أخرى في صورة خامات أو توجد بصورة حرة مثل الذهب والفضة
- ✦ الاستخدامات :
- يدخل عنصر التنجستين في صناعة فتيل المصابيح لأن له درجة انصهار عالية ( ٣٤١٠ م )
- يستخدم الزئبق في صناعة مقاييس الحرارة ومقاييس الضغط لأن له درجة انصهار أقل من أي فلز آخر
- تستخدم [ كعوامل مساعدة ] أو [ عوامل محفزة ] في التفاعلات الكيميائية

خواص العناصر الانتقالية واستخداماتها

■ تعريف العامل المساعد ( العامل المحفز ) :

[ هي مادة تعمل على زيادة سرعة التفاعل الكيميائي دون أن تتغير أو تستهلك فيه ]

## ثلاثية الحديد :

- تشمل ثلاثية الحديد العناصر التالية [ الحديد والكوبالت والنيكل ] وأشهرها وأكثرها استخداماً هو عنصر الحديد
- سميت العناصر الثلاثة السابقة ( بثلاثية الحديد ) لتشابهها في الخصائص ( خصائص مغناطيسية ) وتوجد جميعها في الدورة الرابعة
- يعتبر الحديد من أكثر العناصر الانتقالية ثباتاً لشدة تماسك مكونات النواة في ذرته
- يدخل الحديد في تركيب [ الهيموجلوبين ] الذي ينقل الأكسجين في الدم .
- يدخل الحديد في صناعة الفولاذ ( الفولاذ : هو مزيج من الحديد و الكربون و فلزات أخرى )

## ب- العناصر الانتقالية الداخلية

وتنقسم إلى ما يلي :

- ( ١ ) اللانثانيدات : وهي تمثل السلسلة الأولى من العناصر الانتقالية الداخلية وتتبع لعنصر اللانثيوم
- ( ٢ ) الأكتينيدات : وهي تمثل السلسلة الثانية من العناصر الانتقالية الداخلية وتتبع لعنصر الأكتينيوم

## ١- اللانثانيدات

- تعرف اللانثانيدات بـ [ العناصر الترابية النادرة ]
- سميت بالعناصر الترابية النادرة لأنه كان يعتقد أنها نادرة الوجود في القشرة الأرضية
- عناصر اللانثانيدات فلزات لينة
- يصعب فصلها عندما توجد في خام واحد لأنها متشابهة

## ٢- الأكتينيدات

- جميع الأكتينيدات عناصر مشعة لأن أنويتها غير مستقره
- اليورانيوم والثوريوم والبروتكتينيوم هي العناصر المشعة الوحيدة الموجودة في الطبيعة
- بقية عناصر الأكتينيدات عناصر مصنعة ومشعة ولها استخدامات منها :

البلوتونيوم	يستخدم كوقود في المفاعلات النووية
الأميريسيوم	يستخدم في أجهزة الكشف عن الدخان
الكاليفورنيوم - ٢٥٢	يستخدم في قتل الخلايا السرطانية

- يتم الحصول على العناصر المصنعة من خلال دمج نواتين باستخدام مسرعات الجسيمات

## طب الأسنان ومواده :

- كان يستخدم أطباء الأسنان سابقاً مزيج من النحاس والفضة والقصدير والزنثيق لحشو فجوات الأسنان مما يعرض البعض لأبخرة الزنثيق السامة
- الآن يستخدم أطباء الأسنان الصمغ والبورسلان وتمتاز بأنها مواد مقاومة كيميائياً لسوائل الجسم
- كذلك يستخدم اليوم سبائك من النيكل والتيتانيوم لتقويم الأسنان



( الدرس الأول : انهد الذرات )

البناء الذري :

- تتألف المادة من [ ذرات ] وتتألف الذرة من :

موجبة	<b>p</b>	بروتونات	نواة ( موجبة الشحنة )
متعادلة	<b>n</b>	نيوترونات	
سالبة	<b>e</b>	الكترونات	-2 سحابة الكترونية حول النواة يوجد بها

التوزيع الإلكتروني وترتيب الإلكترونات :


- تتواجد الإلكترونات حول نواة الذرة في مناطق تعرف بـ [ مجالات الطاقة ]
- تعريف مجالات الطاقة : [ هي المناطق التي توجد بها الإلكترونات حول النواة في السحابة الإلكترونية ]
- يتم التوزيع الإلكتروني من خلال [ العدد الذري ]
- يتسع كل مجال من مجالات الطاقة لعدد محدد من الإلكترونات ولتحديد أقصى عدد ممكن لكل مجال من مجالات الطاقة نستخدم العلاقة التالية:

$$2 \times 2 \times \dots \times 2 \quad \leftarrow \text{حيث أن ( ن )}$$

رقم مجال الطاقة

مجال الطاقة	الحد الأقصى من الإلكترونات لمجال الطاقة الأخير للوصول لحالة الاستقرار
الأول	2
الثاني	8
الثالث	18
الرابع	32

أمثلة على التوزيع الإلكتروني لبعض الذرات :



- وجد من خلال التوزيع الإلكتروني أن جميع عناصر ( الغازات النبيلة ) مستقرة - لأن مجال الطاقة الأخير ممتلئ تماماً بـ ( 8 ) إلكترونات ماعدا غاز الهيليوم الذي يمتلئ ( بإلكترونين ) فقط
- تسعى عناصر كل مجموعة من العناصر الممتلئة إلى مشابهة الغازات النبيلة بحيث يكون مجال الطاقة الخارجي لها ممتلئاً بالإلكترونات
- يمكن معرفة عدد إلكترونات مجال الطاقة الخارجي ( الأخير ) لكل مجموعة من مجموعات العناصر الممتلئة بالرجوع إلى الجدول التالي :

المجموعة (١٨)	المجموعة (١٧)	المجموعة (١٦)	المجموعة (١٥)	المجموعة (١٤)	المجموعة (١٣)	المجموعة (٢)	المجموعة (١)	المجموعات
٨	٧	٦	٥	٤	٣	٢	١	عدد الإلكترونات في مجال الطاقة الأخير
مستقر	يكتسب	يكتسب	يكتسب	مشارك	يفقد	يفقد	يفقد	ما يحدث للإلكترونات مجال الطاقة الأخير للوصل للاستقرار ( مشابهة الغاز النبيل )
	١ -	٢ -	٣ -	٤	٣ +	٢ +	١ +	

- رقم الدورة في الجدول الدوري يدل على : [ يدل على رقم المدار الأخير ]
- رقم المجموعة في الجدول الدوري يدل على : [ عدد إلكترونات مجال الطاقة الأخير ]
- خلال الدورة الواحدة كلما اتجهنا من اليسار إلى اليمين نجد أن: الحجم الذري لذرات العناصر يقل بسبب ثبات المدارات وزيادة عدد الإلكترونات وبالتالي يزداد مقدار التجاذب بين النواة والإلكترونات مما يؤدي إلى نقصان الحجم الذري
- خلال المجموعة الواحدة كلما اتجهنا من أعلى إلى أسفل المجموعة نجد أن : العدد الذري يزداد وبالتالي يزداد عدد المدارات مما يؤدي إلى زيادة الحجم الذري ( انظر إلى الشكل التالي )

كلما انتقلنا من اليسار إلى اليمين خلال الدورة الواحدة

كلما انتقلنا من الأعلى إلى الأسفل خلال المجموعة الواحدة

١. يقل الحجم الذري
٢. مجال الطاقة ثابت
٣. زيادة بالعدد الذري ( عدد الإلكترونات )
٤. يزداد التجاذب بين النواة والإلكترونات
٥. يصعب فصل الإلكترونات

١. يزداد الحجم الذري
٢. يضاف مجال طاقة جديد
٣. زيادة بالعدد الذري ( عدد الإلكترونات )
٤. يقل التجاذب بين النواة وإلكترونات المجال الأخير
٥. يسهل فصل الإلكترونات
٦. يزداد نشاط العنصر كلما نزلنا لأسفل المجموعة كما في المجموعة الأولى ( الفلزات القلوية )

١	H			
٢	Li	Be	B	C
٣	Na	Mg	Al	Si
٤	K	Ca	Ga	Ge

• يتم تحديد نشاط العنصر من الحالتين التاليتين :

في حالة الفقد	كلما كان مجال الطاقة الخارجي أبعد عن النواة كلما كان فصل الإلكترون أسهل وبالتالي يكون العنصر أكثر نشاطاً من تلك العناصر التي يقترّب فيها مجال الطاقة الخارجي من النواة
في حالة الاكتساب	كلما كان مجال الطاقة الخارجي أقرب إلى النواة كلما كان اكتساب الإلكترون أسهل وبالتالي يكون العنصر أكثر نشاطاً من تلك العناصر التي يبتعد فيها مجال الطاقة الخارجي عن النواة

### ◀ التمثيل النقطي للإلكترونات :

تعريف التمثيل النقطي للإلكترونات	هو عبارة عن رمز العنصر محاط بنقاط تمثل عدد الإلكترونات في مجال الطاقة الخارجي
تعريف الرابطة الكيميائية	هي القوى التي تربط ذرتين إحداهما مع الأخرى
فائدة التمثيل النقطي للإلكترونات	يوضح كيفية ارتباط ذرات العناصر بعضها مع بعض

- س / كيف يتم تمثيل إلكترونات مجال الطاقة الخارجي ( الأخير ) بالنقاط ؟
- تحديد عدد الإلكترونات في المجال الطاقة الخارجي
- يكون التمثيل النقطي للإلكترونات باتجاه عقارب الساعة
- يبدأ التمثيل بوضع نقطه فوق العنصر ثم عن يمين العنصر ثم أسفل العنصر ثم عن يسار العنصر
- يعاد التمثيل بنفس الطريقة إذا كان هناك الكترونات أخرى بحيث تكون هذه النقاط بصورة أزواج على الجهات الأربع لرمز العنصر

### □ أمثلة على التمثيل النقطي للإلكترونات :

المجموعات	( ١ )	( ٢ )	( ١٣ )	( ١٤ )	( ١٥ )	( ١٦ )	( ١٧ )	( ١٨ )
التمثيل النقطي للإلكترونات	H	Mg	Al	C	N	O	F	Ne

( الدرس الثاني : ارتباط العناصر )



- تعريف المركب : هو مادة تتكون من عنصرين أو أكثر
- تعريف الأيون : هو ذرة فقدت أو اكتسبت إلكترون أو أكثر

◀ أنواع الروابط الكيميائية :

١. الرابطة الأيونية
٢. الرابطة الفلزية
٣. الرابطة التساهمية ( المشاركة )

■ أولاً : الرابطة الأيونية

[ هي رابطة تنشأ بين أيونين شحنتيهما مختلفة ]		تعريفها
<p>تتكون الرابطة الأيونية بين فلز ولافلز</p> <p>الفلزات تفقد إلكترونات مجال الطاقة الخارجي ولافلزات تكتسب إلكترونات مجال الطاقة الخارجي</p> <p>العنصر الذي يفقد إلكتروناته تظهر عليه شحنة موجبة بعدد ما فقد من إلكترونات ويسمى ( أيون موجب )</p> <p>العنصر الذي يكتسب تظهر عليه شحنة سالبة بعدد ما اكتسبه من إلكترونات ويسمى ( أيون سالب )</p>		مميزاتها
<p><b>الخطوة الأولى</b></p> $\text{Mg} \cdot \longrightarrow [\text{Mg}]^{+2} + \cdot\cdot$ <p>ذرة مغنسيوم      أيون مغنسيوم      إلكترونين</p>	<p><b>الخطوة الأولى</b></p> $\text{Na} \cdot \longrightarrow [\text{Na}]^{+} + \cdot$ <p>ذرة صوديوم      أيون الصوديوم      إلكترون</p>	أشياء علاقة على الرابطة الأيونية
<p><b>الخطوة الثانية</b></p> $\cdot \ddot{\text{O}} : + \cdot\cdot \longrightarrow [ : \ddot{\text{O}} : ]^{-2}$ <p>ذرة أكسجين      إلكترونين      أيون الأكسيد</p>	<p><b>الخطوة الثانية</b></p> $\cdot \ddot{\text{Cl}} : + \cdot \longrightarrow [ : \ddot{\text{Cl}} : ]^{-}$ <p>ذرة كلور      إلكترون      أيون الكلور</p>	
<p><b>الخطوة الثالثة</b></p> $[\text{Mg}]^{+2} + [ : \ddot{\text{O}} : ]^{-2} \longrightarrow \text{MgO}$ <p>أيون المغنسيوم الموجب      أيون الأكسيد السالب      أكسيد المغنسيوم</p> <p>اتحاد المغنسيوم مع الأكسجين لتكوين مركب أكسيد المغنسيوم</p>	<p><b>الخطوة الثالثة</b></p> $[\text{Na}]^{+} + [ : \ddot{\text{Cl}} : ]^{-} \longrightarrow \text{NaCl}$ <p>أيون الصوديوم الموجب      أيون الكلور السالب      كلوريد الصوديوم ( ملح الطعام )</p> <p>اتحاد الصوديوم مع الكلور لتكوين كلوريد الصوديوم ملح الطعام</p>	
<p>٣- اتحاد المغنسيوم مع جزئ الكلور لتكوين كلوريد المغنسيوم ( بنفس الطريقة يتم التفاعل )</p>		



### ■ ثانياً : الرابطة الفلزية

تعريفها	مميزاتها
[ هي رابطة تنشأ عن تجاذب إلكترونات مجال الطاقة الخارجي لذرات الفلز ]	<ul style="list-style-type: none"> <li>- الرابطة الفلزية تنشأ بين الفلزات</li> <li>- الرابطة الفلزية هي التي تفسر سبب قابلية الفلزات للطرق والسحب</li> <li>- الرابطة الفلزية هي التي تفسر سبب التوصيل الكهربائي والحراري للعناصر الفلزية وذلك بسبب ميل هذه العناصر إلى فقد إلكترونات مجال الطاقة الخارجي</li> </ul>
مثال على الرابطة الأيونية	<p>الرابطة الفلزية في الفضة ( Ag )</p>

## ثالثاً : الرابطة التساهمية [ امشاركة ]

تعريفها										
<p>[ هي رابطة تنشأ بين ذرات العناصر اللافلزية من خلال المشاركة بالإلكترونات مجال الطاقة الخارجي ]</p> <p>- تنشأ الرابطة التساهمية لذرات العناصر غير القادرة على فقد أو اكتساب إلكترونات في مجال الطاقة الخارجي مثل ذرة الكربون التي تحوي على ( ٤ ) إلكترونات بمجال الطاقة الخارجي ففقد أو اكتساب هذا العدد من الإلكترونات لكي تصل ذرة الكربون إلى حالة الاستقرار يصعب على الذرة لأنه يتطلب طاقة كبيرة جداً</p> <p>- تنشأ الرابطة التساهمية بين ذرات العناصر اللافلزية</p> <p>- ينتج عن الرابطة التساهمية [ مركبات جزيئية ] ومن أمثلة المركبات الجزيئية ما يلي :</p>										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>جزئ الهيدروجين</th> <th>جزئ الأكسجين</th> <th>جزئ الكلور</th> <th>جزئ النيتروجين</th> <th>جزئ ثاني أكسيد الكربون</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H<sub>2</sub></td> <td>O<sub>2</sub></td> <td>Cl<sub>2</sub></td> <td>N<sub>2</sub></td> <td>CO<sub>2</sub></td> </tr> </tbody> </table>	جزئ الهيدروجين	جزئ الأكسجين	جزئ الكلور	جزئ النيتروجين	جزئ ثاني أكسيد الكربون	H <sub>2</sub>	O <sub>2</sub>	Cl <sub>2</sub>	N <sub>2</sub>	CO <sub>2</sub>
جزئ الهيدروجين	جزئ الأكسجين	جزئ الكلور	جزئ النيتروجين	جزئ ثاني أكسيد الكربون						
H <sub>2</sub>	O <sub>2</sub>	Cl <sub>2</sub>	N <sub>2</sub>	CO <sub>2</sub>						
<p>• تعريف الجزئ : [ هو الوحدة الأساسية للمركبات الجزيئية ]</p> <p>- لا يوجد أيونات في تفاعلات الرابطة التساهمية لأنه لا يوجد فقد أو اكتساب للإلكترونات مجال الطاقة الخارجي</p>										

### أنواع الرابطة التساهمية ( المشاركة )

١. الرابطة التساهمية الأحادية	٢. الرابطة التساهمية الثنائية	٣. الرابطة التساهمية الثلاثية
تنتج عن مشاركة كل ذرة بإلكترون واحد من مجال الطاقة الخارجي	تنتج عن مشاركة كل ذرة بالإلكترونان من مجال الطاقة الخارجي	تنتج عن مشاركة كل ذرة بثلاثة إلكترونات من مجال الطاقة الخارجي
مثال : جزئ الهيدروجين	مثال : جزئ ثاني أكسيد الكربون	مثال : جزئ النيتروجين
H••H	:O::C::O:	:N:::N:

◀ الجزيئات القطبية والجزيئات غير القطبية : وتنقسم حسب المشاركة بالإلكترونات إلى :

أ- الجزيئات القطبية :

تعريفها	الماء ( أكسيد الهيدروجين )	كلوريد الهيدروجين
أمثلة على الرابطة القطبية	<p>شحنة جزئية سالبة</p>  <p>شحنة جزئية موجبة</p>	<p>شحنة جزئية موجبة</p>  <p>شحنة جزئية سالبة</p>

ب- الجزيئات غير القطبية :

تعريفها	جزئ النيتروجين	جزئ الهيدروجين
أمثلة على الرابطة غير القطبية	:N:::N:	H••H

◀ الرموز والصيغ الكيميائية :

• تعريف الصيغ الكيميائية : [ هي رموز كيميائية وأرقام تبين أنواع ذرات العناصر المكونة للمركب أو الجزئ وأعدادها ]

• أمثلة على الصيغ الكيميائية :

اسم المركب	صيغته الكيميائية	مكونات المركب أو الجزئ من خلال الصيغة
جزئ الكلور	Cl <sub>2</sub>	يتكون من ذرتين كلور
الماء	H <sub>2</sub> O	يتكون من ذرتين هيدروجين وذرة أكسجين واحدة
الأمونيا	NH <sub>3</sub>	يتكون من ثلاث ذرات هيدروجين وذرة نيتروجين واحدة
كبريتيد الفضة	Ag <sub>2</sub> S	يتكون من ذرتين فضة وذرة كبريت واحدة
حمض الكبريتيك	H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub>	يتكون من ذرتين هيدروجين وأربع ذرات أكسجين وذرة كبريت واحدة

( الدرس الأول : الصيغ والمعادلة الكيميائية )

◀ أنواع التغيرات التي تطرأ على المادة ( خصائص المادة ) :

1. تغيرات فيزيائية	[ هي تغيرات تؤثر في خصائص المادة الفيزيائية فقط ] ○ مثال : تغير الحجم – تغير الشكل – تغير حالة المادة ( تجمد الماء ، طي الورقة )
2. تغيرات كيميائية	[ هي تغيرات تؤثر في خصائص المادة الكيميائية وتنتج مادة جديدة بخصائص مختلفة ] ○ مثال : التفاعلات الكيميائية ( صدأ الحديد ، احتراق الورقة ، تكون ملح الطعام )

• تعريف النفاعل الكيميائي : [ هو تغير كيميائي ينتج عنه مادة جديدة لها خصائص تختلف عن خصائص المادة الأصلية

( المادة المتفاعلة أو الداخلة في التفاعل )

• هدلولات ( دلائل ) حدوث التفاعل الكيميائي :

- |               |               |                          |
|---------------|---------------|--------------------------|
| 1. تغير اللون | 2. تغير الطعم | 3. انطلاق صوت ( انفجار ) |
| 4. الضوء      | 5. ظهور حرارة | 6. تصاعد غاز             |
|               |               | 7- تكون راسب             |

◀ المعادلات الكيميائية :

تعريف المعادلة الكيميائية	[ هي صيغة مختصرة توضح المواد المتفاعلة والمواد الناتجة وأحيانا توضح ما إذا استخدمت طاقة أو تحررت طاقة ]
تعريف المتفاعلات ( المواد المتفاعلة )	[ هي المواد البادئة للتفاعل ] أو [ هي المواد التي توجد قبل التفاعل الكيميائي ]
تعريف النواتج ( المواد الناتجة )	[ هي مواد ناتجة عن التفاعل الكيميائي ]

◀ طرق كتابة المعادلات الكيميائية :

وجه المقارنة	أ- المعادلات اللفظية ( باستخدام الكلمات )	ب- المعادلات الرمزية ( باستخدام الصيغ الكيميائية )
أوجه الاختلاف	- تكون المواد المتفاعلة يمين السهم ويفصل بينهم ( + ) - تكون النواتج يسار السهم ويفصل بينهم ( + ) - السهم ينطق بكلمة ( ينتج ) - لا يمكن من خلالها معرفة عدد الذرات الداخلة في التفاعل أو الناتجة من التفاعل الكيميائي - في هذا النوع من المعادلات تستخدم الأسماء الكيميائية بدلا من الأسماء الشائعة	- تكون المواد المتفاعلة يسار السهم ويفصل بينهم ( + ) - تكون النواتج يمين السهم ويفصل بينهم ( + ) - السهم ينطق بكلمة ( ينتج ) - يمكن من خلالها معرفة عدد الذرات الداخلة في التفاعل أو الناتجة من التفاعل الكيميائي - تعبر الأرقام الصغيرة التي تكتب يمين الذرات إلى الأسفل عن عدد ذرات كل عنصر في المركب
أمثلة	صودا الخبز + خل ← غاز + مادة صلبة بيضاء صوديوم + كلور ← كلوريد الصوديوم فحم + أكسجين ← رماد + غاز + حرارة فضة + كبريتيد الهيدروجين ← مادة سوداء + غاز شريحة تفاح + أكسجين ← تحول لون التفاح إلى البني	① $CH_4 + 2O_2 \longrightarrow CO_2 + 2H_2$ + طاقة ② $Na + Cl \longrightarrow NaCl$ ③ $2Ag + H_2S \longrightarrow Ag_2s + H_2$

← قانون حفظ الكتلة ( قانون لافوزية ) :

• نص قانون حفظ الكتلة :

[ كتلة المواد المتفاعلة = كتلة المواد الناتجة ] ( أو ) [ عدد ذرات المتفاعلات = عدد ذرات النواتج ]

← كيفية وزن المعادلة الكيميائية [ خطوات وزن المعادلة الكيميائية ] :

1. نحسب عدد الذرات لكل عنصر في المتفاعلات ( من خلال ضرب الرقم الموجود قبل الصيغة في الرقم الموجود أسفل يمين الصيغة )
2. نحسب عدد الذرات لكل عنصر في النواتج ( من خلال ضرب الرقم الموجود قبل الصيغة في الرقم الموجود أسفل يمين الصيغة )
3. ( الرقم واحد ) عادة لا يكتب - لذلك إذا لم يكن هناك رقم قبل الصيغة أو أسفل يمين الصيغة فيكون هو الرقم ( واحد )
4. عندما تكون أعداد الذرات غير متساوية بين طرفي المعادلة الكيميائية نقول أن المعادلة الكيميائية غير موزونة ولوزنها نضع رقم مناسب قبل الصيغة الكيميائية سواء في المتفاعلات أو النواتج
5. نعيد الخطوتين ( 1 ) و ( 2 ) للتأكد من أعداد الذرات إلى أن تصبح أعداد ذرات المتفاعلات = أعداد ذرات النواتج


• ملاحظات هامة :

- عدم تغيير الأرقام الصغيرة الموجودة يمين أسفل ذرات العناصر في الصيغة الكيميائية
- عدم وضع الرقم بمنتصف الصيغة عند وزن المعادلات الكيميائية وإنما وضع الرقم يسار الصيغة الكيميائية
- في أغلب المعادلات الكيميائية الرقمين ( 2 ) و ( 3 ) تكفي لوزن المعادلة الكيميائية

أهتلة على وزن المعادلات الكيميائية :

①

المعادلة الكيميائية بعد الوزن



المواد المتفاعلة

$$2 = Al$$


$$6 = I$$

المواد الناتجة

$$2 = Al$$

$$6 = I$$

المعادلة الكيميائية قبل الوزن



المواد المتفاعلة

$$1 = Al$$

$$2 = I$$

المواد الناتجة

$$1 = Al$$

$$2 = I$$

②

المعادلة الكيميائية بعد الوزن



المواد المتفاعلة

$$4 = H$$


$$2 = O$$

المواد الناتجة

$$4 = H$$

$$2 = O$$

المعادلة الكيميائية قبل الوزن



المواد المتفاعلة

$$2 = H$$

$$2 = O$$

المواد الناتجة

$$2 = H$$

$$1 = O$$

③

المعادلة الكيميائية بعد الوزن



المواد المتفاعلة

$$1 = C$$

$$4 = H$$

$$4 = O$$

المواد الناتجة

$$1 = C$$

$$4 = H$$

$$4 = 2 + 2 = O$$

المعادلة الكيميائية قبل الوزن



المواد المتفاعلة

$$1 = C$$

$$4 = H$$

$$2 = O$$

المواد الناتجة

$$1 = C$$

$$2 = H$$

$$2 = 1 + 2 = O$$



• س / حدد الأخطاء الموجودة في وزن المعادلات الكيميائية التالية ٢٢

①

المعادلة الكيميائية بعد الوزن		المعادلة الكيميائية قبل الوزن	
$Al + 3I_2 \longrightarrow Al_2I_3$		$Al + I_2 \longrightarrow AlI_3$	
المواد المتفاعلة	المواد الناتجة	المواد المتفاعلة	المواد الناتجة
١ = Al ٦ = I	١ = Al ٦ = I	١ = Al ٢ = I	١ = Al ٣ = I

②

المعادلة الكيميائية بعد الوزن		المعادلة الكيميائية قبل الوزن	
$H_2 + O_2 \longrightarrow H_2O_2 + \text{طاقة}$		$H_2 + O_2 \longrightarrow H_2O + \text{طاقة}$	
المواد المتفاعلة	المواد الناتجة	المواد المتفاعلة	المواد الناتجة
٢ = H ٢ = O	٢ = H ٢ = O	٢ = H ٢ = O	٢ = H ١ = O

③

المعادلة الكيميائية بعد الوزن		المعادلة الكيميائية قبل الوزن	
$CH_2 + 3O_2 \longrightarrow C\ 2O_2 + H_2\ 2O + \text{طاقة}$		$CH_4 + O_2 \longrightarrow CO_2 + H_2O + \text{طاقة}$	
المواد المتفاعلة	المواد الناتجة	المواد المتفاعلة	المواد الناتجة
١ = C ٢ = H ٦ = O	١ = C ٢ = H ٦ = ٢ + ٤ = O	١ = C ٤ = H ٢ = O	١ = C ٢ = H ٣ = ١ + ٢ = O


◀ أنواع التفاعلات الكيميائية من حيث الطاقة:

وجه المقارنة	( أ ) - التفاعلات الطاردة للطاقة الحرارية	( ب ) - التفاعلات الماصة للطاقة الحرارية
التعريف	[ هو ذلك التفاعل الذي يتحرر خلاله طاقة ]	[ هو ذلك التفاعل الذي يمتص خلاله طاقة ]
أهم مميزات التفاعل	- تكون المتفاعلات أقل استقرار من النواتج - تكون طاقة روابط المتفاعلات أعلى من طاقة روابط النواتج - تكون الطاقة مع النواتج ( يمين السهم ) - تنقسم إلى نوعين : ١. تحرير سريع : فيه تتحرر الطاقة بسرعة ٢. تحرير بطئ : فيه تتحرر الطاقة ببطء	- تكون المتفاعلات أكثر استقرار من النواتج - تكون طاقة روابط المتفاعلات أقل من طاقة روابط النواتج - تكون الطاقة مع المتفاعلات ( يسار السهم )
صور الطاقة	تظهر الطاقة بالصور التالية : ( طاقة حرارية ، طاقة ضوئية ، طاقة كهربائية ، طاقة صوتية )	
أمثلة	○ احتراق الفحم النباتي ( تحرير سريع ) ○ صدأ الحديد ( تحرير بطئ )	○ الطاقة الكهربائية اللازمة لكسر جزيئات الماء ( تفاعلات التحلل الكهربائي ) ○ الكمادات الباردة التي توضع على مكان الألم
	$2H_2 + O_2 \longrightarrow 2H_2O + \text{طاقة}$	$2H_2O + \text{طاقة} \longrightarrow 2H_2 + O_2$


■ أمثلة أخرى على وزن المعادلة الكيميائية  
س : أوزن المعادلات الكيميائية التالية :



■ الحل :




②




■ الحل :




③




■ الحل :



④



■ الحل :



■ المعادلة :- ( ١ )

بعد الوزن		قبل الوزن	
النواتج	المتفاعلات	النواتج	المتفاعلات
٣ = Na	٣ = Na	١ = Na	١ = Na
١ = Al	١ = Al	١ = Al	١ = Al
٣ = Cl	٣ = Cl	١ = Cl	٣ = Cl

■ المعادلة :- ( ٢ )

بعد الوزن		قبل الوزن	
النواتج	المتفاعلات	النواتج	المتفاعلات
٢ = K	٢ = K	١ = K	١ = K
٢ = Br	٢ = Br	٢ = Br	١ = Br
٢ = Cl	٢ = Cl	١ = Cl	٢ = Cl

■ المعادلة :- ( ٤ )

بعد الوزن		قبل الوزن	
النواتج	المتفاعلات	النواتج	المتفاعلات
٦ = Fe	٦ = Fe	٢ = Fe	٢ = Fe
٢ + ٨ = O	١ + ٩ = O	٢ + ٤ = O	١ + ٣ = O
١٠ =	١٠ =	٦ =	٤ =
١ = C	١ = C	١ = C	١ = C

## ( الدرس الثاني : سرعة التفاعلات الكيميائية )

◀ أنواع التفاعلات الكيميائية من حيث طريقة حدوثها :

٢- غير تلقائية

١- تلقائية

◀ تعريف طاقة التنشيط :

[ هو الحد الأدنى ( الأقل ) من الطاقة اللازمة لبدء التفاعل الكيميائي ] أو [ هو الطاقة اللازمة لبدء التفاعل الكيميائي ]

◀ سرعة التفاعل الكيميائي

تعريف	[ هو مقياس لمدى سرعة حدوث التفاعل الكيميائي ]
كيفية قياس سرعة التفاعل الكيميائي	<ul style="list-style-type: none"> <li>• سرعة استهلاك أحد المتفاعلات</li> <li>• سرعة تكون أحد النواتج</li> </ul>
العوامل المؤثرة على سرعة التفاعل الكيميائي	١. درجة الحرارة ٢. تركيز المواد المتفاعلة ٣. مساحة السطح ( منطقة التلامس )

◀ العوامل المؤثرة على سرعة التفاعل الكيميائي :

وجه المقارنة	التعريف	الأثر على سرعة التفاعل الكيميائي	الأمثلة
١. درجة الحرارة		ارتفاع درجة الحرارة يزيد من معدل التصادمات بين الجزيئات وزيادة لكسر الروابط ( طاقة التنشيط )	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ حفظ الفواكه واللحوم داخل الثلاجة</li> <li>○ نضوج العجين أو الكيك داخل الفرن</li> </ul>
٢. التركيز ( تركيز المواد المتفاعلة )	<ul style="list-style-type: none"> <li>• تعريف التركيز: [ هو كمية المادة الموجودة في حجم معين ]</li> </ul>	زيادة تركيز المواد المتفاعلة يزيد من التصادمات بين الجزيئات وهذا بدوره يوفر طاقة تكفي لكسر الروابط ( طاقة التنشيط )	
٣. مساحة السطح ( منطقة التلامس )		زيادة مساحة منطقة التلامس بين المواد المتفاعلة يزيد من سرعة التفاعل	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ برادة الحديد تصدأ بمعدل أسرع من قضيب من الحديد ( بافتراض أن الكتلة واحدة )</li> <li>○ نشارة الخشب تشتعل بمعدل أسرع من قطعة من الخشب ( بافتراض أن الكتلة واحدة )</li> </ul>

## ◀ تسريع التفاعل الكيميائي [ العوامل المساعدة او المحفزات ] :

[ هو مادة تعمل على تسريع التفاعل الكيميائي دون أن تتغير أو تستهلك في التفاعل الكيميائي ]	تعريف العامل المساعد ( المحفز )
تؤدي إلى زيادة سرعة التفاعل الكيميائي من خلال : ○ توفير مساحة سطح مناسبة تساعد المواد المتفاعلة على الالتقاء والتصادم ○ تخفيض طاقة التنشيط اللازمة لبدء التفاعل الكيميائي	أثر العوامل المحفزة على سرعة التفاعل الكيميائي
أ- الإنزيمات ب- تستخدم في عوادم السيارات والشاحنات	أمثلة على العوامل المحفزة

## ■ المحفزات النشطة [ الإنزيمات ] :

[ هو مادة بروتينية تعمل على تسريع وتنظيم التفاعل الكيميائي في خلايا جسم الكائن الحي ]	تعريف الإنزيمات
أ- تحويل الطعام إلى طاقة ب- بناء أنسجة العظام والعضلات ج- تحويل الطاقة إلى دهون د- إنتاج أنزيمات أخرى	أهميته الإنزيمات
( الإنزيمات متخصصة ) أي أن كل نوع من التفاعلات التي تحدث في خلايا الجسم له إنزيم خاص	ملاحظة هامة

## ◀ إبطاء التفاعل الكيميائي [ المثبطات ] :

[ هي مواد تعمل على إبطاء التفاعل الكيميائي ]	تعريف المثبطات
تعمل المثبطات على زيادة الوقت اللازم لتكون أحد النواتج	أثر العوامل المحفزة على سرعة التفاعل الكيميائي
[ BHT ] ( هيدروكسي تولوين ) ووظيفته إبطاء فساد المواد الغذائية وإطالة مدة صلاحيتها	مثال على المثبطات

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَشْكُرَهُ إِلَّا بِحَمْدِهِ  
اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَوَجْهَةِ  
رَبِّنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ

لا تنسوننا من صالح دعائكم في ظهر الغيب ]

al\_no0or2008@hotmail.com