


اختر الاجابة الصحيحة من بين الاجابات التالية

1- افضل علاقة بيانية بين قوة الارجاع و الازاحة هي



2- موجة زمنها الدوري s (3) يكون ترددها تقريبا بوحدة بالهرتز :

- 0.1
- 3
- 30
- 0.3

3- مقدار الزاوية التي يمسخها نصف القطر في الثانية الواحدة تسمى :

- السرعة
- الزمن الدوري
- السرعة الزاوية
- الحركة الدورية

3/4

علل ما يأتي تعليلا علميا دقيقا :

- تستمر كرة البندول في الحركة عند موضع الاتزان رغم أن قوة الارجاع منعدمة بسبب تحول طاقة الوضع الى طاقة حركة او بالقصور الذاتي

1/2

مسألة مروحة تصنع 300 دورة خلال 10s احسب

1- احسب التردد

2- الزمن الدوري

3- السرعة الزاوية



3/4

اختر الاجابة الصحيحة من بين الاجابات التالية

1- زمن حدوث الاهتزازة الكاملة يسمى :

- الزمن الدوري
- التردد
- سعة الاهتزازة
- الإزاحة

2- يمكن حساب قوة الإرجاع عند حركة البندول البسيط من العلاقة :

- $-mg \cos \theta$
- $-mg \sin \theta$
- $mg \cos \theta$
- $mg \cos \theta$

3- كتلة مقدارها Kg (3) في طرف نابض مرن حيث ($k = 200 \text{ N/m}$) عند إزاحة الكتلة عن موضع الاتزان لتتهتز يكون الزمن الدوري للحركة بوحدة بالثانية تقريبا :

- 0.5
- 0.77
- 1.2
- 2

علل ما يأتي تعليلا علميا دقيقا :

- تصلح حركة البندول او حركة دوران الأرض حول الشمس كأداة لقياس الزمن لأنها حركة تتكرر بانتظام خلال فترات زمنية متساوية

1/2

مسألة جسيم يتحرك حركة توافقية بسيطة معادلت حركته ($10 = 20 \sin 31.4t$) ،

حيث تقاس الأبعاد بوحدة (cm) والأزمنة بوحدة (s) والزاويا بوحدة (rad) احسب ما يلي :

1- احسب التردد

2- الزمن الدوري

3- السرعة الزاوية

3/4



نموذج 3

اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات التالية

- 1- يتحرك جسم حركة توافقية بسيطة ، تعطي إزاحته بالمعادلة ($Y = 20 \sin 5\pi t$) فإن سعة الاهتزازة تساوي:
- صفر 5 10 20
- 2- كتلة مقدارها Kg (0.2) معلقة في الطرف الحر لندول يتحرك حركة توافقية بسيطة ، فإذا استبدلت الكتلة السابقة بكتلة مقدارها Kg (0.8) فإن الزمن الدوري للندول:
- لا يتغير يزيد إلى أربعة أمثاله يقل إلى الربع يزيد إلى مثلي قيمته
- 3- يتناسب الزمن الدوري للندول البسيط طردياً في المكان الواحد مع :
- طول الخيط عجلة الجاذبية الجذر التربيعي لطول الخيط الكتلة

$\frac{3}{4}$

علك ما يأتي تعليلاً علمياً دقيقاً :

$\frac{1}{2}$


- حركة البندول البسيط حركة توافقية بسيطة في غياب أي احتكاك وعندما تكون زاوية إزاحته صغيرة .
لان قوة الإرجاع تتناسب طردياً مع الإزاحة الحادثة ولكن معاكسة لها في الاتجاه

مسألة بندول بسيط طول خيطه (1m) وكتلة كرة معلقته به (200 g) احسب

1- الزمن الدوري للندول

2- التردد

3- الزمن الدوري للندول عند وضعه على سطح القمر ($g = \frac{10}{6}$)



$\frac{3}{4}$

نموذج 4

اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات التالية

- 1- يتحرك جسم حركة توافقية بسيطة ، تعطي إزاحته بالمعادلة ($Y = 20 \sin 5\pi t$) فإن سرعته الزاوية تساوي:
- 5π 5 π 20
- 2- كتلة مقدارها Kg (0.2) معلقة في الطرف الحر لندول يتحرك حركة توافقية بسيطة ، فإذا استبدلت الكتلة السابقة بكتلة مقدارها Kg (0.8) فإن الزمن الدوري للندول:
- لا يتغير يزيد إلى أربعة أمثاله يقل إلى الربع يزيد إلى مثلي قيمته
- 3- نصف المسافة بين ابعدين نقطتين يصل اليها الجسم المهتز تسمى
- السرعة الزاوية التردد الزمن الدوري الإزاحة

$\frac{3}{4}$

علك ما يأتي تعليلاً علمياً دقيقاً :

$\frac{1}{2}$

- الزمن الدوري للندول البسيط لا يتوقف على كتلة الثقل المعلق فيه .
لان الكتلة المعلقة به صغيرة أو لأنه يتوقف على طول الخيط وعجلة الجاذبية في المكان فقط

مسألة نابض طوله (0.5 m) وكتلة كرة معلقته به (900 g) وثابت النابض ($K=100 \text{ N/m}$) احسب

4- الزمن الدوري للنابض

5- التردد

6- الزمن الدوري للنابض اذا تغير ثابت النابض الى ($K=400 \text{ N/m}$)



$\frac{3}{4}$

الموجه	1- انتقال الحركة الاهتزازية عبر جزيئات الوسط
حركة دوريه	2- الحركة الاهتزازية التي تكرر نفسها في فترات زمنية متساوية
حركه توافقيه	3- حركه اهتزازيه تتناسب فيها القوة المعيده (الارجاع) طرديا مع الإزاحة الحادثه للجسم وتكون دائما في اتجاه معاكس لها
السعه	4- نصف المسافة بين ابعده نقطتين يصل اليها الجسم المهتز
	5- اكبر ازاحه للجسم عن موضع سكونه (اتزانه)
التردد	6- عدد الاهتزازات الكاملة الحادثه في الثانية الواحدة
الزمن الدوري	7- زمن دوره كامله
سرعه زاويه	8- مقدار الزاوية التي يسمحها نصف القطر في الثانية





علل

1- ليست كل حركة اهتزازية حركة توافقيه بسيطة لان الحركة التوافقية تكون فيها قوة الارجاع متناسبة طرديا مع الازاحة وتعاكسها في الاتجاه

2- يختلف الزمن الدوري للبندول البسيط باختلاف المكان علي سطح الأرض .

3- الزمن الدوري للبندول البسيط علي سطح القمر أكبر من الزمن الدوري لنفس البندول علي سطح الأرض

لان الزمن الدور للبندول يتناسب عكسيا مع الجذ التربيعي للجاذبية $T \propto \frac{1}{\sqrt{g}}$

البندول	النايظ	
		الرسم
$T = 2\pi \sqrt{\frac{L}{g}}$	$T = 2\pi \sqrt{\frac{m}{k}}$	القانون
1- طول الخيط 2- عجلة الجاذبية	1- الكتلة 2- ثابت النايظ	العوامل التي يتوقف عليها
$F = -mg \sin \theta$	$F = -KX$	القوة المؤثرة (الارجاع)
		العلاقة البيانية
		العلاقة مع الطول
		العلاقة مع الكتلة

بندول يصنع 20 دورة خلال دقيقة احسب

التردد

الزمن الدوري

السرعة الزاوية

اطار سيارة يتحرك بسرعة زاوية 20 rad/s احسب

التردد

الزمن الدوري

محرك طائرة يدور بزمن دوري 0.5 s احسب

التردد

السرعة الزاوية