

# الدورة الحدودية




الفصل الدراسي الأول

## الصفحة الأولى بعد كل



**الفصل الأول: التغذية والنقل والنمو في النباتات**
**الدرس ١- تركيب النبات**
**النقطة الرئيسية للدرس**
**٣) الأزهار والبذور والثمار**
**٢) السوق والجذور النباتية**
**١) الأوراق النباتية  
أولاً: الأوراق النباتية**

تعزيز الاختلافات بين معظم النباتات إلى التنوع في بعض التراكيب الأساسية (الأوراق - السوق - الجذور - الأزهار والبذور) وتمكن هذه التراكيب النبات من أن يعيش ويتكاثر في البيئات المختلفة



**تركيب التغور**  
يتربّك التغور من خليتان حارستان تتوسطهما فتحة ثغريّة

**آلية غلق التغور**  
عندما يكون الماء في النبات نادراً يخرج من الخليتين الحارستين فينخفض ضغط الامتناء فتنتكمش الخليتان وتصبح فتحة التغور أضيق أو تغلق قليلاً

**الخلية الحراسة**: خلية متخصصة تحتوي على البلاستيدات الخضراء وتؤدي دوراً في ضبط فتح التغور وإنغلاقها

**آلية فتح وغلق التغور**:

**آلية فتح التغور**  
عندما يدخل الماء إلى الخليتين الحارستين تنتفخان ويزداد ضغط الامتناء فيتم دفع الجدر الخارجي الرقيقة للخلايا الحراسة ويسبب ذلك شد الجدر الداخلي بعيداً واحدة عن الأخرى



### أسئلة على الأوراق النباتية

**سـ. أكتب الاسم أو المصطلح العلمي الذي تدل عليه كل عباره من العبارات التالية**

١. الجزء الأكبر من الأوراق النباتية مفلطح وعریض يحتوي على الخلايا التي تقوم بعملية البناء الضوئي. (.....)
٢. تراكيب أنبوبية الشكل ينتقل خلالها الماء والعناصر المعدنية والسكريات إلى جميع أنحاء نصل الورقة. (.....)
٣. طبقة من الشمع تغلف السطح العلوي لخلايا البشرة في أوراق النبات لمنع تسرب الماء لخارج الورقة. (.....)

**سـ. علل لا يلي تعليلا علميا مناسبا.**

١- أوراق نبات الصنوبر والنباتات المخروطية توجد في شكل إبرى

حتى تساعدها على التخلص من الثلوج

٢- تحتوي انصال الأوراق النباتية على ثقوب صغيرة

كي تسمح بخروج بخار الماء إلى الهواء وتبادل غاز ثاني أكسيد الكربون والأكسجين مع الهواء

٣- أوراق نباتات نخيل جوز الهند ريشية مركبة

لأنها تشبه ريش الطيور ولها عروق متفرعة من العرق المركزي الرئيسي الذي يسمى العرق الأوسط

٤- أوراق نبات الفراولة مركبة راحية

لأنها تشبه راحة اليد وأصابعها وهي ذات وريقات عديدة تشع جميعها من نقطة مركبة

٥- تغلف السطح العلوي لأوراق معظم النباتات طبقة من الشمع تسمى الكيوتيكل

لأنها تؤدي مع طبقة البشرة دورا في منع تسرب الماء إلى خارج الورقة.

٦- تعتبر الأوراق في النبات المواقع الأساسية لعملية البناء الضوئي

لأن تركيب الورقة هو الأمثل لامتصاص الضوء وتنفيذ عملية البناء الضوئي حيث يتضمن أنظمة فرعية تحتوي على أنسجة

مسؤولة عن تبادل الغازات وأخرى عن نقل الماء والأملاح المعدنية إلى الخلايا حيث تحدث عملية البناء الضوئي.

**سـ. قارن بين كلا مما يأتيـ.**

نبات الصنوبر	نبات الجميز	وجه المقارنة
		شكل نصل الورقة
عنق الورقة	العروق	وجه المقارنة
		الوظيفة
النباتات ثنائية الفلقة	النباتات أحادية الفلقة	وجه المقارنة
		ترتيب العروق في الورقة
النسيج الوسطي الإسفنجي	النسيج الوسطي العمادي	وجه المقارنة
		شكل الخلايا



## س - ما أهمية كل من:-

١. الثغور الموجودة بنصل الأوراق النباتية

٢. النسيج الوسطي في الورقة

٣. الخلايا الحارسة

### السوق النباتية

#### أهمية السوق للنبات

- (١) حمل الأوراق والأزهار والثمار (٢) توصيل الماء والأملاح عبر أوعية الخشب إلى جميع أجزاء النبات
- (٣) توصيل الغذاء الجاهز عبر أنسجة اللحاء إلى جميع أجزاء النبات (٤) تخزين المواد الغذائية الزائدة في بعض النباتات

#### تركيب السوق

يتكون من ثلاثة أنواع من الأنسجة هي:

١. البشرة، طبقة من الخلايا ذات الجدران سميك وتختلف بطبقة شمعية
٢. الأنسجة الأساسية،

القشرة، طبقات من الخلايا البرانشيمية تحيط بحلقة العزم الوعائية وتمتد إلى البشرة  
النخاع، مجموعة الخلايا البرانشيمية الموجودة في مركز السوق

#### أنسجة وعائية،

في النباتات الزهرية تحتوي على أوعية خشبية وقببيات في النباتات المخروطية.

وتحتوي على قصبيات فقط.

لاحظ بالشكل تتواجد العزم الوعائية بشكل مبعثر بين خلايا الأنسجة الأساسية

لاحظ بالشكل تتوزع العزم الوعائية بشكل دائري منظم لتشكل حلقة حول النخاع

### ثانياً، السوق والجذور النباتية

ألف سклرشنمية

اللحاء


العنبر

السرير

حرمة وعائية

السوق الأساسي

(حلايا برانشيمية)



(ا) ساق نباتية أحادية الفلقة

ألف سклرشنمية

اللحاء

العنبر


السرير

حرمة وعائية

النخاع (حلايا برانشيمية)

القشرة

(ب) ساق نباتية ثنائية الفلقة



#### تصنيف النباتات بناءً على نوع السوق وحجمها وشكلها

أشجار  
سوق خشبية

نباتات متسلقة  
سوق خشبية

نباتات شجيرية  
سوق خشبية

نباتات عشبية  
سوق غير خشبية


العقد، مواضع اتصال الأوراق بالسوق

العقل، قطع السوق الواقع بين كل عقدتين متجاورتين  
البراعم، تراكيب يبدأ فيها النمو في معظم السوق وتظهر في  
أنماط منتظمة بين الورقة والعقدة ويعتبر نمط نمو البراعم  
كيفاً يتيح لأوراق النبات أكبر قدر من التعرض للضوء

#### أنواع مختلفة من السوق التي تكيفت لتخزين الغذاء



بصلة أمارلس



كورمة الدليلوث



درنة البطاطا



رايزوم الزنجبيل



## الجذور النباتية

### أهمية الجذر للنبات

- (١) امتصاص الماء والعناصر المعدنية من التربة
- (٢) تثبيت النبات في التربة (٣) البعض يخزن الغذاء الفائض عن حاجة النبات.

### أنواع الجذور وأشكالها

#### الجذر الوتدي


جذر مركزي كبير الحجم يحمل الكثير كتلة من التركيب الخطيطية الرفيعة من الجذور تنمو عميقاً داخل التربة لامتصاص الماء والعناصر المعدنية من الطبقة السطحية وفي مساحة لامتصاص المياه الجوفية. في نباتات القول والملوخيّة يثبت النبات كبيرة تلتف حول حبيبات التربة بقوّة في التربة ويخزن كميات كبيرة فتُمْنَع تأكُل الطبقة السطحية من الغذاء كما في نباتات الجزر والبنجر للتربة أوضاع مثل العشاش

#### تركيب الجذر

يتكون من ثلاثة أنواع من الأنسجة هي :


- (١) البشرة (النسيج الملحي).
- (٢) الأنسجة الأساسية (٢) الأنسجة الرعائية

النسيج الوعائي في جذور النباتات أحادية الفلقة يكون حلقة تحيط بمساحة مركبة من الأنسجة الأساسية تسمى النخاع



(أ) مقطع عرضي من جذر نبتة ثنائية الفلقة

النسيج الوعائي في جذور النباتات ثنائية الفلقة يكون قلب مصمّم في مركز الجذر له أذرع هي عبارة عن الخشب ويتوزع اللحاء بينها



(ب) مقطع عرضي من جذر نبتة ثنائية الفلقة

### أسئلة على السوق والجذور النباتية

**س - أكتب الاسم أو المصطلح العلمي الذي تدل عليه كل عباره من العبارات التالية**

١. طبقة من الأنسجة الإنسانية توجد بين نسيجي الخشب واللحاء في السوق النباتية. (.....)
٢. مجموعة من الخلايا البرانشيمية موجودة في مركز الساق لنبات ثنائي الفلقة. (.....)
٣. الجزء من النبتة الذي ينمو تحت سطح التربة. (.....)
٤. طبقة إسفنجية من النسيج الأساسي تمتد مباشرة إلى الداخل من البشرة إلى الاندوديرم. (.....)

**س - علل لما يلي تعليلا علميا مناسبا.**

- ١- تقوم بعض النباتات مثل الجزر والبنجر بتخزين كميات كبيرة من الغذاء في جذورها الوتدية

لكي تستخدمها لإنتاج الأزهار والثمار

- ٢- تحدث معظم عملية الامتصاص عند أطراف الجذر في منطقة التمايز

لأن خلايا البشرة تمايزت إلى شعيرات جذرية ماصة






٣- يعتبر نمو البرعم تكيف للنبات

لأنه يتيح لأوراق النبات أكبر قدر من التعرض للضوء

**س- قارن بين كلا مما يأتي:** -

النباتات ثنائية الفلقة	النباتات أحادية الفلقة	وجه المقارنة
		ترتيب الحزم الوعائية في الساق
		ترتيب النسيج الوعائي في الجذر
ساق نبات النعناع	ساق نبات دوار الشمس	وجه المقارنة
		نمط نمو البرعم
السوق	الجذور	وجه المقارنة
حزم وعائية - اللحاء جهة الخارج والخشب جهة الداخل بينهما نسيج الكامبيوم	أسطوانة مرکزية - ويكون اللحاء مستقل عن الخشب لكنهما يتوزعان بنمط تبادلي	ترتيب الأنسجة الوعائية

**س- أدرس الأشكال التالية ثم أجب عن الأسئلة**



١- الشكل التالي يوضح قطاع طولي في الجذر والمطلوب كتابة البيانات على الرسم

- ..... ١
- ..... ٢
- ..... ٣
- ..... ٤
- ..... ٥
- ..... ٦
- ..... ٧

### الزهرة

عضو التكاثر الجنسي في النبات الزهرى وظيفتها الأساسية إنتاج الأمشاج كما أنها تشكل التركيب الذي تتم فيه عملية الإخصاب

### التلقيح

عملية انتقال حبوب اللقاح من الأجزاء المذكورة إلى الأجزاء المؤنثة في الزهرة

تنقل حبوب اللقاح بواسطة الرياح - الماء - الحشرات

### البذرة

عبارة عن تركيب تكاثري يتكون من جنين النبتة وغذائها المدخر **الثمرة** تركيب يحيط بالبذرة وتغطيها وتساعد في انتشارها لمواطن جديدة

**علل - للنباتات العديد من الطرق لتناثر بذورها**  
يسبب ذلك انتشار النباتات الجديدة الناتجة عن التكاثر مما يزيد من فرص حفظ الأنواع النباتية وعدم انقراضها

### ثالثاً، الأزهار والبذور والثمار

**علل- صعوبة التكاثر الجنسي في النبات**  
لأن النباتات عادة تعيش حياتها بالكامل في مكان واحد من دون أن تنتقل



الوحدة الأولى: علم النبات - الفصل الأول: التغذية والنقل والنمو في النباتات

## الدرس [٢] التغذية في النباتات

## **النقطة الرئيسية للدرس**

- أولاً، الطاقة المستمدّة من ضوء الشمس والبلاستيدات الخضراء**

١) الطاقة المستمدّة من ضوء الشمس والبلاستيدات الخضراء

٢) آلية البناء الضوئي

٣) مصير السكريات الناتجة عن البناء الضوئي

٤) العوامل المؤثرة في عملية البناء الضوئي

**الكائنات الحية تحصل على الطاقة الكيميائية المخزنة في الغذاء والتي مصدرها عملية البناء الضوئي**

**البناء الضوئي:** العملية التي تستخدم فيها الكائنات ذاتية التغذية طاقة ضوء الشمس ومواد غير عضوية بسيطة مثل الماء وثاني أكسيد الكربون لبناء الكربوهيدرات وتحرر الأكسجين

**البناء الضوئي** : القاعدة الأساسية للحياة حيث يتم بواسطتها إنتاج الغذاء وتحrir الأكسجين


**البناء الضوئي** : تحدث في الكائنات ذاتية التغذية مثل النباتات الخضراء والطحالب وحية الخلية وبعض الأنواع من الطلائعيات

**البناء الضوئي في النباتات الخضراء** : تحدث في البلاستيدات الخضراء التي توجد بكميات كبيرة في الأوراق النباتية .



تركيب البلاستيدات الخضراء

- (١) غشاء مزدوج



(٢) مادة جيلاتينية عديمة اللون تسمى السترووما

(٣) تراكيب متراصة بعضها فوق بعض تسمى الجرانا المجموعة الواحدة تسمى الجرانم والقرص الواحد في المبسوطة يسمى الثيلاكويد

(١) يصل عددها في المجموعة إلى ١٥ قرصاً أكثر  
(٢) مجوف من الداخل ويسمى الفراغ  
الموجود فيه بتجويف الثيلاكويド

(٣) يحتوي التجويف على جميع الأصياغ  
النباتية اللازمة لعملية البناء الضوئي

(٤) أهم الأصابع الموجودة صبغ الكلوروفيل وهناك نوعين منه كلود وفيلا، (أ) وكلود وفيلا، (ب)


(٥) لا تمتلك أصباغ الكلوروفيل الضوء الأخضر بل تعكسه لذا تبدو معظم النباتات خضراء اللون

(٦) تحتوي الثيلاكويديات على الأنظمة الضوئية مع الكلوروفيل

٧) الأنظمة الضوئية هي وحدات  
جامعة للضوء توحد على غشاء

لثيالكويد ويوجد منها النظام الضوئي (١) والنظام النورسي (٢).

**النظام الضوئي (2)**



## ثانياً، آلية البناء الضوئي

المعادلة العامة لعملية البناء الضوئي




تحدث عملية البناء الضوئي على مراحلتين :

- (١) المرحلة الأولى : تعرف بالتفاعلات المعتمدة على الضوء
  - (٢) المرحلة الثانية : تعرف بالتفاعلات غير المعتمدة على الضوء أو التفاعلات اللاضوئية أو دورة كالفن
- تحدث كل مرحلة في موقع مختلف داخل البلاستيد الخضراء -

### المرحلة الأولى، التفاعلات المعتمدة على الضوء

- (١) تعتمد تفاعلات هذه المرحلة على الضوء الذي تمتصه جزيئات الكلوروفيل في الجرana
- (٢) تحدث هذه المرحلة على مناطق متنوعة من غشاء الثيلاكويد
- (٣) يتكون خلال هذه المرحلة غاز الأكسجين كناتج نهائي ومركبان كيميائيان كمركيبات وسطية وهي ATP , NADPH
- (٤) خطوات التفاعلات الضوئية
  - ١) تمتص الكلوروفيل أو الأصباغ الأخرى في النظام الضوئي (٢) طاقة الضوء وتنقلها إلى الإلكترونات .
  - ٢) تقوم إنزيمات النظام الضوئي (٢) بشرط جزيئات الماء إلى إلكترونات عالية الطاقة وأيونات هيدروجين ( $\text{H}^+$ ) وغاز الأكسجين ( $\text{O}_2$ ).
  - ٣) تنتقل الإلكترونات عالية الطاقة عبر سلسلة نقل الإلكترون إلى النظام الضوئي (١)
  - ٤) تستخدم الجزيئات في سلسلة نقل الإلكترون الطاقة لكي تنقل أيونات الهيدروجين ( $\text{H}^+$ ) من الستروما إلى داخل الثيلاكويد .
  - ٥) تمتص الكلوروفيل أو الأصباغ الأخرى في النظام الضوئي (١) طاقة الضوء وتنقلها إلى الإلكترونات المحررة من النظام الضوئي (٢) ثم تلتقط بواسطة  $\text{NADP}^+$  ليتكون مركب ATP
  - ٦) عند مرور أيونات الهيدروجين ( $\text{H}^+$ ) خلال بروتين الغشاء المعروف بإنزيم تصنيع ATP يربط جزيئات ADP مع مجموعات فوسفات لتكون جزيئات ATP





## **الوحدة الأولى: علم النبات**

### **الفصل الأول: التغذية والنقل والنمو في النباتات**



### **أسئلة على تركيب البلاستيدات وأالية البناء الضوئي**

### **س - أكتب الاسم أو المصطلح العلمي الذي تدل عليه كل عباره من العبارات التالية**

١. العملية التي تستخدم فيها الكائنات ذاتية التغذية طاقة ضوء الشمس لبناء الكربوهيدرات من المواد غير العضوية البسيطة. ....
٢. سلسلة من التفاعلات تحدث داخل البلاستيدات الخضراء تستخدم الطاقة من الشمس لتحويل الماء وثاني أكسيد الكربون إلى السكريات والأكسجين. ....
٣. عضيات خلوية توجد بكميات كبيرة في خلايا الأوراق النباتية تخصصت في القيام بعملية البناء الضوئي. ....
٤. مادة جيلاتينية عديمة اللون تقع بين الجرانا داخل البلاستيد الخضراء وتحتوي على حبيبات من النشا و قطرات دهنية. ....
٥. تركيب قرصية الشكل متراصبة بعضها فوق بعض يعرف القرص الواحد منها باسم الثيلاكويد. ....
٦. قرص مجوف من الداخل يحتوي تجويفه على صبغة الكلوروفيل وجميع الأصباغ اللازمة لعملية البناء الضوئي. ....
٧. الصبغة الأساسية لعملية البناء الضوئي في جميع النباتات. ....
٨. عملة الطاقة للخلية الحية. ....
٩. سلسلة من التفاعلات الكيميائية تحدث في مناطق متنوعة من غشاء الثيلاكويد تعتمد في حدوثها على الضوء. ....
١٠. مجموعة من المركبات الوسطية الموجودة في غشاء الثيلاكويد. ....
١١. سلسلة من التفاعلات الكيميائية تحدث في ستروما البلاستيد خارج الجرانا لا تعتمد في حدوثها على الضوء. ....

### **س - علل لما يلي تعليلا علميا مناسبا.**

١- تعتبر عملية البناء الضوئي القاعدة الأساسية للحياة

حيث يتم بواسطتها إنتاج الغذاء وتحرير الأكسجين اللازم لتنفس جميع الكائنات الحية

٢- تمتد حافات الثيلاكويد خارج حدود الجرانا

لكي تزيد من مساحة سطح الأقراص المعرضة للضوء

٣- معظم النباتات تبدو خضراء اللون

لأن أصباغ الكلوروفيل تمتلك الأطوال الموجية البنفسجية والزرقاء والحرماء من الطيف المرئي وتعكس الضوء الأخضر

٤- تدرج تركيز أيونات الهيدروجين على جانبي غشاء الثيلاكويد له دور في عملية إنتاج مركب ATP

عند مرور أيونات الهيدروجين من خلال إنزيم تصنيع ATP يربط جزيئات ADP مع مجموعات فوسفات مستخدما الطاقة

المتعلقة من تدفق أيونات الهيدروجين فتشكلن جزيئات ATP

٥- تحول الكائنات ذاتية التغذية وغير ذاتية التغذية الجلوكوز إلى ATP

لأنها تحتاج إلى الطاقة للقيام بوظائفها الحيوية مثل النمو والتكاثر .

### **س- قارن بين كلا مما يأتي:-**


التفاعلات اللاضوئية	التفاعلات الضوئية	وجه المقارنة
		سبب التسمية
		مكان الحدوث
		المواد التي تحتاج إليها
		النواتج النهائية





الجرانا	الستروما	وجه المقارنة
		التفاعلات التي تحدث بها
		التركيب


### ثالثاً : مصير السكريات الناتجة عن البناء الضوئي :



### رابعاً : العوامل المؤثرة في عملية البناء الضوئي :

- (١) الضوء
- (٢) الماء
- (٣) ثاني أكسيد الكربون
- (٤) وجود الكلوروفيل

البناء الضوئي





## الوحدة الأولى: علم النبات



العوامل التي تعتمد عليها الكمية الصافية من السكر المتكونة بواسطة النباتات

(٢) كمية الضوء المتاحة

(١) معدل التنفس الخلوي

(لا توجد طاقة مكتسبة أو مفقودة)

- إذا كانت كمية السكر المتكونة متوازنة مع كمية السكر المستهلكة

(توجد طاقة مكتسبة أي طاقة زائدة عن حاجتها)

- إذا كانت كمية السكر المتكونة أكبر من كمية السكر المستهلكة

(توجد طاقة مفقودة)

- إذا كانت كمية السكر المتكونة أقل من كمية السكر المستهلكة

**نقطة التعويض:** كمية الطاقة الضوئية المقتنعة أثناء عملية البناء الضوئي اللازمة لبقاء النباتات على قيد الحياة.

ما زلت أعلم للنبات إذا استقبلت كمية من ضوء الشمس أقل من نقطة التعويض الخاصة به لفترة طويلة؟

لن تزهر النبتة وستكاثر قليلاً أو لن تتکاثر إطلاقاً وقد تموت

تختلف النباتات في الوصول إلى نقطة التعويض

(٢) الماء

### أهمية توافر الماء في عملية البناء الضوئي

- الماء مادة خام لتفاعلات الضوئية

- امتلاء الخلايا الحارسة بالماء تبقي تغور الورقة مفتوحة مما تسمح بدخول  $\text{CO}_2$

**تجربة العالم فان هلمونت لتوسيع دور الماء في عملية البناء الضوئي والنقد التي حصلت عليه**

- زرع نبتة وزنتها ٢ كجم في تربة وزنتها ٩٠ كجم - قام بريوي النبتة بماء المطر لمدة خمس سنوات

- وزن النبات في السنة الخامسة فوجد وزنتها زاد ٧٥ كجم في حين وزن التربة لم ينقص سوي ٥٥ جم فقط

- استنتج فان هلمونت أن نمو الشجرة يرجع غالباً إلى الماء الذي أضيف للتربة

**نقد النظرية:** العالم أهمل وتجاهل عوامل أخرى أسهمت في نمو النبات

(٣) ثانٍ أكسيد الكربون

العامل الثالث ويستخدم لصنع السكريات البسيطة أثناء دورة كالفن

**تجربة جان سينيرو والتي تبين أهمية غاز ثاني أكسيد الكربون في**

**عملية البناء الضوئي**

**أسئلة على مصير السكريات  
والعوامل المؤثرة في البناء الضوئي**

**س - أكتب الاسم أو المصطلح العلمي الذي تدل عليه كل عباره من العبارات التالية**

١. كمية الطاقة الضوئية المقتنعة أثناء عملية البناء الضوئي اللازمة لبقاء النباتات على قيد الحياة. (.....)

٢. تكسير الجزيئات مثل الجلوكوز إلى جزيئات أبسط مثل  $\text{CO}_2$  والماء بالإضافة إلى انطلاق الطاقة. (.....)

**س - علل لما يلي تعليلاً علمياً مناسباً.**

١- تلقب بعض نباتات الحدائق بنباتات الظل

لأنها تحتاج إلى كمية معتدلة فقط من ضوء الشمس لتصل إلى نقطة التعويض .

**س- قارن بين كلاماً ي يأتي:-**

وجه المقارنة	السياليلوز	النشا
الأهمية للنباتات		
التركيب		



**١٢- النقل إلى الأعلى في الخشب**
**٣- انتقال العصارة الناضجة في اللحاء**
**١١- النقل في الجذور**
**أولاً: النقل في الجذور:**
**ضغط الامتلاء**

الضغط الناتج عن الضغط الأسموزي لغشاء الخلية على جدرها عندما تكون الفجوات العصارية المركبة في الخلايا النباتية ممتلئة بالماء

**متطلبات الأسموزية:**

(١) تدرج في تركيز الماء      (٢) غشاء شبه منفذ

تكيفت الجذور لتوفير الشروط الازمة لانتقال الماء من التربة إلى داخل الجذور وصولاً إلى الأنسجة الوعائية

ما زالت في حالة فقد الجذور للتكييف السابق وذلك عند زيادة المعادن في التربة إلى درجة يعجز معها الجذر

**حرق الجذور:** خروج الماء من الجذور للتربة نتيجة زيادة المعادن في التربة ويؤدي ذلك إلى موت النبات

**(٢) امتصاص الماء والمعادن الذائبة في الماء**

**الجذور في النبات تقوم بـ**


(١) تثبيت النباتات في التربة      (٢) امتصاص الماء والمعادن الذائبة في الماء

**الجذور والنقل النشط للمعادن**


**متطلبات النقل النشط للمعادن** (١) تأمين غاز الأكسجين لخلايا الجذور بكمية كافية (٢) تأمين السكريات وذلك لحدوث التنفس الخلوي وتوفير الطاقة لهذه الخلايا

**أهمية النقل النشط للمعادن:** يجعل البيئة داخل جذور النبتة ذات تركيز عال لأيونات المعادن أي جهد مائي منخفض والبيئة

الخارجية (التربة) ذات تركيز أقل لأيونات المعادن أي جهد مائي عال عندئذ ينتقل الماء إلى الجذور الأسموزية


**مراحل الماء والأملاح من نسيج البشرة إلى الأسطوانة الوعائية**

**المر خارج الماء عبر الماء الخلوي**  
الخلوي الفشائي الجماعي


**المر خارج خلوي**

الانتقال عبر الجذور ولا  
تعتمد على الأسموزية

**المر الخلوي الجماعي**

الانتقال عبر الروابط  
البلازمية

**المر عبر الفشائي**

الانتقال عبر الجذور والأغشية  
ويعتمد على الأسموزية

شريط شمعي غير منفذ للماء - يغلف جدر خلايا البشرة الداخلية - يمنع مرور الماء عبر المر خارج خلوي



### الضغط الجذري:

يؤدي النقل النشط والأسموزية دوراً في انتقال الماء والأملاح المعدنية باتجاه واحد من البشرة وصولاً إلى أوعية الخشب بالجذر  
انتقال الماء ينتج ضغط يسمح بدفع الماء باتجاه الخشب ثم صعوداً خلال الخشب ويعرف هذا الضغط بالضغط الجذري

**العلاقة التكافلية مع جذور بعض  
النباتات وفطريات خاصة**

**أهمية الضغط الجذري :** يعتبر نقطة الانطلاق لتحرك الماء داخل الجهاز الوعائي

### أسئلة على النقل في الجذور

#### س. أكتب الاسم أو المصطلح العلمي الذي تدل عليه كل عباره من العبارات التالية

١. الضغط الذي يعطي دعامة للخلية الناتجة عن الضغط الأسموزي لغشاء الخلية على جدارها. (.....)
٢. انتقال الماء خلال الأغشية الشبه منفذة من محيط ذي تركيز مائي عالٍ إلى محيط ذي تركيز مائي منخفض. (.....)
٣. خروج الماء من الجذور إلى التربة في حال وجود كميات كبيرة من المعادن في التربة. (.....)
٤. توجد على غشاء خلية الشعيرات الجذرية الماصة تضخ شوارد المعادن بواسطة النقل النشط من التربة إلى داخل الجذور (.....)
٥. انتقال الماء عبر الجدر الخلوي من القشرة وصولاً إلى البشرة الداخلية. (.....)
٦. انتقال الماء والأملاح من خلية إلى خلية المجاورة عبر الروابط البلازمية. (.....)
٧. انتقال الماء والأملاح الذائبة من خلية إلى أخرى عبر الجدر الخلوي والأغشية. (.....)
٨. طبقة من الخلايا ذات شكل قرميدي يغلف الأسطوانة الوعائية في جذور النبات. (.....)
٩. شريط شمعي يغلف جدر خلايا البشرة الداخلية الأربعية الجانبية يمنع مرور الماء عبر المرتاج خلوي (.....)
١٠. الضغط الذي يعتبر نقطة الانطلاق لتحرك الماء داخل الجهاز الوعائي في النبات. (.....)

#### س. اختار الإجابة الصحيحة والمناسبة من بين الإجابات المليّة تلي كل عباره من العبارات التالية..

١. الضغط الذي يعطي دعامة للخلية :

- |  |                          |                     |
|--|--------------------------|---------------------|
| ( ) الضغط الجذري   | ( ) ضغط الامتناء         | ( ) الشد النتحي     |
| ٢. الماء المائي داخل طبقات الجذر المختلفة الذي لا يعتمد على الأسموزية :      | ( ) الخاصية الشعرية      |                     |
| ( ) المرتاج خلوي   | ( ) المرتاج خلوي الجماعي | ( ) المرتاج الغشائي |
| ٤. الضغط الذي يعتبر نقطة الانطلاق لتحرك الماء داخل الجهاز الوعائي في النبات. | ( ) لا توجد إجابة صحيحة  |                     |
| ( ) الضغط الجذري   | ( ) الشد النتحي          | ( ) ضغط الامتناء    |

#### س. ضع علامة ✓ أمام العبارة الصحيحة وعلامة ✗ أمام العبارة غير الصحيحة فيما يلي :

- (١) يدخل الماء إلى النبات مباشرةً من التربة إلى الجذور.
- (٢) في معظم الأحيان يكون تركيز شوارد المعادن في التربة أكبر من تركيز شوارد المعادن داخل خلايا الجذور.
- (٣) تعتمد كمية الماء الممتصة من التربة بواسطة الأسموزية على كمية الماء في التربة.

#### س. ما أهمية كل من:

١. ضغط الامتناء للخلية

٢. البروتينات الناقلة النشطة الموجودة بغشاء خلية الشعيرات الجذرية الماصة

٣. شريط كاسبير الذي يغلف جدر خلايا البشرة الداخلية الأربعية الجانبية







## نظريّة الشد والتّماسُك

النظرية المسؤولة عن تشكيل عمود الماء ويعتمد عليها في تفسير الخاصية الشعرية وتنطلق من

الخواص المميزة للماء

ومن أهم هذه الخواص: (١) التّماسُك بين جزيئات الماء (٢) التلاصق بين جزيئات الماء وجدار الأنبوة (وعاء خشبي)  
**الخاصية الشعرية:** هي صعود الماء في الأنابيب الضيقه بعكس الجاذبية نتيجة قدرة جزيئات الماء على الالتصاق بعضها ببعض وبجدر أنبوب ما

لَا تكفي الخاصية الشعرية لتفسير كيفية انتقال الماء من التربة إلى الأجزاء العالية في النبات  
**صعود الماء إلى أعلى في النبات يخضع لـ:**

(١) قوى دفع من أسفل (يشكلها الضغط الجذري)

(٢) قوى الجذب والشد من أعلى وتعتبر القوى الأساسية (يشكلها قوة الشد النتجي)

قوة جهد الماء الناتجة عن عمليتي التبخر والتنح من خلال ثغور الورقة والتي تشد الماء صعوداً خلال

الخشب في حالة وجود عمود مائي في وعاء الخشب

## الشد النتحي

**س: كيف يمكن تفسير إغلاق الثغور وضبطها باستخدام مفهوم جهد الماء؟**

١. وجود الانحدار في جهد الماء بين الخلايا الحارسة والخلايا المحيطة يحفز عملية إقفال الثغور وفتحها.

٢. ينبع الانحدار في جهد الماء عن آلية نقل أملاح البوتاسيوم

٣. الضوء يحفز النشاط لأملاح البوتاسيوم عبر قنوات خاصة في غشاء الخلايا الحارسة.

٤. تراكم أملاح البوتاسيوم في فجوات الخلايا الحارسة مما يؤدي إلى انخفاض جهد الماء فيها نسباً إلى جهد الماء في الخلايا المحيطة

٥. يتحرك الماء بحسب جهد الماء من الخلايا المحيطة إلى الخلايا الحارسة مما يؤدي إلى انتفاخ الخلايا الحارسة وفتح الثغور.

٦. خلال الليل وأثناء غياب الضوء يحدث العكس وتغلق الثغور.

؟  
؟  
**أسئلة على النقل إلى أعلى في الخشب**

**س: أكتب الاسم أو المصطلح العلمي الذي تدل عليه كل عباره من العبارات التالية**

١. النظرية المسؤولة عن تشكيل عمود الماء المتواصل داخل الأوعية الخشبية معتمدة على الخواص المميزة للماء.....

٢. القوة التي تفسر صعود الماء خلال الخشب من الجذور وحتى التربة نتيجة تحرك الماء خارج الأوراق من خلال الثغور خلال عملية التبخر والتنح.

**س: علل ما يلي تعليلاً علمياً مناسباً.**

١- استمرارية وجود عمود الماء داخل الأوعية الخشبية دون انقطاع

نظراً للخواص الماء المميزة وأهمها التّماسُك بين جزيئات الماء بعضها البعض وتلاصق جزيئات الماء مع الجدر الداخلية للأوعية الخشبية

٢- الخاصية الشعرية غير كافية لانتقال الماء صعوداً داخل النبات

لأن الفعل الشعري لا يؤمن القوة الكافية لدفع الماء صعوداً إلى أعلى الشجر المرتفع

**س: عدد لكل ما يلي:-**

١. الخواص المميزة للماء التي يعتمد عليها تشكيل عمود الماء المتواصل في الأوعية الخشبية في النبات

.....  
.....



# الوحدة الأولى: علم النبات

## الفصل الأول: التغذية والنقل والنمو في النباتات

**س. ماذا تتوقع أن يحدث مع التعليل**

٢. تحرك الماء خارج الأوراق من خلال التغور خلال عملية التبخر والفتح

يعمل ذلك على شد الماء صعوداً خلال الخشب من الجذور وحتى من التربة

٣. عندما تكون الظروف البيئية المحيطة بالنبات صعبة (حارة وجافة وتكون سرعة الرياح قوية)

يزداد معدل النتح وتزداد خسارة النبتة للماء وفي هذه الحالة تقفل النبتة ثغورها لكي لا تذبل وتموت


### ثالثاً، انتقال العصارة الناضجة في اللحاء

- تتحرك العصارة الناضجة في اللحاء صعوداً أو هبوطاً على حد سواء من مكان الصنع إلى المناطق النشطة أو أماكن التخزين

- السكر الناتج من عملية البناء الضوئي يتحول إلى سكر السكريوز قبل أن يتم تحميشه في اللحاء ونقله

- أفضل الفرضيات التي فسرت انتقال السكريات هي فرضية التدفق بالضغط

- خطوات فرضية التدفق بالضغط التي تفسر انتقال العصارة الناضجة في اللحاء



- تضخ خلايا المنبع السكريات بالنقل النشط من المنبع إلى الأنابيب الغربالية فيصبح تركيز السكر في اللحاء مرتفع.

- التركيز العالي للسكر يسبب دخول الماء إلى خلايا الأنابيب الغربالية بالأسموزية

- يتحرك كل من الماء والسكريات بحسب منحدر التركيز خلال اللحاء

- وفي النهاية تنتقل السكريات من الأنابيب الغربالية إلى خلايا المصرف بالنقل النشط ويترك الماء الأنابيب الغربالية إلى الخشب بالأسموزية.

### أسئلة على انتقال العصارة الناضجة في اللحاء

#### س. أكتب الاسم أو المصطلح العلمي الذي تدل عليه كل عباره من العبارات التالية

١. الشكل السائد للسكر الذي يتم تحميشه في اللحاء ونقله إلى أجزاء النبتة. (.....)

٢. أي جزء في النبتة تنتج السكريات عن طريق عملية البناء الضوئي أو عملية تكسير لجزيئات النشا. (.....)

٣. أي جزء في النبتة تستهلك السكريات أو يتم تخزينها. (.....)

#### س. علل مما يلي تعليلاً علمياً مناسباً.

١- من اللازم أن تكون خلايا الأنابيب الغربالية حية لكي تؤدي وظيفتها


لأن الخلايا الحية فقط يمكنها أن توفر الطاقة اللازمة لعملية النقل النشط

#### س. قارن بين كلا مما يأتي ..

المصرف	الممنع	وجه المقارنة
		المفهوم
		مثال



### النقطة الرئيسية للدرس



### ٢ تكون الأمساج

**الزهرة:** سوق متغيرة لها أوراق وترانيم أخرى متخصصة من أجل التكاثر  
الترانيم الزهرية ودورها في عملية التكاثر  
الزهرة الكاملة - والزهرة الناقصة

### ١ خصائص الأزهار

#### أولاً، خصائص الأزهار

الزهرة: سوق متغيرة لها أوراق وترانيم أخرى متخصصة من أجل التكاثر

الترانيم الزهرية ودورها في عملية التكاثر

الزهرة الكاملة - والزهرة الناقصة

#### ثانياً، تكون الأمساج

##### (١) إنتاج حبوب اللقاح

نواة تواليدية

أنابيبية

نواة تواليدية



حبوب اللقاح  
دقائق  
جراثيم

أربع خلايا أحادية المجموعة  
الクロموسومية

الجرثومة الأنثوية الضخمة  
التي بقيت حية تقسم  
ميوزيًا فتعطي خلتين أحادية  
المجموعة الكروموسومية


كل خلية أحادية المجموعة  
الクロموسومية تقسم إنقسامان

##### (٢) إنتاج البويضات



ميوزيان متاليان مما يؤدي  
إلى إنتاج ثمانية خلايا أحادية  
المجموعة الكروموسومية

موت الأنوية المقابلة للأقطاب

وعيش ثلاثة منها







تقوم نواة الجرثومة الأنثوية الضخمة بثلاث انقسامات ميوزية



خلايا مساعدة

### ثالثاً، التلقيح والإخصاب





## أسئلة على التكاثر الجنسي في النباتات (١٢)

س : أكتب الاسم أو المصطلح العلمي الذي تدل عليه كل عباره من العبارات التالية

- ( ) سوق متغيرة لها أوراق وتركيب آخر متخصص من أجل التكاثر.
- ( ) الزهرة التي تحتوي على التركيب الأنثوية والذكورية معاً.
- ( ) الزهرة التي تحتوي على إحدى التركيب الأنثوية أو الذكورية فقط.
- ( ) المحيط الخارجي للزهرة الذي يحضن التركيب الأخرى ويحميها من العوامل الخارجية.
- ( ) التركيب الذكوري في الزهرة وقد يختلف عددها من نوع إلى آخر.
- ( ) يقوم بإنتاج حبوب اللقاح التي تحتوي على الأمشاج الذكورية.
- ( ) التركيب الذي تحط عليه حبوب اللقاح وتنبت وغالباً ما يكون لزجاً.
- ( ) جزء من المداع يصل بين المبيض والميسن.
- ( ) يتشكل من الأنوية الثمانية مع السيتوبلازم المحيط بها في النباتات الزهرية.
- ( ) انتقال حبوب اللقاح من متك زهرة إلى ميسنها.
- ( ) انتقال حبوب اللقاح من متك زهرة إلى ميسن زهرة أخرى من النوع نفسه.
- ( ) اتحاد الخلية البيضية مع إحدى النواتين الذكريتين وتكون اللاقحة أو الزيجوت.
- ( ) نسيج خلايا ثلاثة المجموعة الكروموموسومية تكون نتيجة لاتحاد نواة ذكرية مع النواتين القطبيتين.

س : ضع علامة ✓ أمام العبارة الصحيحة وعلامة ✗ أمام العبارة غير الصحيحة فيما يلي :

- ( ) ( ✓ ) الزهرة هي العضو التكاثري في النباتات عاريات البذور.
- ( ) ( ✗ ) زهرة التين والنخيل من الأزهار الكاملة .
- ( ) ( ✗ ) عدد الأوراق الملونة أو البتلات ثابت في أزهار النوع الواحد ويختلف من زهرة إلى أخرى
- ( ) ( ✗ ) يقوم المتك بإنتاج حبوب اللقاح التي تحتوي على الأمشاج الذكورية .
- ( ) ( ✗ ) الطور المتشعي في النباتات الزهرية يقتصر على تكوين الأمشاج ولا ينتج نباتات مستقلة
- ( ) ( ✗ ) تزول النواة الأنبوية مع نهاية نمو أنبوبة اللقاح .



## الفصل الثاني: التكاثر والاستجابة في النباتات

### س. الحشر الإيجابية الصحيحة والمناسبة من بين الإجابات المليّة تلي كل عبارة من العبارات التالية..

١. من النباتات التي تعرف أزهارها بالزهرة الكاملة  
( ) التوت      ( ) المشمش
٢. من النباتات التي تعرف أزهارها بالزهرة الناقصة  
( ) المشمش      ( ) المنتور
٣. تعرف أوراق الكأس بـ  
( ) السبلات      ( ) البتلات
٤. ( ) الكرابل      ( ) الأسدية

### س: علل ما يلي تعليلًا علميًّا مناسباً.

١- يطلق على أزهار المنتور والممشمش والفول أزهار كاملة

لأن أزهارها تحتوي على التراكيب الأنثوية والذكرية معاً في نفس الزهرة

٢- يطلق على زهرة التين والتوت والنخيل أزهار ناقصة: لأن أزهارها تحتوي على إحدى التراكيب الأنثوية أو الذكرية فقط

٣- أوراق التوieg ملونة ولها رواج مختلفة: لكي تساهم في جذب الحشرات التي تؤدي دوراً مهماً في عملية التلقيح

٤- غالباً ما يكون الميسن في الزهرة لزجاً ودبقاً: لثبت عليه حبوب اللقاح

٥- حدوث عملية الإخصاب المزدوجة في النباتات مغطاة البذور

الإخصاب الأول يحدث نتيجة اتحاد أحد النواتين الذرتين مع الخلية البيضية لتكون الزيجوت وفي هذه الأثناء يحدث الإخصاب الثاني نتيجة اتحاد النواة الذكرية الثانية مع النواتين القطبيتين وتكون خلية ثلاثة المجموعة الكروموسومية التي تكون نسيج الإندو سبرم

٦- ضرورة توفر الماء خلال المرحلة الأولى من النبات

لأن الماء ينشط العديد من الإنزيمات بما فيها تلك التي تحول النشا إلى سكر الذي يعتبر المصدر الأساسي للطاقة لنمو الجنين

٧- وجود وفرة كبيرة من النمو النباتي أثناء فصل الربيع

لأنه يتميز بالدفء ما يدفع العديد من البذور الكامنة لأن تنبت لأن البذور تحتاج إلى درجات حرارة معتدلة أو دافئة لكي تنبت

٨- تكون البذور التي يعيق الضوء انباتها ذات أحجام كبيرة نسبياً

لأنها تحتوي على كمية كبيرة من المواد المخزنة تكفي لإنبات البذور حتى لو زرعت في عمق التربة

س: عدد لكل ما يلي:-

١. التراكيب الزهرية العقيمة

٢. التراكيب الزهرية التكاثرية

٣. العوامل التي تساعده في عملية التلقيح الخلطي

٤. العوامل البيئية التي تؤثر في عملية النبات

## **الفصل الثاني: التكاثر والاستجابة في النباتات**

س. قارن بین کلا ممایا تی ..

وجه المقارنة	الطلع	المتاع
نوع المشيّg الذي ينتجه		
وجه المقارنة	الكأس	التوبيخ
التركيب		
لون الأوراق		
الوظيفة		
وجه المقارنة	اللافحة (الزيجوت)	خلايا نسيج الاندوسبروم
نوع المجموعة الكروموسومية		
الأهمية		
المنشأ (التكوين)		

س : ما أهمية كل من :-

- ## ١. التراكيب الزهرية العقيمة

٢. المتك في الزهرة

٣. نسيج الإندوسبرم

#### ٤. النواة الأنبوية في عملية الإخصاب

## ٥. الماء خلال المرحلة الأولى من الإنبعاث





## الدرس ١- الأنماط الوراثية

## النقطة الرئيسية للدرس

(٣) استنتاجات مندل وتفسيراته

(٢) ملاحظات مندل

(١) تجارب مندل

## أسئلة على الأنماط الوراثية

## س: أكتب الاسم أو المصطلح العلمي الذي تدل عليه كل عباره من العبارات التالية

- (.....) ١. الصفات التي يمكن أن تنتقل من الآباء إلى الأبناء من جيل إلى جيل .
- (.....) ٢. الدراسة العلمية للصفات الموروثة .
- (.....) ٣. الصفة الوراثية التي يحملها أحد الآبوبين وتظهر في أفراد الجيل الأول .
- (.....) ٤. الصفة الوراثية التي يحملها أحد الآبوبين ولا تظهر في أفراد الجيل الأول .
- (.....) ٥. أجزاء من الكروموسومات مسؤولة عن إظهار الصفات الوراثية .
- (.....) ٦. الأليل الذي يظهر تأثيره عندما يجتمع الآليلان .
- (.....) ٧. الأليل الذي لا يظهر تأثيره عندما يجتمع الآليلان .

## س: علل لما يلي تعليلا علميا مناسبا.

- ١- تميز تجارب مندل عن تجارب العلماء الذين سبقوه أو عاصروه وذلك للأسباب التالية

١. درس كل صفة على حده في بداية تجاربه
  ٢. استخدم اعداد كبيرة من النباتات
  ٣. استخدم الاحتمالات والإحصاء الرياضي في تفسير النتائج
- ٢- نجاح اختيار مندل لنبات البازلاء لإجراء تجاربه وذلك للأسباب التالية

١. تركيب أزهار البازلاء (أزهار خنث - تحيط بتلات التوهج احاطة تامة بالأعضاء التناسلية مما يسمح بحدوث عملية التلقيح الذاتي - يمكن إحداث التلقيح الخلطي فيها بسهولة .)
  ٢. يحمل النبات أزواجا من الصفات المتضادة سهلة التمييز والرؤية .
  ٣. قصر دورة الحياة مما يسمح بتكرار التجارب على مدار العام الواحد .
- ٣- تحاط أزهار البازلاء بكيس من الورق

لضمان عدم وصول حبوب لقاح من زهرة أخرى إليها ما يسمح بحدوث عملية التلقيح الذاتي

- ٤- نزع مندل في تجاربه متى الأزهار قبل نضجها
- لضمان حدوث التلقيح الخلطي في الوقت المناسب
- ٥- افترض مندل وجود شكلين على الأقل لكل عامل من العوامل التي تتحكم بالصفة الوراثية بسبب وجود مظاهرتين لكل صفة وراثية

## س: عدد ما يلي ..

١. المميزات التي تميزت بها تجارب مندل عن تجارب العلماء الذين سبقوه أو عاصروه .
  - درس مندل كل صفة على حدة في بداية تجاربه .
  - استخدم مندل أعداد كبيرة من النباتات .
  - استخدم مندل الاحتمالات والإحصاء الرياضي في تفسير النتائج .



٢. أسباب نجاح اختيار مندل لنبات البازلاء لإجراء تجاربه .
- تركيب أزهار البازلاء فهي ( أزهار خنث - تحيط بتلات التوهج بأعضائها التناسلية تماماً في شكل زورق ما يسمح بحدوث عملية التلقيح الذاتي - يمكن إحداث التلقيح الخلطي بسهولة ) .
  - يحمل نبات البازلاء أزواجاً من الصفات المتضادة سهلة التمييز والرؤية .
  - قصر دورة حياة نبات البازلاء مما يسمح بتكرار التجارب .
٣. افتراضات مندل في تفسير ملاحظاته حول التجارب التي اجرتها باستخدام التحليل الإحصائي .
- افترض مندل أن التحكم بالصفة الوراثية يتم بواسطة ما أسماه العوامل الوراثية .
  - توجد العوامل في أزواج في خلايا الكائن .
  - افترض مندل أنه لا بد من وجود شكلين على الأقل لكل عامل من العوامل بسبب وجود مظاهر لكل صفة وراثية .
٤. خطوات تجربة مندل .
- التأكد من نقاء الصفة الوراثية وذلك عن طريق زراعة النباتات وتركها تتلاজح ذاتياً لتنتج الصفة نفسها التي كان يدرسها من جيل إلى جيل آخر من دون تغيير.
  - استخدم مندل في تجربته مجموعتين مختلفتين من النباتات النقية وأطلق عليها اسم جيل الآباء .
  - أجري مندل التلقيح الخلطي بين المجموعتين ثم زرع البذور الناتجة فأنتجت البذور نباتات أطلق عليها اسم الجيل الأول F1
  - ترك مندل نباتات الجيل الأول تتلاজح ذاتياً ثم زرع البذور التي حصل عليها فأنتجت نباتات أطلق عليها اسم الجيل الثاني F2
- س ، قارن بين كلاماً يأتي :-**

وجه المقارنة	الصلة الندية في نبات البازلاء	الصلة المتنحية في نبات البازلاء
شكل البذور		
لون البذور		
شكل قرن الثمرة		
لون قرن الثمرة		
لون الأزهار		
موضع الأزهار		
طول الساق		
وجه المقارنة	الصلة المتنحية	الصلة الندية
الآلilan		



## الدرس ١- مبادئ علم الوراثة

## النقطة الرئيسية للدرس

١- الأساس الخلوي للوراثة ٢- تمثيل الأليلات بالرموز ٣- قوانين مندل ٤- توقعات وراثية لا تخضع لقوانين مندل

١- الأساس الخلوي للوراثة وتمثيل الأليلات بالرموز

**النظرية الكروموسومية:** تُقرّبأن مادة الوراثة محمولة بواسطة الجينات الموجودة على الكروموسومات

**العالم الذي وضع النظرية:** العالم ساتون

**المصطلحات والرموز التي استخدمها العلماء لتبسيط شرح النظرية الكروموسومية في الوراثة.**

- الجينات هي أجزاء من الكروموسومات

- الأليلات عبارة عن أشكال مختلفة للجينات ولكل جين صفة وراثية

- يتحكم في إظهار الصفة جين واحد له أليلان

- أليل الصفة السائدة يُرمز له بالحرف الكبير مثلاً A - أليل الصفة المتنحية يُرمز له بالحرف الصغير مثلاً a

- الصفة السائدة - الصفة المتنحية

- الصفة النقية والصفة الهجينة

- التركيب الظاهري والتركيب الجيني

**مربعات بانت:** مربعات لتنظيم المعلومات الوراثية لتوضيح النتائج المتوقعة في تجارب الوراثة وليس النتائج نفسها.

## ٢- قوانين مندل

## القانون الأول: قانون الانعزال

وينصّ هذا القانون على ما يلي: ينفصل كل زوج من الجينات بعضهما عن بعض أثناء الانقسام الميوزي بحيث يحتوي نصف


عدد الأمشاج الناتجة على جين واحد من كل زوج من الجينات ويحتوي النصف الآخر على الجين الآخر

**تطبيقات على القانون الأول (التهجين الأحادي)**

**التهجين الأحادي:** التوقع بنتائج توارث صفة واحدة من دون النظر إلى باقي الصفات

مثال: هل يمكن تحديد نتائج التهجين الأحادي لنباتات بازلاء طويلة الساق نقية (TT) مع نباتات بازلاء أخرى طويلة الساق

هجينة (Tt)؟



		T	T
		TT طويل الساق	TT طويل الساق
		Tt طويل الساق	Tt طويل الساق

## القانون الثاني لمندل "قانون التوزيع المستقل"

ينصّ على أن أزواج الجينات تنفصل بعضها عن بعض ، وتتوزّع في الأمشاج عشوائياً ومستقلة كل منها عن الآخر.

**التهجين الثنائي** هي دراسة توارث صفتين في وقت واحد .

## القانون الثالث لمندل "قانون السيادة"

الأليل السائد يظهر تأثيره ، أمّا الأليل المتنحى فيختفي تأثيره في الفرد الهرجي ، إلا إذا اجتمع هذان الأليلان المتنحيان معًا





**الفصل الأول: أساسيات علم الوراثة**



تلقيح خلطي بين فرد يحمل الصفة السائدة غير محددة التركيب الجيني مع فرد آخر يحمل الصفة المتنحية المقابلة لها وذلك للتمييز بين الفرد النقي السائد والفرد الهجين السائد.

**إجراء الاختبار:** الفرد الذي يحمل الصفة المتنحية يكون نقىًّا والمعروف التركيب الجيني .

(١) إذا كان التركيب الجيني للفرد المختبر سائداً نقىًّا ، سيكون التركيب الظاهري لجميع الأفراد الناتجة الصفة السائدة .

(٢) إذا كان التركيب الجيني للفرد المختبر سائداً هجينًا ، فسيكون التركيب الظاهري لنصف الأفراد الناتجة الصفة السائدة والتركيز الظاهري لنصفها الآخر الصفة المتنحية .

**أسئلة على قوانين مندل**

**س: أكتب الاسم أو المصطلح العلمي الذي تدل عليه كل عباره من العبارات التالية**

١. نظرية تقرأن مادة الوراثة محمولة بواسطة الجينات الموجودة على الكروموسومات . (.....)
٢. الأشكال المختلفة للجينات . (.....)
٣. مصطلح يطلق على الصفة الظاهرة على الفرد . (.....)
٤. مصطلح يطلق على التركيب الوراثي للصفة . (.....)
٥. قانون ينص على أن كل زوج من الجينات ينفصل بعضهما عن بعض أثناء الانقسام الميوزي بحيث يحتوي نصف عدد الأمشاج الناتجة على جين واحد من كل زوج من الجينات ويحتوي النصف الآخر على الجين الآخر . (.....)
٦. مربعات لتنظيم المعلومات الوراثية لتوضيح النتائج المتوقعة في تجارب الوراثة . (.....)
٧. التوقع بنتائج توارث صفة واحدة من دون النظر إلى باقي الصفات . (.....)
٨. قانون ينص على أن أزواج الجينات تنفصل بعضها عن بعض وتتوزع في الأمشاج عشوائياً ومستقلة كل منها عن الأخرى . (.....)
٩. دراسة توارث صفتين في وقت واحد . (.....)
١٠. قانون ينص على أن الأليل السائد يظهر تأثيره أما الأليل المتنحي فيختفي تأثيره إلا إذا اجتمع هذان الأليلان المتنحيان معاً . (.....)
١١. تلقيح خلطي بين الفرد الذي يحمل الصفة السائدة غير محددة التركيب الجيني مع فرد آخر يحمل الصفة المتنحية المقابلة لها وذلك للتمييز بين الفرد النقي السائد والفرد الهجين السائد . (.....)

**س: علل ما يلي تعليلاً علمياً مناسباً.**

- ١- التركيب الجيني للصفة المتنحية دائمًا نقي لأن جيني الصفة الوراثية المتنحية دائمًا متماثلين
- ٢- تسمية التهجين الأحادي بهذا الاسم لأن الهدف منه دراسة توارث صفة واحدة دون النظر إلى باقي الصفات

**٣- تستخدم الصفة المتنحية لإجراء التلقيح الإختياري**

الصفة المتنحية لا تظهر في التركيب المظاهري إلا إذا اجتمع الأليلان المتنحيان لذا فالصفة المتنحية دائمًا نقيّة ومعروفة التركيب الجيني  
**س : قارن بين كلاما يأتي ..**

وجه المقارنة	الهجين الأحادي	الهجين الثنائي
استخدامه		
وجه المقارنة	أزهار البازلاء البنفسجية الهجينية	أزهار البازلاء البنفسجية النقية
التركيب الجيني		



## الوحدة الأولى: علم الوراثة


### الفصل الأول: أساسيات علم الوراثة

س : أجب عن الأسئلة التالية { تطبيقات وراثية } ..

وضح على أساس وراثية نسبة التركيب المظاهري والجيني للأفراد الناتجة من تهجين

١ - نبات بازلاء ذو ثمار خضراء نقية واخر ذو ثمار صفراء .

نرمز لعامل صفة لون الثمار الخضراء ( الصفة السائدة ) بالحرف G ولعامل صفة لون الثمار الصفراء ( الصفة المتنحية ) بالحرف g



تحليل الجدول التركيب المظاهري ١٠٠ % نباتات ثماره خضراء

٢ - نباتين بازلاء كلاهما طول الساق هجين .

نرمز لعامل صفة طول الساق ( الصفة السائدة ) بالحرف T

نرمز لعامل صفة قصر الساق ( الصفة المتنحية ) بالحرف t

تحليل الجدول

التركيب المظاهري

التركيب الجيني

٣ - نبات بازلاء بذوره ملساء هجينة واخر بذوره مجعدة .

نرمز لعامل صفة ..... ( الصفة السائدة ) بالحرف.....

نرمز لعامل صفة ..... ( الصفة المتنحية ) بالحرف.....

تحليل الجدول

التركيب المظاهري

التركيب الجيني

٤ - نباتين بازلاء كلاهما ازهاره بنفسجية إبطيه هجينة .

نرمز لعامل صفة ..... ( الصفة السائدة ) بالحرف.....

نرمز لعامل صفة ..... ( الصفة المتنحية ) بالحرف.....

نرمز لعامل صفة ..... ( الصفة السائدة ) بالحرف.....

نرمز لعامل صفة ..... ( الصفة المتنحية ) بالحرف.....

تحليل الجدول التركيب المظاهري

**الفصل الأول: أساسيات علم الوراثة**


- ٥- نباتين بازلاء أحدهما ازهاره بنفسجية إبطيه هجينه والآخر أزهاره بيضاء إبطيه هجينه .  
نرمز لعامل صفة ..... (الصفة السائدة) بالحرف ..... نرمز لعامل صفة ..... (الصفة المتنحية) بالحرف .....  
نرمز لعامل صفة ..... (الصفة السائدة) بالحرف ..... نرمز لعامل صفة ..... (الصفة المتنحية) بالحرف ....

تحليل الجدول

التركيب المظاهري

- ٦- نباتين بازلاء أحدهما ازهاره بنفسجية ابطيه هجينه والآخر ازهاره بيضاء طرفيه .

- نرمز لعامل صفة ..... (الصفة السائدة) بالحرف ..... نرمز لعامل صفة ..... (الصفة المتنحية) بالحرف .....  
نرمز لعامل صفة ..... (الصفة السائدة) بالحرف ..... نرمز لعامل صفة ..... (الصفة المتنحية) بالحرف .....



تحليل الجدول



التركيب المظاهري

التركيب الجيني

- ٧- التلقيح ما بين سلالتين نقيتين من النزرة لديهما الخصائص التالية :

بنزور دائيرية صفراء اللون وبذور مجعدة سوداء اللون أعطي في الجيل الأول ذرة جميع بذورها دائيرية وسوداء اللون :

- (أ). ماذا تستنتج ؟ (ب). أعط رموزا للجينات ؟ (ج). ما هو التركيب الجيني لنباتات الآباء ولنباتات الجيل الأول ؟  
(د). قمنا بإجراء التلقيح الذاتي لنباتات الجيل الأول اجري تحليل جينيا مناسبا مستعينا بمربع بانت لتحديد نسب التراكيب




٨- حدث تزاوج بين ببغاء لون جسمه أخضر ورأسه أصفر نقي للصفتين وبين ببغاء لون جسمه أزرق ورأسه أبيض نقي للصفتين فجاء لون أجسام طيور ببغاء الجيل الأول أخضر ولون رؤوسها أصفر. وبعد تزاوج أفراد الجيل الأول حصلنا في الجيل الثاني على التراكيب الظاهرية التالية :

٩ طيور ببغاء أخضر لون الجسم أبيض لون الرأس

٣ طيور ببغاء أزرق لون الجسم أبيض لون الرأس


والمطلوب (أ) . ما هي الصفات السائدة علل إجابتك (ب) . أكتب رموزاً للجينات المناسبة (ج) . حدد التراكيب الجينية لكل فرد وفسر ذلك على أساس وراثية .



(أ) -----

(ب) -----


(ج) -----



٩- التلقيح ما بين سلالتين نقيتين من النزرة لديهما الخصائص التالية : بذور دائيرية صفراء اللون وبذور مجعدة سوداء اللون أعطي في الجيل الأول ذرة جميع بذورها دائيرية وسوداء اللون . وبعد التلقيح بين نوعي نبات ذرة لديهما التراكيب الظاهرية التالية : بذور دائيرية سوداء وبذور دائيرية صفراء أعطي النتائج التالية :

٤١ نبتة بذورها دائيرية وسوداء - ٢٣٤ نبتة بذورها دائيرية وصفراء - ٧٨ نبتة بذورها مجعدة وسوداء - ٨١ نبتة بذورها مجعدة وصفراء والمطلوب


(أ) . ما هي الصفات السائدة علل إجابتك (ب) . أكتب رموزاً للجينات المناسبة (ج) . حدد التراكيب الجينية لكل فرد وفسر ذلك على أساس وراثية .



(أ) -----

(ب) -----

(ج) -----



## ٣٣ توقعات وراثية لا تخضع لقوانين مندل



## الفصل الأول: أساسيات علم الوراثة

تجارب العلماء بعد مندل أوضحت أن هناك صفات لا تورث وفقاً لما توصل إلية مندل ، أي أنها تتعارض مع قوانينه وقد سُميت «**الصفات غير المندلية**» لأنها تخضع في توارثها لآليات أخرى غير السيادة التامة . من هذه الآليات آلية السيادة الوسطية.

**السيادة الوسيطة:** الفرد الهجين لديه صفة لا تُشبه تماماً الصفة الموجودة لدى أي من الأبوين

يوجد نوعان من السيادة الوسطية:

(١) السيادة غير التامة

(٢) حالة السيادة غير التامة: يكون التركيب الظاهري للهجين وسطياً بين التركيبين الظاهرين للأبوين النقيين

أمثلة على حالة السيادة غير التامة

(١) توارث لون الأزهار في نبات حنك السبع : يُعتبر اللون القرنفي لأزهار النبات صفة وسطية بين اللونين الأحمر والأبيض لأنها الأباء

(٢) توارث لون الجلد في بعض سلالات الأبقار: حيث توجد أبقار حمراء وأخرى بيضاء والأبقار الهجينة ذات لون بني مبيض

(٣) توارث لون الريش في الدجاج الأندرسية: حيث يوجد لون ريش أسود وأبيض والفرد الهجين لون الريش رمادي

## تطبيقات وراثية على السيادة غير التامة

يوجد ثلاثة أشكال من الفجل وهي الطويل والدائمي والبيضاوي وقد أعطت التلقیحات المختلفة بين نباتات الفجل النتائج التالية :

(١) التلقیح الأول: نبتة فجل طولية ونبتة فجل بيضاوية وأعطي النتائج ١٢٠ فجلة طويلة و ١١٨ فجلة بيضاوية .

(٢) التلقیح الثاني: نبتة فجل دائمية ونبتة فجل بيضاوية وأعطي النتائج ١٣٩ فجلة دائمية و ١١٩ فجلة بيضاوية .

(٣) التلقیح الثالث: تلقیح ذاتي بين الفجل البيضاوي وأعطي النتائج ٦٠ فجلة طويلة و ١١٩ فجلة بيضاوية و ٥٨ فجلة دائمية .

والمطلوب (أ). ما نوع الحالة الوراثية السابقة على إجابتك (ب). أكتب رموزاً للجينات المناسبة (ج). حدد التركيب الجيني

لكل فرد وفسر ذلك على أساس وراثية

## التلقیح الأول

نبتة فجل طولية X نبتة فجل بيضاوية

التركيب الجيني للأباء: LL

أمشاج الآباء:

LR	x	RR
L %50		R %100

L %50		R %100
----------	--	-----------

	L %50	R %50
R %100	LR %50	RR %50

تحليل الجدول

فجل مدور (RR) %50

فجل بيضاوي (LR) %50

## التلقیح الثالث

نبتة فجل بيضاوية X نبتة فجل بيضاوية

التركيب الجيني للأباء: LR

أمشاج الآباء:

LR	x	LR
L %50		R %50

L %50		R %50
----------	--	----------

تحليل الجدول

فجل طويل (LL) %25

فجل بيضاوي (LR) %50

فجل مدور (RR) %25



## الفصل الدراسي الأول



## أحياء



## (٢) السيادة المشتركة

الحالة الوراثية التي يظهر فيها تأثيراً الأليلين الموجودين في الفرد الهجين كاملين منفصلين مثال على السيادة المشتركة

## وراثة لون الشعر في أبقار الشورتبرون

حيث إنّ الأليلي لون الشعر الأحمر (R) والأبيض (W) ذات سيادة مشتركة فالأفراد الهجينة تمتلك شعرًا أبيض وأحمر RW س : فسر على أساس وراثية الاحتمالات الناتجة من تزاوج أفراد هجينة تمتلك شعرًا أبيض وأحمر RW من أبقار الشورتبرون ؟

P :		X		نسبة التركيب المظاهري
G :				أفراد لون شعرها أحمر
F <sub>1</sub> :				أفراد لون شعرها هجين
				أفراد لون شعرها أبيض
				نسبة التركيب الجيني
			RR: RW : WW 1 : 2 : 1	

## س: اكتب الاسم أو المصطلح العلمي الذي تدل عليه كل عباره من العبارات التالية

١. حالة وراثية يكون التركيب الظاهري للفرد الهجين وسطياً بين التركيبين الظاهريين للأبوين النقين . (.....)
٢. حالة وراثية يظهر فيها تأثير الأليلين الموجودين في الفرد الهجين كاملاً ومنفصلاً . (.....)

س : علل لما يلي تعليلاً علمياً مناسباً .

١- لا توجد أدلة مسؤولة عن إظهار اللون القرنفي للأزهار نبات حنك السبع لأن هذه الصفة ناتجة من تأثير أليل اللون الأحمر للأزهار مع تأثير أليل اللون الأبيض حيث لا يسود أي منهما سيادة تامة على الآخر .

٢- وراثة لون الشعر في أبقار الشورتبرون مثال على السيادة المشتركة في الإنسان .

يظهر تأثير أليل لون الشعر الأحمر (R) وأليل لون الأبيض (W) الموجودين في الفرد الهجين كاملاً ومنفصلاً .

٣- لا يجري التلقيح الاختباري على الأفراد الهجين في حالة السيادة الوسطية

لأن التراكيب الجينية للأفراد الهجين يمكن الاستدلال عليها من التراكيب الظاهرية .

س : قارن بين كلاماً يأتي :-

السيادة المشتركة	السيادة غير التامة	وجه المقارنة
		المفهوم
		أمثلة



## ٢ زواج الأقارب

## ١ دراسة سجل النسب الوراثي

## سجل النسب

عبارة عن مخطط يوضح كيفية انتقال الصفات وجيناتها من جيل إلى جيل في عائلة محددة.



## أهمية دراسة سجل النسب

(١) تسهيل دراسة انتقال الصفات الوراثية في الإنسان

(٢) تتبع توارث الصفات المختلفة ، بخاصة ما يتعلق بالاختلالات والأمراض الوراثية.

## بعض الرموز المستخدمة في سجل النسب

الرمز	الدلالة	ذكر لا تظهر عليه الصفة	أنثى لا تظهر عليه الصفة	ذكر تظهر عليه الصفة
●	ذكرة لا تظهر عليه الصفة	أنثى لا تظهر عليه الصفة	أنثى لا تظهر عليه الصفة	ذكر تظهر عليه الصفة



## أسئلة على دراسة توارث الصفات في الإنسان

## س : أكتب الاسم أو المصطلح العلمي الذي تدل عليه كل عباره من العبارات التالية

١. مخطط يوضح كيفية انتقال وجيناتها من جيل إلى جيل في عائلة محددة .
٢. الفرد الذي يحمل أليل / جين الصفة المتنحية والتي لا يظهر تأثيرها .
٣. صفة وراثية في الإنسان يتسبب في ظهورها أليل متعدد يسبب نقص أو غياب صبغ الميلانين في الجلد والشعر. .
٤. خلل وراثي ينتج عن أليل سائد يتسبب في عدم تساوي تقوس قرنية العين .

## س : حلل لما يلي تعليلا علميا مناسبا .

## ١- صعوبة دراسة انتقال الصفات الوراثية في الإنسان .

وذلك بسبب طول الفترة الممتدة بين جيل وآخر بالإضافة إلى قلة عدد الأفراد الناتجة عند كل تزاوج

## ٢- المصاب بإستجماتزم العين يرى الأشياء أكثر وضوحا عند مستوى معين منه عند مستوى آخر .

يتسبب في ذلك عدم تساوي تقوس قرنية العين

## ٣- يؤدي غالبا الزواج بين الأقارب إلى ولادة أبناء يعانون الكثير من الاختلالات والأمراض الوراثية .

لأن الزواج بين الأقارب يتيح الفرصة لظهور تأثير الكثير من الجينات الضارة من النوع المتنحي الموجود لديهم .

## ٤- الزواج بين الأبعد أكثر تميزا عن الزواج بين الأقارب .

لأن الزواج بين الأبعد يؤدي إلى ولادة أفراد هجينية يتم فيها احتجاج الصفات غير المرغوب فيها بواسطة الصفات السائدة العادية .

## س : قارن بين كلا مما يأتي ..

وجه المقارنة	صفة المهاق (الألبينو)	صفة إستجماتزم العين
نوع الأليل الذي يتسبب في ظهورها		




س، أجب عن الأسئلة التالية:

(١) إن صفة أيمان أوأيسرتقع على الكروموسوم الجسيمي. الجينة المسئولة عن هذه الصفة لها أليلان ، اليـل الصـفة أـيمـان

(R) سائدة على اليـل الصـفة أـيسـر(r) يوضـح سـجـلـ النـسـبـ أدـنـاهـ عـاـشـةـ بـعـضـ أـفـرـادـهـ أـيـسـرـونـ .

والمطلوب : (أ). حدد التركيب الجيني للزوجين ١، ٢ .  
علل إجابتك



(ب). حدد التراكيب الجينية للزوجين ٨، ٩ .  
ولـأـلـدـهـمـ ١ـ٣ـ، ١ـ١ـ، ١ـ٢ـ . عـلـلـ إـجـابـتـكـ لـكـ لـكـ تـرـكـيـبـ جـينـيـ .

(ج). هل يمكن للمرأة ١١ أن تنجـبـ طـفـلاـ أـيـسـرـ؟  
علـلـ إـجـابـتـكـ .

الإجابة

(أ). التركيب الجيني للوالدين (١، ٢) هو Rr لأنـعـنـهـماـ ولـدـ أـيـسـرـ(٧ـ)ـ وـتـرـكـيـبـهـ الجـينـيـ rrـ فـيـحـصـلـ هـذـاـ الـوـلـدـ عـلـيـ أـلـيـلـ rـ مـنـ أـبـيهـ وـأـلـيـلـ rـ مـنـ وـالـدـتـهـ لـذـلـكـ يـجـبـ أـنـ يـكـوـنـ الـوـالـدـانـ مـتـبـاـيـنـ الـلـاـقـحـةـ Rrـ .


(ب). الوالد رقم (٧) هو rr لأنـهـ أـيـسـرـ . الوالدة رقم (٨) هي RR لأنـجـمـيعـ أـلـوـادـهـاـ يـكـتـبـونـ بـالـيدـ الـيـمنـيـ .  
الـأـلـوـادـ ١ـ١ـ، ١ـ٢ـ، ١ـ٣ـ هـمـ جـمـيـعاـ Rrـ كـلـ مـنـهـمـ يـحـصـلـ عـلـيـ أـلـيـلـ rـ مـنـ الـوـالـدـ وـأـلـيـلـ Rـ مـنـ الـوـالـدـةـ .

(ج). هناك إمكانية بأنـ تـنـجـبـ هـذـهـ المـرـأـةـ (١١ـ)ـ وـلـدـ أـيـسـرـاـ إـذـاـ تـزـوـجـتـ رـجـلاـ هـجـيـنـاـ Rrـ أـوـ أـيـسـرـاـ rrـ .

(٢) تـزـوـجـ رـجـلـ (A)ـ مـصـابـ بـعـيـ الـأـلـوـانـ بـأـلـوـانـ تـرـيـ الـأـلـوـانـ بـشـكـ طـبـيـعـيـ أـنـجـبـ أـرـبـعـةـ أـلـوـادـ صـبـيـ وـبـنـتـ مـصـايـنـ بـعـيـ الـأـلـوـانـ وـصـبـيـ وـبـنـتـ (C)ـ رـؤـيـهـمـ طـبـيـعـيـةـ . تـزـوـجـتـ الـابـنـةـ (C)ـ بـرـجـلـ (D)ـ طـبـيـعـيـ وـأـنـجـبـ أـرـبـعـةـ أـلـوـادـ بـنـتـينـ وـصـبـيـ طـبـيـعـيـنـ وـصـبـيـاـ مـصـابـاـ بـعـيـ الـأـلـوـانـ .

وـالمـطـلـوبـ : اـرـسـلـ سـجـلـ نـسـبـ لـهـذـهـ الـعـاـشـةـ .

الإجابة



## الدرس ٤ ارتباط الجينات الارتباط والعيور

## النقاط الرئيسية للدرس

٢ [العبور]

الارتباط

## **العلاقة بين الحمض النووي DNA والجينات والكروموسومات**

**الـ DNA الحمض النووي :** يتكون من لولب مزدوج من شريطتين ، يتكون كل واحد منها من وحدات تعرف بالنيوكليوتيدات.

**الكروموسوم**: عبارة عن الـDNA ملتف حول نفسه ومتكدس في شكل مكثف للغاية

## **تحريية ياتسون وبيانٌ على نتائج المازلاع السكرية**

يسود في هذه النباتات أليل اللون البنفسجي للأزهار ( $P$ ) على أليل اللون الأحمر ( $p$ ) وسود أيضًا أليل شكل حبوب اللاقاح


الطول (L) على أليل شكلها المستدير (l).

- في جيل الآباء ، تم إجراء التلقيح الخلطي لنباتات نقبية ذات أزهار بنفسجية وحبوب لقاح طويلة (PP LL) مع نباتات نقبية ذات أزهار حمراء وحبوب لقاح مستديرة (rr ll) .



الجيل الأول

- 2.** جاءت جميع نباتات الجيل الأول ذات أزهار بنسجية  
وحبوب لقاح طويلة كما تم التوقع به طبقاً لقوانين مندل.  
أي من هذه الصفات سائدة؟



الجيل الثاني

- عندما تلقيت نباتات الجيل الأول ذاتياً، لم تُنتِج النسبة 9 : 3 : 1 . بين نباتات الجيل الثاني ، ونتج عدد أكبر من المتوقع كان له التركيب الظاهري نفسه لجيل الآباء (وبنسبة 75% بنفسجي طويلاً ، 25% أحمر مستدير) 3.

الأعداد المتوقعة بحسب قانون التوزيع المستقل	الأعداد التي حصل عليها	التراتيب الظاهرة
216	284	بنفسجي ، طويل
71	21	بنفسجي ، مستدير
71	21	أحمر ، طويل
24	55	أحمر ، مستدير

٤. افترض باتسون وبانت أنّ صفتني لون الأزهار وشكل حبوب اللقاح مرتبطان على الكروموسوم نفسه . لاحظ أنّ التركيبين الظاهريين «بنفسجي مستدير» و«أحمر طويل» لا يظهران في مربع بانت .

مرجع بات للجينات المترتبة		
$\mu l \ %50$	PL %50	
بنفسجي ، طويل $P\mu Ll$ %25	بنفسجي ، طويل $PP LL$ %25	PL %50
أحمر ، مستدير $pp ll$ %25	بنفسجي ، طويل $Pp Ll$ %25	$\mu l$ %50

التمييز بين الذكر والأنثى من خلال شكل الجسم . (٣) لديها ٤ أزواج من الكروموسومات الكبيرة التي يمكن رؤيتها بسهولة في المجهر العادي الاستنتاج : وتوصل مورجان إلى أنّ صفتی لون الجسم وشكل الأجنحة لا تتوزع مستقلة بعضها عن بعض وافتراض لتفسير هذه النتائج . «أنّ جينات هاتين الصفتين تقع على الكروموسوم نفسه» ، وأصبح افتراضه أحد فروض النظرية الكروموسومية في الوراثة .



### **س. أكتب الاسم أو المصطلح العلمي الذي تدل عليه كل عباره من العبارات التالية**

- (.....) ١. تتبع معين لمجموعة من هذه النيوكليوتيدات في أحد شريطي DNA .
- (.....) ٢. حمض DNA ملتف حول نفسه ويتকيس في شكل مكثف للغاية .
- (.....) ٣. وراثة الصفات مرتبطة ببعضها البعض وتقع على الكروموسوم نفسه .
- (.....) ٤. الجينات الموجودة على الكروموسوم نفسه .
- (.....) ٥. الجينات المرتبطة التي تورث مع بعضها كصفة واحدة .
- (.....) ٦. حالة تنظم فيها الكروموسومات المتماثلة في أزواج يظهر كل زوج منها مكون من أربع كروماتيدات . (.....)
٧. عملية يحدث فيها ارتباط الآليلات الموجودة على الكروماتيدات الداخلية المتجاورة يعقبه كسر هذه الكروماتيدات وانفصالها بعد تبادل المادة الوراثية بينها في موقع محددة تسمى الكيازما .
- (.....) ٨. مواضع محددة لارتباط الآليلات الموجودة على الكروماتيدات الداخلية المتجاورة للربيع .

### **س. ادرس الأشكال الآتية ثم أجب عن الأسئلة التي تلي كل منها :**

**أولاً : الشكل الذي أمامك يمثل:** ..... السهم (١) يشير إلى .....

**ثانياً : الشكل يمثل مجموعتان من كروموسومات ذبابة الفاكهة :**




- في أي مراحل الانقسام الميوزي يحدث العبور؟ .....

### **س: علل لما يلي تعليلاً علمياً مناسباً.**

١- الصفات التي درسها موندل في نبات البازلاء كانت تتوزع توزيع مستقل

لأنّ جين كل صفة محمولاً على كروموسوم مستقل



٢- أوضحت تجارب باتسون وبانت ومورجان أن الصفات يمكن أن تورث مع بعضها كمجموّعاً واحدة

نتيجة وجود الجينات المرتبطة

٣- ظهور تراكيب ظاهرية جديدة للصفات المرتبطة

افتراض مورجان سبب آخر للتراكيب الظاهرة الجديدة وهو ما يسمى بالارتباط الجزئي ويتبعه عملية العبور

٤- ظهور نباتات في تجربة باتسون وبانت تحمل صفات لم تكن موجودة لدى الآباء

نتيجة حدوث عبور أثناء الانقسام الميوزي في نباتات الجيل الأول وبالتالي حدث ارتباط جديد لأليلات الصفات الأبوية

**قارن بين كلاً مما يأتي :-**

صفة اللون البنفسجي للأزهار في البازلاء السكرية	صفة اللون الأحمر للأزهار في البازلاء السكرية	وجه المقارنة
		نوع أليل الصفة
جينات الصفتين في حالة مستقلة ومنفصلة	جينات الصفتين في حالة ارتباط تام	وجه المقارنة
		أمشاج الفرد الهجين لصفتين



**١) كروموسومات الإنسان [٢]، الصفات المرتبطة بالجنس [٣]، الصفات المحددة بالجنس والصفات المتأثرة بالجنس**  
**س: أكتب الاسم أو المصطلح العلمي الذي تدل عليه كل عباره من العبارات التالية**

١. أزواج من الكروموسومات ذات الشكل نفسه ولكنها تختلف عن الأزواج الأخرى في الخلية الجسمية . (.....)
٢. كروموسومان مختلفان يحددان ما إذا كان الأفراد ذكوراً وإناثاً . (.....)
٣. الكروموسوم المحدد الأساسي للجنس . (.....)
٤. الجينات محمولة على الكروموسومين X وY . (.....)
٥. الصفات التي تتحكم فيها الجينات المحمولة على الكروموسومين X وY . (.....)
٦. صفة مرتبطة بالجنس في الإنسان حيث لا يمكن التمييز بين الألوان بخاصة اللونين الأحمر والأخضر . (.....)
٧. خلل وراثي مرتبط بالكروموسوم الجنسي X حيث لا يتجلط الدم كالمعتاد ويستمر نزف الدم حتى في الجروح البسيطة . (.....)
٨. صفات وراثية لا تظهر إلا بوجود الهرمونات الجنسية وفي أحد الجنسين أو الآخر فحسب . (.....)
٩. صفات جيناتها على الكروموسومات الذاتية وتتأثر بالهرمونات الجنسية وتظهر في الجنسين بدرجات متفاوتة . (.....)

**س: علل لما يلي تعليلاً علمياً مناسباً.**

**١- يعتبر الكروموسوم ٧ في الثدييات ومنها الإنسان هو المحدد الأساسي للجنس**

**إذا كان الكروموسوم ٧ موجوداً كان الفرد ذكراً وإذا كان غائباً كان الفرد أنثى**

**٢- لا يورث الأب المصاب بعي الألوان والهيماوفيليا المرض لأناته الذكور**

**لأن الذكور (XY) يستقبلون كروموسوم (X) من أمهاthem لذا يرثون عي الألوان والهيماوفيليا وغيرها من الصفات المرتبطة بالكروموسوم الجنسي (X) من أمهاthem .**

**٣- مرض عي الألوان والهيماوفيليا لا يظهران بنفس الدرجة والشدة عند كل المصابين**

**يدل ذلك على تداخل عدد من الجينات المختلفة يقع معظمها على موقع مختلف من الكروموسوم الجنسي (X)**

**٤- معظم الصفات المحددة بالجنس لا تظهر على الأطفال**

**لكي تظهر الصفة المحددة بالجنس لا بد من وجود الهرمون الجنسي المناسب في الجسم ولأن الهرمونات الجنسية لا تنتج بكميات كبيرة إلا عندما يبلغ الفرد لذا فإن معظم هذه الصفات لا يظهر في الأطفال .**

**س: قارن بين كلاما يأتي ..**

وجه المقارنة	الクロموسومات الجنسية	الクロموسومات الذاتية
العدد في الخلايا الجسمية في الإنسان		
وجه المقارنة	الصفات المحددة بالجنس	الصفات المرتبطة بالجنس
نوع الكروموسوم الذي يحمل جينات الصفة		
ظهورها على الأطفال		
أمثلة في الإنسان		
وجه المقارنة	الصفات المتأثرة بالجنس	الصفات المحددة بالجنس
ظهورها في الجنسين		
أمثلة في الإنسان		
وجه المقارنة	صفة الصلع في الإنسان	صفة عي الألوان في الإنسان
نوع الصفة		



س، أجب عن الأسئلة التالية..

١. أكتب التراكيب الجينية لكل من الأفراد التالية :

التركيب الجيني	التركيب المظاهري	التركيب الجيني	التركيب المظاهري
Bb أو BB	ذكر أصلع	X <sup>H</sup> Y	ذكر طبيعي غير مصاب بالهيموفيليا
bb	ذكر عادي الشعر	X <sup>h</sup> Y	ذكر مصاب بالهيموفيليا
BB	أنثى خفيفة الشعر	X <sup>H</sup> X <sup>H</sup>	أنثى طبيعية غير مصابة بالهيموفيليا
Bb أو BB	أنثى عادية الشعر	X <sup>H</sup> X <sup>h</sup>	أنثى طبيعية حاملة للمرض
		X <sup>h</sup> X <sup>h</sup>	أنثى مصابة بالهيموفيليا

٢. تزوج رجل مصاب بعمى الألوان بامرأة سليمة ولكن حاملة لهذا الخلل الوراثي وهو مرض يسببه آليل متعدد مرتبط بالクロموسوم الجنسي X.


(أ) حدد التراكيب الجينية للأم والأب.

(ب) حدد النسب المئوية لتراثهما الظاهرية والجينية المحتملة.

(أ) التركيب الجيني للأب: الأب مصاب بعمى الألوان أي يحمل آليل المرض وبالتالي يكون تركيبه الجيني: X<sup>C</sup>Y

التركيب الجيني للأم: الأم ذات تركيب ظاهري سليم ولكنها حاملة للخلل الوراثي وبالتالي يكون تركيبه الجيني: X<sup>C</sup>X<sup>c</sup>

(ب) حساب النسب المئوية لتراثهما الظاهرية والجينية المحتملة للأولاد




٣. تزوج رجل أصلع بامرأة خفيفة الشعر والمطلوب:


(أ) حدد التراكيب الجينية للأم والأب. (ب) حدد النسب المئوية لتراثهما (الأبناء) الظاهرية المحتملة.

(أ) هناك آلilan للجين المسؤول عن الصلع (B) و (b). وألليل الصلع (B) سائد عند الرجال ومتعدد عند النساء والألليل السليم سائد عند النساء ومتعدد عند الرجال أي أن التركيب الجيني للأم لا يمكن أن يكون سوى (BB) في حين أن التركيب الجيني للأب قد يكون متشابه اللاقحة أي (BB) أو متباين التركيب (Bb)

(ب) حساب النسب المئوية لتراثهما الظاهرية والجينية المحتملة للأولاد

أولاً: في حالة إذا كان التركيب الجيني للأب متشابه اللاقحة:





٤. تزوج رجل وامرأة سليمان وأنجبا ولدًا مصابًا بمرض وراثي يُسمى الهيموفيليا (نزعه وراثية للنزف الدموي) الجين المسؤول عن هذا المرض متعدد (n) بالنسبة إلى الجين الطبيعي (N) ويحمله الكروموسوم الجنسي X.

- (أ) ما هو التركيب الجيني لكل من الآب والأب؟
- (ب) أعط تحليلًا جينيًّا مستعينًا بمربع بانت.
- (ج) حدد جنس الولد المريض.
- (د) لماذا لا يمكن أن تصاب الإناث بهذا المرض؟