

نماذج أجابة توقعات فاينال 11ع

فصل أول 2024 / 2023

عمل / أ . أحمد نصار

1-

بسط كلاً مما يلي مستخدماً قوانين الأسس:

$$(x^{\frac{1}{2}} \cdot x^{\frac{5}{6}}) \div x^{\frac{2}{3}}, \quad x > 0$$

$$(x^{\frac{1}{2}})(x^{\frac{5}{6}}) \div x^{\frac{2}{3}} = (x^{\frac{1}{2} + \frac{5}{6}}) \div x^{\frac{2}{3}} = (x^{\frac{4}{3}}) \div x^{\frac{2}{3}} = x^{\frac{4}{3} - \frac{2}{3}} = x^{\frac{2}{3}}$$

2-

$$\sqrt{5x+4} - 7 = 0$$

أوجد مجموعة حل كل من المعادلات التالية:

$$\begin{aligned} \sqrt{5x+4} - 7 &= 0 \\ \sqrt{5x+4} &= 0 + 7 \\ \sqrt{5x+4} &= 7 \end{aligned}$$

1 (أفصل الجذر)

2 (بما أن دليل الجذر زوجي لابد أن يكون المجذور غير سالب)

$$5x + 4 \geq 0 \Rightarrow 5x \geq -4 \Rightarrow x \geq \frac{-4}{5}$$

$$x \in \left[\frac{-4}{5}, \infty \right)$$

ارفع طرفي المعادلة إلى القوة 2

$$\begin{aligned} (\sqrt{5x+4})^2 &= 7^2 \\ 5x + 4 &= 49 \\ 5x &= 49 - 4 = 45 \\ x &= 9 \end{aligned}$$

مجموعة الحل = { 9 }

$$9 \in \left[\frac{-4}{5}, \infty \right)$$

3-

أوجد مجموعة الحل:

$$2(x+3)^{\frac{3}{2}} = 54$$

$$2(x+3)^{\frac{3}{2}} = 54$$

$$(x+3)^{\frac{3}{2}} = 27$$

$$\left((x+3)^{\frac{3}{2}} \right)^{\frac{2}{3}} = (27)^{\frac{2}{3}}$$

$$x+3 = \sqrt[3]{27^2}$$

$$x+3 = \sqrt[3]{(3^3)^2} = \sqrt[3]{3^6}$$

$$x+3 = 3^2 = 9$$

$$\therefore x = 9 - 3$$

$$\therefore x = 6 \in [-3, \infty)$$

بالقسمة على 2

ارفع طرفي المعادلة لأس $\frac{2}{3}$

$$\begin{aligned} x+3 &\geq 0 \\ x &\geq -3 \\ x &\in [-3, \infty) \end{aligned}$$

مجموعة الحل = {6}

4-

أوجد مجال كل دالة مما يلي:

$$f_3(x) = \frac{\sqrt{5-4x}}{x^2+4}$$

$$b(x) = \sqrt{5-4x} \quad a(x) = x^2+4$$

لتفرض أن

فيكون

الدالة a دالة كثيرة الحدود ، مجال الدالة a هو مجموعة الأعداد الحقيقية \mathbb{R}

الدالة b هي دالة جذرية دليلها زوجي ، المجال هو قيم x التي تجعل المجذور صفر أو عدد موجب

$$5-4x \geq 0 \implies -4x \geq -5 \implies x \leq \frac{5}{4}$$

$$\left(-\infty, \frac{5}{4}\right]$$

أي أن مجال الدالة b هو

$$x^2+4=0 \implies x^2=-4$$

لا توجد قيم تجعل المقام 0

توجد أصفار المقام

$$\mathbb{R} \cap \left(-\infty, \frac{5}{4}\right] = \left(-\infty, \frac{5}{4}\right] =$$

مجال f_3

5-

حل كلاً من المعادلات التالية:

$$(x + 5)^{\frac{2}{3}} = 4$$

$$(x + 5)^{\frac{2}{3}} = 4$$

$$\left((x + 5)^{\frac{2}{3}} \right)^{\frac{3}{2}} = (4)^{\frac{3}{2}}$$

$$|x + 5| = \sqrt{4^3}$$

$$|x + 5| = 8$$

$$\therefore x + 5 = 8 \quad \text{أو} \quad x + 5 = -8$$

$$\therefore x = 3 \quad \quad \quad \therefore x = -13$$

مجموعة الحل = { 3 , -13 }

6-

كل نقطة مما يلي تقع على قطع مكافئ رأسه نقطة الأصل.

اكتب معادلة تربيعية لهذا القطع المكافئ واذكر ما إذا كان بيانه مفتوحاً إلى أعلى أم إلى أسفل.

a $E(4, 2)$

b $D(1, -5)$

a نعوض بالنقطة $E(4,2)$

$$y = ax^2$$

$$2 = a(4)^2 \Rightarrow a = \frac{2}{4^2} = \frac{1}{8}$$

$$y = \frac{1}{8}x^2 \quad \frac{1}{8} > 0$$

القطع المكافئ مفتوح لأعلى

b نعوض بالنقطة $D(1,-5)$

$$y = ax^2$$

$$-5 = a(1)^2 \Rightarrow a = -5$$

$$y = -5x^2 \quad -5 < 0$$

القطع المكافئ مفتوح لأسفل

7-

$$\sqrt{5x-1} + 3 = x$$

أوجد مجموعة الحل:

$$\begin{aligned}\sqrt{5x-1} + 3 &= x \\ \sqrt{5x-1} &= x-3\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}5x-1 &\geq 0, & x-3 &\geq 0 \\ x &\geq \frac{1}{5}, & x &\geq 3 \\ x &\in [3, \infty)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}(\sqrt{5x-1})^2 &= (x-3)^2 \\ 5x-1 &= x^2-6x+9 \\ x^2-6x+9-5x+1 &= 0 \\ x^2-11x+10 &= 0 \\ (x-10)(x-1) &= 0 \\ x-10=0 \text{ أو } x-1=0 \\ x=10 \in [3, \infty) & \quad x=1 \notin [3, \infty)\end{aligned}$$

1) افصل الجذر


2) بما أن دليل الجذر زوجي لابد أن يكون المجدور غير سالب، والطرف الأيسر غير سالب



ارفع طرفي المعادلة إلى القوة 2

مجموعة الحل = {10}

8-



أوجد معادلة القطع المكافئ في الرسم المقابل.

$$y = a(x-h)^2 + k, a \neq 0, h, k \in R$$

$$y = a(x-2)^2 + 4$$

$$h=2, k=4$$

$$3 = a(3-2)^2 + 4$$

$$x=3, y=3$$

$$3 = a \times 1 + 4 \Rightarrow 3 - 4 = a \Rightarrow a = -1$$

$$y = -1(x-2)^2 + 4$$

9-

$$\sqrt{8x} - 2\sqrt{4x-16} = 0$$

أوجد مجموعة الحل لكل معادلة:

$$\begin{aligned}\sqrt{8x} - 2\sqrt{4x-16} &= 0 \\ \sqrt{8x} &= 2\sqrt{4x-16}\end{aligned}$$

$$8x \geq 0, 4x - 16 \geq 0$$

$$x \geq 0, x \geq 4$$

$$x \in [4, \infty)$$

$$(\sqrt{8x})^2 = (2\sqrt{4x-16})^2$$

$$8x = 4(4x-16)$$

$$8x - 16x = -64$$

$$-8x = -64$$

$$x = \frac{-64}{-8}$$

$$x = 8$$

$$x = 8 \in [4, \infty)$$

مجموعة الحل = {8}

1) افصل الجذر

2) بما أن دليل الجذر زوجي لا بد أن يكون المحذور غير سالب



ارفع طرفي المعادلة إلى القوة 2

10-

حل كلاً من المعادلات التالية:

$$\left(\frac{2}{3}\right)^x = \frac{81}{16}$$

$$\left(\frac{2}{3}\right)^x = \left(\frac{81}{16}\right)$$

$$\left(\frac{2}{3}\right)^x = \left(\frac{3^4}{2^4}\right)$$

$$\left(\frac{2}{3}\right)^x = \left(\frac{3}{2}\right)^4$$

$$\left(\frac{2}{3}\right)^x = \left(\frac{2}{3}\right)^{-4}$$

$$x = -4$$

مجموعة الحل = {-4}

11-

بسّط كلاً مما يلي (دون استخدام الآلة الحاسبة):

$$\left(\frac{\sqrt{9t}}{\sqrt[3]{27t^2}}\right)^{-12}, t > 0$$


$$\left(\frac{\sqrt{9t}}{\sqrt[3]{27t^2}}\right)^{-12}, t > 0$$

$$\left(\frac{(9t)^{\frac{1}{2}}}{(27t^2)^{\frac{1}{3}}}\right)^{-12} = \left(\frac{(27t^2)^{\frac{1}{3}}}{(9t)^{\frac{1}{2}}}\right)^{12} = \frac{(27t^2)^{\frac{1}{3} \times 12}}{(9t)^{\frac{1}{2} \times 12}} =$$

$$\frac{(27t^2)^4}{(9t)^6} = \frac{(3^3 t^2)^4}{(3^2 t)^6} = \frac{3^{12} t^8}{3^{12} t^6} = t^2$$

12-

ارسم منحنى الدالة: $y = (x + 3)^2 + 1$.



$$y = a(x - h)^2 + k, a \neq 0, h, k \in R$$

$$y = (x + 3)^2 + 1$$

$$h = -3, k = 1$$

رأس المنحنى (-3, 1)

معادلة محور التماثل

$$x = h$$

$$x = -3$$

$$a = 1 > 0$$

فتحة المنحنى لأعلى

نوجد نقطة اخرى تنتمي لمنحنى الدالة

$$y = (-2 + 3)^2 + 1 = 2 \quad \text{عندما } x = -2$$

(-2, 2) تنتمي لمنحنى الدالة

صورة النقطة (-2, 2) بالانعكاس

في محور التماثل $x = -3$

$$(-4, 2)$$

13-


بسط كلاً من التعبيرات الجذرية التالية:

$$\left[(\sqrt{x^3 y^3})^{\frac{1}{3}} \right]^{-1} \quad x, y \in \mathbb{Q}^+$$

$$\begin{aligned} \left[(\sqrt{x^3 y^3})^{\frac{1}{3}} \right]^{-1} &= \left[(\sqrt{(xy)^3})^{\frac{1}{3}} \right]^{-1} = \\ \left[\left(((xy)^3)^{\frac{1}{2}} \right)^{\frac{1}{3}} \right]^{-1} &= \left[(xy)^{3 \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{3}} \right]^{-1} = \left[(xy)^{\frac{1}{2}} \right]^{-1} = \\ [(xy)^{\frac{1}{2}}]^{-1} &= \frac{1}{(xy)^{\frac{1}{2}}} = \frac{1}{\sqrt{xy}} = \frac{\sqrt{xy}}{xy} \end{aligned}$$

14-

ارسم منحنى الدالة: $y = -0.5(x-2)^2 + 3$ مستخدماً خواص القطوع المكافئة.



15-

حدّد مجال كلّ من الدوال التالية:

$$u(x) = \frac{\sqrt{3+4x}-3}{25-9x^2}$$

لنفرض أن

$$u(x) = \frac{\sqrt{3+4x}-3}{25-9x^2} \quad a(x) = \sqrt{3+4x} \quad b(x) = 3 \quad c(x) = 25-9x^2$$

فيكون

$$u(x) = \frac{a(x) - b(x)}{c(x)}$$

(1) إيجاد مجال دالة البسط

$$3 + 4x \geq 0 \Rightarrow x \geq \frac{-3}{4}$$

الدالة b دالة ثابتة ، مجال الدالة b هو مجموعة الأعداد الحقيقية \mathbb{R}

مجال دالة البسط هو:

$$\mathbb{R} \cap \left[-\frac{3}{4}, \infty \right) = \left[-\frac{3}{4}, \infty \right)$$

(2) إيجاد مجال دالة المقام

الدالة C دالة كثيرة الحدود ، مجال الدالة C هو مجموعة الأعداد الحقيقية \mathbb{R}

(3) أصفار دالة المقام

$$25 - 9x^2 = 0 \Rightarrow (5 - 3x)(5 + 3x) = 0$$

أما $5 - 3x = 0 \Rightarrow x = \frac{5}{3}$ أو $5 + 3x = 0 \Rightarrow x = -\frac{5}{3}$

أي أن مجال الدالة u هو :

مجال البسط \cap مجال المقام / أصفار المقام

$$\left(\left[-\frac{3}{4}, \infty \right) \cap \mathbb{R} \right) \setminus \left\{ \frac{5}{3}, -\frac{5}{3} \right\} = \left[-\frac{3}{4}, \infty \right) - \left\{ \frac{5}{3} \right\}$$

16-

أوجد مجموعة الحل لكل معادلة:

$$\sqrt{x-7} + \sqrt{3x-21} = 0$$

$$\sqrt{x-7} + \sqrt{3x-21} = 0$$

$$\sqrt{x-7} = -\sqrt{3x-21}$$

$$x-7=0 \quad \text{و} \quad 3x-21=0$$

$$x=7 \quad 3x=21$$

$$\text{و} \quad x=7$$

مجموعة الحل = {7}

(1) أفصل الجذران

(2) يجب أن يكون كلا الطرفين = صفر

17-

حل كلاً من المعادلات التالية: $2(2x + 4)^{\frac{3}{4}} = 16$

$$2(2x + 4)^{\frac{3}{4}} = 16$$

$$(2x + 4)^{\frac{3}{4}} = \frac{16}{2} = 8$$

$$\left((2x + 4)^{\frac{3}{4}} \right)^{\frac{4}{3}} = (8)^{\frac{4}{3}}$$

$$2x + 4 = 16$$

$$\therefore 2x = 16 - 4 = 12$$

$$\therefore x = 6$$

$$\therefore 6 \in [-2, \infty)$$

مجموعة الحل = {6}

18-

حدّد مجال كلّ من الدوال التالية: $v(x) = \frac{3}{x+1} - \frac{2}{x^2-1}$

نفرض أن : $v(x) = \frac{3}{x+1} - \frac{2}{x^2-1}$

فيكون : $d(x) = \frac{3}{x+1}$ $f(x) = \frac{2}{x^2-1}$

إيجاد مجال الدالة d

دالة نسبية d

مجموعة أصفار المقام $x+1=0 \Rightarrow x=-1$

مجال الدالة d هو $R/\{-1\}$

إيجاد مجال الدالة f

دالة نسبية f

مجموعة أصفار المقام $x^2-1=0 \Rightarrow (x-1)(x+1)=0$

مجال الدالة f هو $R/\{1, -1\}$

إيجاد مجال الدالة v

مجال الدالة v هو $(R/\{-1\}) \cap (R/\{1, -1\}) = (R/\{1, -1\})$

19-

حل كلاً من المعادلات التالية: $\sqrt{3-4x} - 2 = 0$

$$\begin{aligned} \sqrt{3-4x} - 2 &= 0 \\ \sqrt{3-4x} &= 2 \\ (\sqrt{3-4x})^2 &= (2)^2 && 3-4x \geq 0, -4x \geq -3 \\ 3-4x &= 4 && x \leq \frac{3}{4} \quad \therefore x \in \left(-\infty, \frac{3}{4}\right] \\ -4x &= 4-3 \\ -4x &= 1 \\ x &= -\frac{1}{4} \\ x &= -\frac{1}{4} \in \left(-\infty, \frac{3}{4}\right] \end{aligned}$$

مجموعة الحل = $\{-0.25\}$

20-

أوجد مجال كل دالة مما يلي: $h(x) = \frac{\sqrt[3]{1+x}}{x^2-1}$

$b(x) = \sqrt[3]{1+x}$ $a(x) = x^2 - 1$ **لنفرض أن**

$h(x) = \frac{b(x)}{a(x)}$ **فيكون**

الدالة a دالة كثيرة الحدود ، مجال الدالة a هو مجموعة الأعداد الحقيقية \mathbb{R}

الدالة b هي دالة جذرية دليلها فردي ، مجال الدالة b هو مجموعة الأعداد الحقيقية \mathbb{R}

$x^2 - 1 = 0$ $(x-1)(x+1) = 0$ **نوجد أصفار المقام**

إما $x-1=0$ **أو** $x+1=0$

$x=1$ $x=-1$

$(\mathbb{R} \cap \mathbb{R}) - \{\pm 1\} = \mathbb{R} - \{\pm 1\}$ **مجال h =**

21-

$$x^2 - 7x - 3 \leq 5$$

الحل:

$$x^2 - 7x - 8 \leq 0$$

$$x^2 - 7x - 8 = 0 \text{ المعادلة المناظرة}$$

$$(x - 8)(x + 1) = 0$$

$$x - 8 = 0 \Rightarrow x = 8$$

أو

$$x + 1 = 0 \Rightarrow x = -1$$

للبحث عن قيم x التي تحقق $x^2 - 7x - 8 \leq 0$ نتبع التالي:

$$x - 8 < 0 \Rightarrow x < 8 \quad \left| \quad x + 1 < 0 \Rightarrow x < -1$$

$$x - 8 > 0 \Rightarrow x > 8 \quad \left| \quad x + 1 > 0 \Rightarrow x > -1$$

نكون الجدول:

x	$-\infty$	-1	8	$+\infty$	
$x - 8$	-	-	0	+	
$x + 1$	-	0	+	+	
$(x - 8)(x + 1)$	+	0	-	0	+

يبين الجدول أن $(x - 8)(x + 1) \leq 0$ لكل قيم x حيث $-1 \leq x \leq 8$

مجموعة الحل = $[-1, 8]$

22-

أوجد معكوس الدالة:

$$y = \sqrt[5]{x+3}$$

الحل:

$$x = \sqrt[5]{y+3}$$

عكس المتغيرين x, y

$$x = (y + 3)^{\frac{1}{5}}$$

حل بالنسبة للمتغير y

$$x^5 = y + 3$$

$$y = x^5 - 3$$

23-

الحل:

$$\frac{2x+6}{x+2} \geq 0$$

$$2x+6=0 \rightarrow x=-3$$

أصفار البسط :

$$x+2=0 \rightarrow x=-2$$

أصفار المقام :

نبحث عن قيم x التي تحقق : $\frac{2x+6}{x+2} \geq 0$ نتبع التالي :

$$2x+6 < 0 \rightarrow x < -3$$

$$x+2 < 0 \rightarrow x < -2$$

$$2x+6 > 0 \rightarrow x > -3$$

$$x+2 > 0 \rightarrow x > -2$$

نكون الجدول :

x	$-\infty$	-3	-2	∞
$2x+6$	-	0	+	+
$x+2$	-	-	0	+
$\frac{2x+6}{x+2}$	+	0	-	+

$$(-\infty, -3] \cup (-2, \infty) = \text{ح.م.}$$

$$\mathbb{R} / (-3, -2] =$$

24-

اكتب دالة كثيرة حدود حيث أصفارها: 3, 3, -2 في الصورة العامة.

الحل:

∴ أصفار الدالة هي:

$$\begin{array}{ccc} -2 & , & 3 & , & 3 \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \end{array}$$

∴ عوامل كثيرة الحدود هي: $(x - (-2)), (x - 3), (x - 3)$

$$f(x) = (x+2)(x-3)(x-3)$$

$$= (x+2)(x^2 - 6x + 9)$$

اضرب $(x-3)(x-3)$

$$= x(x^2 - 6x + 9) + 2(x^2 - 6x + 9)$$

خاصية التوزيع

$$= x^3 - 6x^2 + 9x + 2x^2 - 12x + 18$$

$$= x^3 - 4x^2 - 3x + 18$$

بسّط

∴ الدالة هي:

$$f(x) = x^3 - 4x^2 - 3x + 18$$

25-

أوجد مجموعة حل المتباينة :

$$(x - 3)(2x + 5) > 0$$

الحل :
المعادلة المناظرة :

$$(x - 3)(2x + 5) = 0$$

$$\therefore x = 3 \quad \text{أو} \quad x = -\frac{5}{2}$$

للبحث عن قيم x التي تحقق :

نتبع الآتي : $(x - 3)(2x + 5) > 0$

$$\begin{array}{l|l} x - 3 < 0 \rightarrow x < 3 & 2x + 5 < 0 \rightarrow x < -\frac{5}{2} \\ x - 3 > 0 \rightarrow x > 3 & 2x + 5 > 0 \rightarrow x > -\frac{5}{2} \end{array}$$

نكون الجدول :

x	$-\infty$	$-\frac{5}{2}$	3	∞
$x - 3$	-	-	0	+
$2x + 5$	-	0	+	+
$(2x + 5)(x - 3)$	+	0	-	+

من الجدول :

$$(x - 3)(2x + 5) > 0$$

$$x > 3 \quad \text{أو} \quad x < -\frac{5}{2} \quad \text{لكل قيم } x \text{ حيث}$$

$$\therefore \text{مجموعة الحل} = (-\infty, -\frac{5}{2}) \cup (3, \infty)$$

$$\text{أو} \quad R / \left[-\frac{5}{2}, 3 \right]$$

26-

حلّ كثيرة الحدود: $2x^3 + 10x^2 + 12x$ إلى عوامل ثم تحقق.

الحل:

$$2x^3 + 10x^2 + 12x = 2x(x^2 + 5x + 6)$$

$2x$ عامل مشترك

$$= 2x(x + 2)(x + 3)$$

حلّ $x^2 + 5x + 6$ إلى عوامل

$$2x(x + 2)(x + 3) = 2x(x^2 + 5x + 6) : \text{تحقق}$$

اضرب $(x + 2)$, $(x + 3)$

$$= 2x^3 + 10x^2 + 12x \quad \checkmark$$

27-

أوجد مجموعة حل المتباينة :

$$-x^2 + 5x - 6 > 0$$

بالضرب في -1

الحل :

$$x^2 - 5x + 6 < 0$$

$$x^2 - 5x + 6 = 0$$

$$(x - 2)(x - 3) = 0$$

$$x = 2 \quad \text{أو} \quad x = 3$$

$$\begin{array}{l} (x - 3) < 0 \rightarrow x < 3 \\ (x - 3) > 0 \rightarrow x > 3 \end{array} \quad \left| \begin{array}{l} (x - 2) < 0 \rightarrow x < 2 \\ (x - 2) > 0 \rightarrow x > 2 \end{array} \right.$$

x	$-\infty$	2	3	∞
$x - 2$	-	0	+	+
$x - 3$	-	-	0	+
$(x - 2)(x - 3)$	+	-	-	+

مجموعة الحل = (2,3)

28-

الحل:

$$\frac{x^2 - 5x + 3}{x + 4} < 3$$

$$\frac{x^2 - 5x + 3}{x + 4} - 3 < 0$$

$$\frac{x^2 - 5x + 3 - 3x - 12}{x + 4} < 0$$

مقام مشترك

$$\frac{x^2 - 8x - 9}{x + 4} < 0$$

التبسيط

$$\frac{(x + 1)(x - 9)}{(x + 4)} < 0$$

حلل البسط

$$(x + 1)(x - 9) = 0$$

أصفار البسط:

$$x = -1 \text{ أو } x = 9$$

$$x + 4 = 0 \Rightarrow x = -4$$

أصفار المقام:

لايجاد قيم x التي تحقق: $\frac{(x + 1)(x - 9)}{x + 4} < 0$ نتبع التالي:

$$\begin{array}{|l} x + 4 < 0 \Rightarrow x < -4 \\ x + 4 > 0 \Rightarrow x > -4 \end{array} \quad \left| \quad \begin{array}{|l} x - 9 < 0 \Rightarrow x < 9 \\ x - 9 > 0 \Rightarrow x > 9 \end{array} \quad \left| \quad \begin{array}{|l} x + 1 < 0 \Rightarrow x < -1 \\ x + 1 > 0 \Rightarrow x > -1 \end{array} \right.$$

نكوّن الجدول:

x	$-\infty$	-4	-1	9	$+\infty$		
$x + 1$	-	-	0	+	+		
$x - 9$	-	-	-	0	+		
$x + 4$	-	0	+	+	+		
$\frac{(x - 1)(x - 9)}{x + 4}$	-	غير معرفة	+	0	-	0	+

$$(-\infty, -4) \cup (-1, 9) = \text{مجموعة حل المتباينة}$$

29-

أوجد مجال كل دالة مما يلي:

$$g(x) = \sqrt{-x^2 + 4x - 3}$$

الحل:

$$-x^2 + 4x - 3 \geq 0$$

$$-x^2 + 4x - 3 = 0$$

$$(-x + 1)(x - 3) = 0$$

$$x = 1 \text{ أو } x = 3$$

مجال الدالة g هو مجموعة الأعداد الحقيقية التي تحقق الشرط

المعادلة المناظرة

تحليل إلى عوامل

الأصفار

لايجاد قيم x التي تحقق: $(-x + 1)(x - 3) \geq 0$ نتبع التالي:

$$-x + 1 < 0 \Rightarrow x > 1$$

$$-x + 1 > 0 \Rightarrow x < 1$$

$$x - 3 < 0 \Rightarrow x < 3$$

$$x - 3 > 0 \Rightarrow x > 3$$

نكُون الجدول:

x	$-\infty$	1	3	$+\infty$
$-x + 1$	+	0	-	-
$x - 3$	-	-	0	+
$(-x + 1)(x - 3)$	-	0	+	0

(حل آخر وهو بضرب المتباينه في -1)

مجال الدالة g هو: $[1, 3]$

30-

بين ما إذا كانت كل دالة مما يلي زوجية أو فردية أو ليست زوجية وليست فردية.

$$y = (x + 2)^2$$

$$y = (x + 2)^2$$

بفرض أن $y = v(x)$

$$v(-x) = (-x + 2)^2 \neq (x + 2)^2$$

$$\forall x, -x \in \mathbb{R}$$

$$v(-x) \neq v(x)$$

∴ الدالة ليست زوجية:

$$v(-x) \neq -(x + 2)^2$$

$$v(-x) \neq -v(x)$$

∴ الدالة ليست فردية

∴ الدالة ليست زوجية وليست فردية

31-

$$\frac{x^2 - 5x + 6}{x - 3} > 0$$

أوجد مجموعة حل المتباينة

الحل:

$$x^2 - 5x + 6 = (x - 2)(x - 3)$$

تحليل البسط:

$$\frac{(x - 2)(x - 3)}{(x - 3)} > 0$$

تكتب المتباينة:

$$x - 3 = 0 \Rightarrow x = 3$$

قبل التبسيط نحدد أصفار المقام:

$$\frac{(x - 2)(x - 3)}{(x - 3)} > 0 \quad x \neq 3$$

نبسط المتباينة:

$$x - 2 > 0 \Rightarrow x > 2$$



القيمة $x = 3$ غير مقبولة لأنها صفر المقام

$$(2, \infty) / \{3\} =$$

$$(2, 3) \cup (3, \infty) =$$

32-

أوجد معكوس الدالة: $y = 2x^4$

الحل:

$$y = 2x^4$$

$$x = 2y^4$$

$$\frac{x}{2} = y^4$$

$$\left(\frac{x}{2}\right)^{\frac{1}{4}} = (y^4)^{\frac{1}{4}} \Rightarrow \left(\frac{x}{2}\right)^{\frac{1}{4}} = |y|, \quad x \geq 0$$

$$\pm \left(\frac{x}{2}\right)^{\frac{1}{4}} = y$$

لاحظ أن $y \geq 0$

اعكس المتغيرين x, y

حل بالنسبة إلى المتغير y

أوجد الجذر الرابع لكل من الطرفين

$$y = \pm \sqrt[4]{\frac{x}{2}} \quad \text{معكوس } y = 2x^4 \text{ هو}$$

33-

حل آخر ضرب المتباينة في -1

أوجد مجموعة حل المتباينة

$$\frac{3x - 5}{-2x + 3} \geq 0$$

أصفار البسط

$$3x - 5 = 0 \Rightarrow 3x = 5 \Rightarrow x = \frac{5}{3}$$

أصفار المقام

$$-2x + 3 = 0 \Rightarrow -2x = -3 \Rightarrow x = \frac{3}{2}$$

للبحث عن قيم X التي تحقق

$$\frac{3x - 5}{-2x + 3} \geq 0$$

$$3x - 5 < 0 \Rightarrow x < \frac{5}{3}$$

$$3x - 5 > 0 \Rightarrow x > \frac{5}{3}$$

$$-2x + 3 < 0 \Rightarrow x > \frac{3}{2}$$

$$-2x + 3 > 0 \Rightarrow x < \frac{3}{2}$$

نكون جدول

X	$-\infty$	$\frac{3}{2}$	$\frac{5}{3}$	∞
3X-5	-	-	+	+
-2X+3	+	+	-	-
(3X-5)/(-2X+3)	-	غير معرفة	+	-

مجموعة الحل =

$$\left[\frac{3}{2}, \frac{5}{3} \right]$$

34-

$$\frac{x^2+x-12}{x^2-4x+4} > 0 \quad \frac{(x-3)(x+4)}{(x-2)^2} > 0$$

$$(x-3)(x+4) = 0 \Rightarrow x = 3, x = -4$$

$$(x-2)^2 = 0 \Rightarrow x - 2 = 0 \Rightarrow x = 2$$

أصفار البسط

أصفار المقام

$$\begin{array}{|l|l|l|} \hline x-3 > 0, x > 3 & x+4 > 0, x > -4 & (x-2)^2 \geq 0 \\ \hline x-3 < 0, x < 3 & x+4 < 0, x < -4 & \\ \hline \end{array}$$

x	$-\infty$	-4	2	3	∞
$x-3$	-	-	-	0	+
$x+4$	-	0	+	+	+
$(x+2)^2$	+	+	0	+	+
$\frac{(x-3)(x+4)}{(x-2)^2}$	+	0	-	-	+

ح.م = $(-\infty, -4) \cup (3, \infty)$

غير معرف

35-

$$\frac{x^2-1}{x^2+1} \leq 0 \Rightarrow \frac{(x-1)(x+1)}{x^2+1} \leq 0$$

$$(x-1)(x+1) = 0 \Rightarrow x=1, x=-1$$

أصفار البسط

$$x^2 + 1 \neq 0$$

أصفار المقام : لا يوجد

$$x-1 > 0, x > 1$$

$$x+1 > 0, x > -1$$

$$x^2 + 1 > 0$$

$$x-1 < 0, x < 1$$

$$x+1 < 0, x < -1$$

x	$-\infty$	-1	1	∞
$x-1$	-	-	0	+
$x+1$	-	0	+	+
x^2+1	+	+	+	+
$\frac{(x-1)(x+1)}{x^2+1}$	+	0	-	+

$$\text{ج.م} = [-1, 1]$$

36-

أوجد الناتج ما يلي في أبسط صورة بدون استخدام الآلة الحاسبة :

$$\begin{aligned} & \sqrt{18} + \sqrt{50} - \sqrt{72} \\ & \sqrt{18} + \sqrt{50} - \sqrt{72} \quad \text{الحل :} \\ & = \sqrt{9 \times 2} + \sqrt{25 \times 2} - \sqrt{36 \times 2} \\ & = \sqrt{3^2 \times 2} + \sqrt{5^2 \times 2} - \sqrt{6^2 \times 2} \\ & = 2\sqrt{2} \end{aligned}$$



37

$$\begin{aligned} \frac{\sqrt{2}-1}{3-\sqrt{2}} &= \frac{\sqrt{2}-1}{3-\sqrt{2}} \times \left(\frac{3+\sqrt{2}}{3+\sqrt{2}} \right) \\ &= \frac{3\sqrt{2} + (\sqrt{2} \times \sqrt{2}) - 3 - \sqrt{2}}{3^2 - (\sqrt{2})^2} \\ &= \frac{3\sqrt{2} + 2 - 3 - \sqrt{2}}{9 - 2} \\ &= \frac{2\sqrt{2} - 1}{7} \end{aligned}$$

$$5\sqrt{216x^2 + 23\sqrt{64x^4}}, x > 0 =$$

$$5\sqrt{216x^2 + 23 \times 8x^2} =$$

$$5\sqrt{216x^2 + 184x^2} =$$

$$5\sqrt{400x^2} = 5 \times 20 |x| = 100x$$

38

$$x^2 - x + 1 = \left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^2 - \left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right) + 1 = \frac{1+2\sqrt{5}+(\sqrt{5})^2}{4} - \frac{1+\sqrt{5}}{2} + 1$$

$$= \frac{3+\sqrt{5}}{2} - \frac{1+\sqrt{5}}{2} + 1 = \frac{3+\sqrt{5}-1-\sqrt{5}}{2} + 1 = 2$$

39

أوجد مجموعة حل المعادلة :

$$\log(x) + \log(x-3) = \log 4, \quad x \in (3, \infty)$$

الحل:

$$\log x(x-3) = \log 4$$

$$x(x-3) = 4$$

$$x^2 - 3x = 4$$

$$x^2 - 3x - 4 = 0$$

$$(x-4)(x+1) = 0$$

$$x = -1, x = 4$$

$$x = -1 \notin (3, \infty)$$

$$x = 4 \in (3, \infty)$$

∴ مجموعة حل المعادلة = {4}

40

أوجد مجموعة حل المعادلة

$$x^4 - 3x^3 + x^2 + 3x - 2 = 0$$

الحل: عوامل الحد الثابت (-2) : $\pm 1, \pm 2$

عوامل المعامل الرئيسي (1) : ± 1

الأصفار النسبية الممكنة : $\pm 1, \pm 2$

لتكن : $p(x) = x^4 - 3x^3 + x^2 + 3x - 2$

$$p(1) = (1)^4 - 3(1)^3 + (1)^2 + 3(1) - 2 = 0$$

∴ 1 صفر من أصفار الحدودية ، عامل من عوامل $P(x)$

$$p(-1) = (-1)^4 - 3(-1)^3 + (-1)^2 + 3(-1) - 2 = 0$$

∴ -1 صفر من أصفار الحدودية ، عامل من عوامل $P(x)$

نقسم : $p(x)$ على $(x + 1)(x - 1) = x^2 - 1$

نستخدم القسمة المطولة :

$$\begin{array}{r} x^2 - 3x + 2 \\ x^2 - 1 \overline{) x^4 - 3x^3 + x^2 + 3x - 2} \\ \underline{-x^4 \quad \pm x^2} \\ -3x^3 + 2x^2 + 3x - 2 \\ \underline{\pm 3x^3 \quad \mp 3x} \\ 2x^2 \quad - 2 \\ \underline{-2x^2 \quad \pm 2} \\ 0 \end{array}$$

نتج القسمة : $q(x) = x^2 - 3x + 2$

$$x^2 - 3x + 2 = 0 \implies (x - 1)(x - 2) = 0$$

$$x_1 = 1 \quad , \quad x_2 = 2$$

مجموعة حل المعادلة = $\{ 1, -1, 2 \}$

41

الحل : عوامل الحد الثابت (-2) : $\pm 1, \pm 2$

عوامل المعامل الرئيسي (1) : ± 1

الاصفار النسبية الممكنة : $\pm 1, \pm 2$

$$p(x) = x^3 + 2x^2 - x - 2$$

لتكن :

$$p(1) = (1)^3 + 2(1)^2 - 1 - 2 = 0$$

∴ 1 صفر من أصفار الحدودية ، $(x-1)$ عامل من عوامل $p(x)$

$$\begin{array}{r|rrrr} 1 & 1 & 2 & -1 & -2 \\ & & 1 & 3 & 2 \\ \hline & 1 & 3 & 2 & 0 \end{array}$$

ناتج القسمة : $q(x) = x^2 + 3x + 2$

نحل المعادلة : $x^2 + 3x + 2 = 0$

$$x_1 = -1 \quad , \quad x_2 = -2$$

∴ حلول للمعادلة $x^3 + 2x^2 - x - 2 = 0$ هي $x_1 = -1$ ، $x_2 = -2$ ، $x_3 = 1$

42

أوجد مجموعة حل المعادلة التالية :

$$\log_2 (x-1) - \log_2 (x+3) = \log_2 \left(\frac{1}{x} \right) : x \in (1, \infty)$$

الحل:

$$\log_2 \left(\frac{x-1}{x+3} \right) = \log_2 \left(\frac{1}{x} \right)$$

$$\frac{x-1}{x+3} = \frac{1}{x}$$

$$x(x-1) = x+3$$

$$x^2 - 2x - 3 = 0$$

$$(x-3)(x+1) = 0$$

$$x=3, x=-1$$

مرفوضة $(1, \infty) \notin -1$

$$3 \in (1, \infty)$$

$$\{3\} = \text{ح.م.}\therefore$$

43

أوجد حل

$$x^3 + 3x^2 - 4x - 12 = 0$$

الحل :

$$(x^3 + 3x^2) - (4x + 12) = 0$$

$$x^2(x + 3) - 4(x + 3) = 0$$

$$(x + 3)(x^2 - 4) = 0$$

$$(x + 3)(x - 2)(x + 2) = 0$$

$$(x + 3) = 0 \longrightarrow x = -3$$

$$(x - 2) = 0 \longrightarrow x = 2$$

$$(x + 2) = 0 \longrightarrow x = -2$$

44

باستخدام نظرية الباقي أثبت أن $(x+2)$ عامل من عوامل $x^3 - 3x^2 - 6x + 8$ ، ثم أوجد باقي العوامل

الحل:

$$f(x) = x^3 - 3x^2 - 6x + 8$$

$$f(-2) = (-2)^3 - 3(-2)^2 - 6(-2) + 8$$

$$= -8 - 12 + 12 + 8$$

$$= 0$$

∴ $(x+2)$ عامل من عوامل f

لإيجاد باقي العوامل نقسم $f(x)$ على $(x+2)$

$$\begin{array}{r|rrrr} -2 & 1 & -3 & -6 & 8 \\ & & -2 & 10 & -8 \\ \hline & 1 & -5 & 4 & 0 \end{array}$$

نتج القسمة : $x^2 - 5x + 4$ و الباقي صفر

$$x^2 - 5x + 4 = (x-4)(x-1)$$

∴ باقي العوامل $(x-4) \cdot (x-1)$

45

باستخدام نظريه الباقي اوجد باقي قسمه :

$$f(x) = x^3 + 15x - 9 \text{ على } (x-3)$$

ثم تحقق باستخدام القسمة التركيبية

الحل :

$$f(x) = x^3 + 15x - 9$$

$$f(3) = (3)^3 + 15(3) - 9$$

$$= 27 + 45 - 9 = 63$$

∴ باقي القسمة = 63

$$\begin{array}{r|rrrr} 3 & 1 & 0 & 15 & -9 \\ & & 3 & 9 & 72 \\ \hline & 1 & 3 & 24 & 63 \end{array}$$

الباقي = 63

46

حل

$$x^{\frac{2}{3}} = 25, \quad x > 0$$

الحل:

$$x^{\frac{2}{3}} = 25$$

$$\log x^{\frac{2}{3}} = \log 25$$

أخذ لوغاريتم الطرفين

$$\log x^{\frac{2}{3}} = \log 5^2$$

$$\frac{2}{3} \log x = 2 \log 5, \quad x > 0$$

خاصية القوى

$$\left(\frac{3}{2}\right) \frac{2}{3} \log x = \left(\frac{3}{2}\right) 2 \log 5$$

$$\log x = 3 \log 5$$

خاصية رفع القوى

$$\log x = \log 5^3$$

$$x = 5^3$$

$$x = 125 \in (0, \infty)$$

47

استخدم قاعدة تغيير الأساس لإيجاد قيمة $\log_3 15$ ثم حوّل $\log_3 15$ إلى لوغاريتم للأساس 2

الحل:

$$\log_b m = \frac{\log_c m}{\log_c b}$$

$$\log_3 15 = \frac{\log 15}{\log 3}$$

$$\approx 2.4650$$

استخدم قاعدة تغيير الأساس

استخدم الآلة الحاسبة

للتحويل إلى لوغاريتم للأساس 2:

$$\log_3 15 = \log_2 x$$

اكتب معادلة

$$2.4650 \approx \log_2 x$$

عوض عن $\log_3 15$ بـ 2.4650

$$2.4650 = \frac{\log x}{\log 2}$$

استخدم قاعدة تغيير الأساس

$$2.4650(\log 2) = \log x$$

الضرب النقطي

$$0.7420 \approx \log x$$

بسّط

$$x = 10^{0.7420}$$

اكتب في الصيغة الأسية

$$x \approx 5.5208$$

استخدم الآلة الحاسبة

$$\therefore \log_3 15 \approx \log_2 5.5208$$

48

$$\log_{x+1} 32 = 5, \quad x \in (0, \infty)$$

$$\frac{\log 32}{\log(x+1)} = 5$$

$$\log 32 = 5 \log(x+1)$$

$$\log 32 = \log(x+1)^5$$

$$32 = (x+1)^5$$

$$2^5 = (x+1)^5$$

$$x+1 = 2$$

$$x = 1$$

$$1 \in (0, \infty)$$

قاعدة تغيير الأساس

الضرب النطاقي

خاصية رفع القوى

∴ مجموعة حل المعادلة = {1}

49

$$\log(2x) + \log(x-3) = \log 8$$

$$\therefore \log(2x(x-3)) = \log 8$$

$$\therefore 2x(x-3) = 8$$

$$\therefore 2x^2 - 6x = 8$$

$$\therefore 2x^2 - 6x - 8 = 0$$

$$\text{بالتحليل} \quad x^2 - 3x - 4 = 0$$

$$(x-4)(x+1) = 0$$

$$x = 4 \in (3, \infty)$$

$$x = -1 \notin (3, \infty)$$


المجال ∴

$$2x > 0$$

$$x > 0$$

$$x-3 > 0$$

$$x > 3$$



المجال (3, ∞)

$$\{4\} = 2.5 \therefore$$

50

حل المعادلة :

$$\ln(4x-1) = 3$$

الحل :

توجد المجال :

$$4x-1 > 0 \rightarrow x > \frac{1}{4}$$

المجال هو $(\frac{1}{4}, \infty)$

$$\ln(4x-1) = 3$$

$$(4x-1) = e^3$$

$$4x = e^3 + 1$$

$$x = \frac{e^3 + 1}{4}$$

$$x \approx 5.27 \in [\frac{1}{4}, \infty)$$

حلا للمعادلة $x \approx 5.27$

51

حل المعادلة:

$$9e^{2x} - 3 = 24$$

الحل:

$$9e^{2x} - 3 + 3 = 24 + 3$$

$$9e^{2x} = 27$$

$$e^{2x} = \frac{27}{9}$$

$$e^{2x} = 3$$

$$\ln(e)^{2x} = \ln(3)$$

$$2x \ln e = \ln(3)$$

$$2x = \ln(3)$$

$$x = \frac{\ln(3)}{2}$$

حل المعادلة: $x \approx 0.549$

مثل بيانيا الدالة: $y_1 = 2^x$ ومنها مثل بيانيا الدالة: $y_2 = (2)^{x+3} - 2$

الحل:

الخطوة 1 : جدول قيم الدالة: $y_1 = f_1(x) = 2^x$

x	-3	-2	-1	0	1	2	3
$y_1 = 2^x$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	1	2	4	8

مثل بيانيا: $y_1 = 2^x$

الخطوة 2 :

لرسم بيان الدالة: $y_2 = (2)^{x+3} - 2$


حيث $k = -2$, $h = -3$

اسحب بيان دالة المرجع: $y_1 = 2^x$

ثلاث وحدات الى اليسار و وحدتين للأسفل

تعيين k, h

$$y_2 = (2)^{x+3} - 2$$



53

ارسم بيان الدالة :

$$y = \log_6(x + 2) - 3$$

مستخدماً دالة المرجع

الحل :

دالة المرجع هي : $y = \log_6 x$

نكون جدول لدالة المرجع :


x	$\log_6 x$	y
6	$\log_6 6 = 1$	1
1	$\log_6 1 = 0$	0
$\frac{1}{6}$	$\log_6 \frac{1}{6} = -1$	-1
$\frac{1}{36}$	$\log_6 \frac{1}{36} = -2$	-2

$\therefore h = -2$ (سالبة)

\therefore انسحاب أفقي جهة اليسار بمقدار وحدتين

$\therefore k = -3$ (سالبة)


\therefore انسحاب رأسي للأسفل بمقدار 3 وحدات



54

الحل : دالة المرجع $y = -\sqrt{x}$
 $h = 0, k = 2$
 ينتج بيان هذه الدالة من بيان الدالة $y = -\sqrt{x}$


و ذلك بعمل أزاحه لداله المرجع بمقدار 2 وحده الى أعلى ولا يوجد أزاحه افقيه.



$$x \geq 0; y \leq 2$$

المجال: $[0, \infty)$
 المدى: $(-\infty, 2]$

55



ارسم بيان الدالة $y = \frac{x-4}{2}$ ومعكوسها ثم اكتب معادلة المعكوس.

الحل:

نرسم بيان الدالة الأصلية وهي دالة خطية $y = \frac{x-4}{2}$

x	0	2	4
y	-2	-1	0

∴ تنتمي $(0, -2)$ ، $(2, -1)$ ، $(4, 0)$ لبيان الدالة y .

∴ تنتمي $(0, 4)$ ، $(-2, 0)$ لبيان معكوس الدالة y وهو خط مستقيم.

ارسم المستقيم المار بالنقطتين الجديدتين.

لكتابة معادلة هذا المستقيم:

الميل: $m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}, (x_2 \neq x_1)$

$$= \frac{4 - 0}{0 - (-2)} = 2$$


معادلة المستقيم المار بالنقطة $(0, 4)$ وميله 2 هي:

$$y - y_1 = m(x - x_1)$$

$$y - 4 = 2(x - 0)$$

$$y = 2x + 4$$

معادلة المعكوس هي: $y = 2x + 4$



طريقة أخرى لتيجاد معادلة المعكوس

تبدل المتغيرات (x, y)

$$y = \frac{x - 4}{2}$$

$$\therefore x = \frac{y - 4}{2}$$

$$2x = y - 4$$

$$2x + 4 = y$$


معادلة المعكوس هي $y = 2x + 4$

56

مَثَل بياثًا كل من: $y = 3^x$, $y = (\frac{1}{3})^x$ في نفس المستوى الإحداثي.
الحل:

الخطوة 1: اصنع جدول قيم.

الخطوة 2: مَثَل بياثًا الدالتين.



x	$y = 3^x$	$y = (\frac{1}{3})^x$
-2	0.111	9
-1	0.333	3
0	1	1
1	3	0.333
2	9	0.111
3	27	0.037

57

إذا كان $\vec{A} = \langle 2, 3 \rangle$, $\vec{B} = \langle -1, 2 \rangle$ فإوجد :

- (1) $2\vec{A} + 3\vec{B}$
- (2) $\vec{A} \cdot \vec{B}$
- (3) $\|\vec{A}\|$

الحل

$$\begin{aligned} (1) \quad 2\vec{A} + 3\vec{B} &= 2\langle 2, 3 \rangle + 3\langle -1, 2 \rangle \\ &= \langle 4, 6 \rangle + \langle -3, 6 \rangle \\ &= \langle 1, 12 \rangle \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (2) \quad \vec{A} \cdot \vec{B} &= x_A x_B + y_A y_B \\ &= (2)(-1) + (3)(2) \\ &= -2 + 6 \\ &= 4 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (3) \quad \|\vec{A}\| &= \sqrt{x_A^2 + y_A^2} \\ &= \sqrt{(2)^2 + (3)^2} \\ &= \sqrt{4 + 9} \\ &= \sqrt{13} \quad \text{units} \end{aligned}$$

58

(1) إذا كان $\vec{v} = \langle x, -3 \rangle$, $\vec{u} = \langle 2, 4 \rangle$ أوجد:

قيمة x بحيث يكون \vec{v} متعامد مع \vec{u}

الحل:

$$\therefore \vec{v} \perp \vec{u}$$

$$\therefore \vec{v} \cdot \vec{u} = 0$$

$$x_v \cdot x_u + y_v \cdot y_u = 0$$

$$(x) \cdot (2) + (-3) \cdot (4) = 0$$

$$2x + (-12) = 0$$

$$x = 6$$

(2) إذا كان المتجه $\vec{t} = \langle -1, -3 \rangle$ أوجد:

(i) طول المتجه \vec{t}

(ii) قياس الزاوية θ التي يصنعها المتجه \vec{t} مع الاتجاه الموجب لمحور السينات

الحل:

$$(i) \quad \|\vec{t}\| = \sqrt{(-1)^2 + (-3)^2} = \sqrt{10} \text{ units}$$

(ii) نفرض أن θ هو قياس الزاوية التي يصنعها \vec{t} مع الإتجاه الموجب

لمحور السينات وأن زاوية الإسناد α

$$\tan \alpha = \left| \frac{-3}{-1} \right| = 3$$

$$\therefore \alpha \approx 71^\circ 33' 54.18''$$

$$\therefore x < 0, y < 0 \quad \therefore \theta = 180^\circ + \alpha$$

$$\therefore \theta \approx 251^\circ 33' 54.18''$$

59

إذا كان: $\vec{A} = \langle -3, 4 \rangle$ ، $\vec{B} = \langle 0, 3 \rangle$

(1) أوجد $2\vec{A} - \vec{B}$

(2) أوجد الزاوية بين المتجهين \vec{A} ، \vec{B}

الحل:

$$\begin{aligned} (1) \quad 2\vec{A} - \vec{B} &= 2\langle -3, 4 \rangle - \langle 0, 3 \rangle \\ &= \langle -6, 8 \rangle - \langle 0, 3 \rangle \\ &= \langle -6, 5 \rangle \end{aligned}$$

$$(2) \quad \|\vec{A}\| = \sqrt{(-3)^2 + (4)^2} = 5 \text{ units}$$

$$\|\vec{B}\| = 3 \text{ units}$$

$$\begin{aligned} \cos(\vec{A}, \vec{B}) &= \frac{\vec{A} \cdot \vec{B}}{\|\vec{B}\| \|\vec{A}\|} \\ &= \frac{\langle -3, 4 \rangle \cdot \langle 0, 3 \rangle}{(5)(3)} \\ &= \frac{0 + 12}{15} \\ &= \frac{4}{5} \end{aligned}$$

$$\therefore m(\vec{A}, \vec{B}) = \cos^{-1}\left(\frac{4}{5}\right) \approx 36^\circ 52' 11''$$

60

$$\begin{aligned}
 \bar{K} &= \langle \overline{AB} \rangle + \langle \overline{CA} \rangle + \langle \overline{BC} \rangle + \langle \overline{AB} \rangle \\
 &= (\langle \overline{AB} \rangle + \langle \overline{CA} \rangle) + (\langle \overline{BC} \rangle + \langle \overline{AB} \rangle) \\
 &= (\langle \overline{CA} \rangle + \langle \overline{AB} \rangle) + (\langle \overline{AB} \rangle + \langle \overline{BC} \rangle) \\
 &= \langle \overline{CB} \rangle + \langle \overline{AC} \rangle \\
 &= \langle \overline{AC} \rangle + \langle \overline{CB} \rangle \\
 &= \langle \overline{AB} \rangle
 \end{aligned}$$

61

يبلغ عدد طلاب إحدى مدارس الكويت 700 طالب مرقمين من 1 إلى 700 ،
 أراد مدير المدرسة إرسال 5 طلاب لحضور ندوة حول حماية الحيوانات المهددة بالانقراض ،
 المطلوب سحب عينة عشوائية منتظمة حجمها 5 باستخدام جدول الأعداد
 العشوائية ابتداء من الصف الثاني والعشرون والعمود الثالث .

الحل :

$$\begin{aligned}
 \frac{\text{حجم المجتمع}}{\text{حجم العينة}} &= \text{طول الفترة} \\
 \frac{700}{5} &=
 \end{aligned}$$

$$140 =$$

باستخدام جدول الأعداد العشرية نختار أول عدد عشوائي مؤلف من 3 أرقام لجهة اليسار
 ابتداء من الصف الثاني والعشرون والعمود الثالث فإن أول عينة عشوائية تساوي 53

$$53 + 140 = 193$$

$$193 + 140 = 333$$

$$333 + 140 = 473$$

$$473 + 140 = 613$$

تتكون العينة العشوائية من الطلاب الذين ترقيمهم الأعداد التالية :

$$53 ، 193 ، 333 ، 473 ، 613$$

62

في نتيجة نهاية العام الدراسي نال أحد الطلاب على 15 درجة في مادة الرياضيات حيث المتوسط الحسابي للدرجات 13 والأتحراف المعياري 2.5 ، ونال أيضا على 13 درجة في مادة الكيمياء حيث المتوسط الحسابي للدرجات 11.5 والأتحراف المعياري 2.4 في أي المادتين كان الطالب أفضل؟

الحل:

لتحديد المادة التي كان فيها الطالب أفضل نحول الدرجات الفعلية إلى قيم معيارية: القيمة المعيارية للدرجة 15 في مادة الرياضيات:

$$z_1 = \frac{x - \bar{x}}{\sigma} = \frac{15 - 13}{2.5} = 0.8$$

القيمة المعيارية للدرجة 13 في مادة الكيمياء:

$$z_2 = \frac{x - \bar{x}}{\sigma} = \frac{13 - 11.5}{2.4} = 0.625$$

$$0.625 < 0.8 \therefore$$

∴ القيمة المعيارية للطالب في مادة الرياضيات أفضل من القيمة المعيارية في مادة الكيمياء

∴ أداء الطالب في مادة الرياضيات أفضل من أدائه في مادة الكيمياء

63

لدراسة الأداء الوظيفي و الكفاءة عند الموظفين في إحدى المؤسسات ، تم سحب عينة عشوائية طبقية مكونة من 80 فرداً من أصل 1600 موظف موزعين كما يبين الجدول التالي :

إداريون	تقنيون و فنييون	عمال و مستخدمون	المجموع
100	300	1200	1600

ما حجم كل عينة عشوائية بسيطة من كل طبقة ؟

الحل: كسر المعاينة = $\frac{\text{حجم العينة}}{\text{حجم المجتمع الاحصائي}} = \frac{80}{1600} = 0.05$

حجم العينة الطبقة = كسر المعاينة × حجم الطبقة المناظرة
حجم عينة الإداريين : $100 \times 0.05 = 5$

حجم عينة التقنيون و الفنييون : $300 \times 0.05 = 15$

حجم عينة عمال و مستخدمون : $1200 \times 0.05 = 60$

64

إذا كان المتوسط الحسابي لأرباح إحدى المؤسسات الصناعية 1250 دينار والانحراف المعياري 225 دينار والمنحنى التكراري لهذه الأرباح هو على شكل الجرس (توزيع طبيعي) (1) طبق القاعدة التجريبية (2) هل وصلت أرباح هذه المؤسسة إلى 2000 دينار؟

الحل :

$$\bar{x} = 1250 \quad , \quad \sigma = 225 \quad (1)$$

باستخدام القاعدة التجريبية نحصل على :

(a) حوالي 68% من الأرباح تقع على الفترة $[\bar{x} - \sigma , \bar{x} + \sigma]$
 $= [1250 - 225 , 1250 + 225] = [1025 , 1475]$

(b) حوالي 95% من الأرباح تقع على الفترة $[\bar{x} - 2\sigma , \bar{x} + 2\sigma]$
 $= [1250 - 450 , 1250 + 450] = [800 , 1700]$

(c) حوالي 99.7% من الأرباح تقع على الفترة $[\bar{x} - 3\sigma , \bar{x} + 3\sigma]$
 $= [1250 - 675 , 1250 + 675] = [575 , 1925]$

(2) نلاحظ أن المبلغ 2000 دينار يقع خارج الفترة الأخيرة $[575 , 1925]$ والتي تناظر 99.7% من الأرباح لذلك من غير المتوقع أن تكون أرباح هذه الشركة قد وصلت إلى المبلغ 2000 دينار

65


يعلن مصنع لإنتاج البطاريات المستخدمة في السيارات أن متوسط عمر البطارية من النوع (A) هو 60 شهرًا بانحراف معياري 10 أشهر. على افتراض أن المنحنى الممثل لتوزيع عمر البطاريات يقترب كثيرًا من التوزيع الطبيعي.

a طبق القاعدة التجريبية.

b أوجد النسبة المئوية للبطاريات من النوع (A) التي يزيد عمرها عن 50 شهرًا بفرض أن ما يعلنه المصنع صحيحًا.

c أوجد النسبة المئوية للبطاريات من النوع (A) والتي يقل عمرها عن 40 شهرًا بفرض أن ما يعلنه المصنع صحيحًا.

الحل:



a (1) حوالي 68% من البطاريات المصنعة عمرها يقع على الفترة:

$$[\bar{x} - \sigma, \bar{x} + \sigma] = [60 - 10, 60 + 10] = [50, 70]$$

(2) حوالي 95% من البطاريات المصنعة عمرها يقع على الفترة:

$$[\bar{x} - 2\sigma, \bar{x} + 2\sigma] = [60 - 20, 60 + 20] = [40, 80]$$

(3) حوالي 99.7% من البطاريات المصنعة عمرها

يقع على الفترة:

$$[\bar{x} - 3\sigma, \bar{x} + 3\sigma] = [60 - 30, 60 + 30] = [30, 90]$$

b بما أن المنحنى الممثل لتوزيع عمر البطاريات يقترب كثيرًا من التوزيع الطبيعي لذا من الرسم أعلاه نستنتج:

$$34\% + 34\% + 13.5\% + 2.5\% = 84\%$$

أي أن 84% من هذه البطاريات يزيد عمرها عن 50 شهرًا بفرض أن ما تعلنه هذه الشركة صحيحًا.

c يبين المنحنى الممثل لعمر البطاريات أن 2.5% من هذه البطاريات يقل عمرها عن 40 شهرًا وذلك بفرض أن ما تعلنه الشركة

صحيحًا.