



الإمارات العربية المتحدة  
وزارة التربية والتعليم



عام التسامح

العام  
2018 - 2019


10



McGraw-Hill Education

الفيزياء

نسخة الإمارات العربية المتحدة



**McGraw-Hill Education**

# **الفيزياء**

**نسخة الإمارات العربية المتحدة**

**للصف 10 العام**

**مجلد 3**





**صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان**  
**رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، حفظه الله**

”يجب التزود بالعلوم الحديثة والمعارف الواسعة، والإقبال عليها بروح عالية ورغبة صادقة؛ حتى تتمكن دولة الإمارات خلال الألفية الثالثة من تحقيق نقلة حضارية واسعة.”  
من أقوال صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان

- 1 مدخل إلى علم الفيزياء
- 2 تمثيل الحركة
- 3 الحركة المستمرة
- 4 القوى في بعد واحد
- 5 الإزاحة والقوة في بعدين
- 6 أساسيات الضوء
- 7 الانكسار والمرآيا
- 8 الانكسار والعدسات

## موارد الطالب

Chapter Sourced from: FM Front Matter, from Glencoe Physics: Principles & Problems ©2017 McGraw-Hill Education © موسسه طبلة المسالح وتألیف: محقق الطایح و ایادی

تبدأ كل وحدة بتجربة استهلالية، وهي تحقيق مختبرى تمهيدى مصمم لتقديم المفاهيم التى تشتمل عليها تلك الوحدة. التجارب المصغرة تتحققات قصيرة يمكنها تحسين فهمك لمحتوى الفيزياء. وستجد أيضًا مختبر فيزياء أو أكثر فى كل وحدة يوفر فرصة للمزيد من التتحققات المعمقة.

## الوحدة 1

### مدخل إلى علم الفيزياء

2	القسم 1 المنتج العلوي .....
4	القسم 2 الرياضيات والفيزياء .....
10	القسم 3 القياس .....
14	القسم 4 تمثيل البيانات بيانياً .....
18	<b>الفيزياء إنه شيء متع</b>
24	الرسوم المتحركة .....

تجربة استهلالية الكتلة والأجسام الساقطة  
تجارب مصغرة قياس التغير  
إلى أي مدى تغير؟  
مختبر الفيزياء الدليل في الدم  
الكتلة والحجم  
استكشاف الأجسام المتحركة



جدول المحتويات X

## الوحدة

# 2

<b>تمثيل الحركة</b>	32
القسم 1 تصوير الحركة	34
القسم 2 الموقف والזמן	37
القسم 3 التمثيل البياني للحركة	41
القسم 4 السرعة	46
<b>نظرة عن كثب هل لديك الزمن الكافي؟</b>	52


تجربة استهلاكية سباق السيارات اللعبة  
**تجارب مصغرة** نماذج للمتجهات  
 متجهات السرعة المتتجهة  
**مختبر الفيزياء** مخططات الحركة  
 السرعة الثابتة  
 قياس السرعة المتتجهة

## الوحدة

# 3

<b>الحركة المتتسارعة</b>	58
القسم 1 التسارع	60
القسم 2 الحركة بتتسارع ثابت	68
القسم 3 السقوط الحر	75
<b>الفيزياء إنه شيء ممتع</b> ألعاب الإثارة بمدينة الملاهي	80

تجربة استهلاكية الرسم البياني للحركة  
**تجارب مصغرة** سباق الكرة الفولاذية  
 السقوط الحر  
**مختبر الفيزياء** التسارع  
 حركة الكرة المقدوقة  
 قياس التسارع  
 تسارع السقوط الحر



حقوق الطبع وتأشير © مجموعة سصال مؤسسة McGraw-Hill Education

<b>88</b>	<b>القوى في بُعد واحد</b>
90	القسم 1 القوة والحركة
100	القسم 2 الوزن والقوة المعاينة
106	القسم 3 القانون الثالث لنيوتن
112	الحدود في الفيزياء أسرع من الصوت

## الوحدة 4

تجربة استهلالية القوى في اتجاهين متضادين  
 تجارب مصغرة الكتلة والوزن  
 خلطة ملوكية  
**مختبر الفيزياء** القوى في المصعد  
 السرعة الحدية  
 قانون نيوتن الثالث

<b>120</b>	<b>الإزاحة والقوة في بُعدين</b>
122	القسم 1 المتجهات .....
130	القسم 2 الاختناك .....
136	القسم 3 القوة في بُعدين .....
142	أثناء العمل المجازفة .....

## الوحدة 5

تجربة استهلالية جمع المتجهات  
 تجارب مصغرة قوة التوازن  
 القوى على سطح مائل  
**مختبر الفيزياء** حادث صدم وهروب  
 معامل الاختناك  
 التزلج على منحدر  
 الاختناك على سطح مستوٍ  
 القوى العمودية



## الوحدة

# 6

### أساسيات الضوء

150 .....	القسم 1 الاستضاءة .....
152.....	القسم 2 الطبيعة الموجية للضوء .....
161.....	المفهوم ..... <b>الفيزياء إنه شيء متعانق</b>
170 .....	التعرف على البعد الثلاثي .....

تجربة استهلالية مسار الضوء  
تجارب مصغرة سرعة الضوء

اللون عن طريق درجة الحرارة  
استقطاب الضوء المتنعكس  
**مختبر الفيزياء** قياس ضوء الأشعة فوق البنفسجية  
نسبة الضوء والمسافة  
طيف كامل من الاحتمالات  
الاستقطاب  
تقليل الوهج



xiii جدول المحتويات

# الوحدة

# 7

<b>176</b>	<b>الانعكاس والمرايا</b>
178	القسم 1 المرايا المستوية
185	القسم 2 المرايا الكروية
196	الحدود في الفيزياء البحث عن كواكب خارج النظام الشمسي

تجربة استهلاكية الصور الممعكسة من المرايا  
 تجارب مصغرة موقع الصورة الخيالية  
 إيجاد البؤرة  
**مختبر الفيزياء** موقع الصورة التي تعكسها المرأة  
 القليل من الوقت للتفكير  
 صور المرأة المقعرة

<b>204</b>	<b>الانكسار والعدسات</b>
206	القسم 1 انكسار الضوء
214	القسم 2 العدسات المحدبة والم-curva
222	القسم 3 تطبيقات العدسات
226	<b>نظرة عن كثب</b> عدسات الجاذبية

تجربة استهلاكية شكل الماصة المكسورة  
 تجارب مصغرة عمل قوس البطر شخصيا  
 تأثيرات نقطية العدسة  
 العدسات المائية  
**مختبر الفيزياء** كيف ينكسر الضوء؟  
 طيف يشمل جميع الاحتمالات  
 الصور المنكوبة من العدسة المحدبة  
 العدسات المحدبة والبعد البؤري

# الوحدة

# 8

# الانعكاس والمرايا

**ال فكرة الرئيسية** تعكس كل الأسطح الضوء، إلا أن الأسطح الملساء تكون صوراً للأجسام.

## الأقسام

1 المرايا المستوية

2 المرايا الكروية

## تجربة استهلالية

الصور المنعكسة من المرايا

اخت أي ظروف تعكس المرأة صورة واضحة لجسم ما على الشاشة؟






Chapter Sourced from: 7. Reflection and Mirrors, Chapter 17, from Glencoe Physics: Principles & Problems ©2017

الوحدة 7 • الانعكاس والمرآيا 177



## قانون الانعكاس



الشكل 2 تكون زاوية انعكاس الشعاع الضوئي  
تساوي زاوية سقوطه ويقعان في المستوى  
نفسه.

دالة الألوان

أشعة الضوء حبراء

لكي تفهم طريقة عمل المرآيا، عليك أن تفهم ماهية الانعكاس أولًا. ماذا يحدث للضوء الساقط على الكتاب؟ إن كنت تمسك بكتاب ووجهته إلى مسار الضوء، فستلاحظ أن الضوء لن يخترق الكتاب. عرفت سابقاً أن مثل هذه الأجسام سُمّي بالأجسام المعتمة التي لا ينفذ منها الضوء، حيث يعكس الكتاب جزءاً من الضوء الساقط عليه. ويمتص جزءاً منه، ويتحول هذا الضوء الممتص إلى طاقة حرارية ترفع من درجة حرارة الكتاب. وبعند سلوك الضوء على السطح العاكس، وزاوية سقوط الضوء عليه.

تدفع كرة السلة على الأرض، سيلاحظ المراقب من الأعلى أن الكرة ترتد في خط مستقيم إلى لاعب آخر. تذكر من دراستك عن الموجات أنه عندما تنتشر موجة في بعدين وتصطدم حاجز فإن زاوية سقوطها عليه تساوي زاوية انعكاسها عنه. وبنطريق ذلك أيضاً على موجات الضوء.


يعكس الضوء، كما حدث في موجات الماء وكرة السلة. يوضح الشكل 2 شعاعاً من الضوء ساقطاً على سطح عاكس مستوي، وهنالك خطٌ وهمني عمودي على السطح، يسمى العمود المقام. ويقع كل من الشعاع الساقط والشعاع المنعكس والعمود المقام على السطح العاكسي في مستوى واحد عمودي على السطح العاكسي. بالرغم من أن الضوء ينتشر في ثلاثة أبعاد، فإنَّ انعكاسه يكون في مستوى واحد، أي بعدين. وتنسمى العلاقة بين زاوية السقوط وزاوية الانعكاس بقانون الانعكاس.

**قانون الانعكاس**  
الزاوية التي يصنعا الشعاع الساقط مع العمود المقام على السطح العاكسي عند نقطة السقوط، تساوي الزاوية التي يصنعا الشعاع المنعكس مع العمود المقام نفسه.


$$\theta_r = \theta_i$$

**النموذج الموجي** يمكننا تفسير هذا القانون من خلال النموذج الموجي للضوء. يوضح الشكل 3 مقدمة موجة ضوء تقترب من سطح عاكس، فعندها تصل كل نقطة على امتداد مقدمة الموجة إلى السطح العاكسي تعكس بزاوية مماثلة لزاوية انعكاس النقطة الساقية لها. وكون النطاط جميعها تنتشر بالسرعة نفسها، فإنها تقطع المسافة الكلية نفسها خلال الزمن نفسه. لذا تعكس مقدمة الموجة كاملة عن السطح بزاوية متساوية لزاوية سقوطها. لاحظ أن الطول الموجي للضوء ليس له تأثير في ذلك. فكل من الضوء الأحمر والأزرق والأزرق يتبع قانون الانعكاس هذا.


الشكل 3 تتعكس مقدمة الموجة كاملاً عن السطح بالزاوية نفسها. وتساوي زاوية السقوط زاوية الانعكاس.



تنعكس كل نقاط مقدمة الموجة بالزاوية نفسها.




تشكل مقدمة الموجة المنعكسة عندما تنعكس أشعة الضوء من السطح.




تصطدم النقطة P الموجودة في مقدمة الموجة في السطح أولًا.

**الشكل 4** لاحظ صورة المصباح الكهربائي المنعكسة على الطاولة بواسطة مراة ملساء، بينما يعكس سطح الورقة صورة غير واضحة للضوء المصباح.



السطح الملساء: انعكاس منتظم



السطح الخشن: انعكاس غير منتظم

#### الأسطح الملساء تأمل أشعة الضوء الموضحة في الشكل 4. لاحظ أن جميعها

انعكست عن السطح بصورة متوازية، يحدث هذا فقط إن كان السطح العاكس ملساء، وفق مقياس الطول الموجي للضوء. وتسبب الأسطح الملساء أو المصقوله كالمرآة **انعكاساً منتظمًا**. أي تعكس الأشعة الضوئية الساقطة بشكل متوازي في اتجاه متوازي.

#### الأسطح الخشنة


ماذا يحدث عندما يصطدم الضوء بورقة؟

قد تبدو هذه الورقة ملساء، لكن وفقاً لمقياس الطول الموجي الضوئي، تكون الورقة في الواقع خشنة تماماً. هل يعكس الضوء؟ كيف يمكنك إثبات ذلك؟ بين الشكل 4 أشعة الضوء المنعكسة عن الورقة، إذ سقطت هذه الأشعة جسمها متوازية على سطح الورقة ولكنها انعكست غير متوازية، وبسمى تشتت الضوء عن سطح خشن **انعكاساً غير منتظم**.

ويساعدك هذا النوع من الانعكاس في قراءة الورقة من زوايا مختلفة.

الجدير بالذكر أنّ قانون الانعكاس ينطبق على كل من الأسطح الملساء والخشنة، ولكن في حالة السطح الخشن تكون زاوية سقوط كل شعاع متساوية لزاوية انعكاسه، وتكون الأعمدة المقامة على السطح عند موقع سقوط الأشعة غير متوازية، لذا لا تكون الأشعة المنعكسة متوازية. لأن السطح الخشن سبب عدم توازيها. وبالتالي لا يمكن في هذه الحالة رؤية حزمة الضوء المنعكسة. لأن الأشعة الضوئية المنعكسة تتشتت في اتجاهات مختلفة. أما في الانعكاس المنتظم، كما هو الحال في المرآة، فيمكن رؤية وجهك. وبغض النظر عن مقدار الضوء المنعكس عن الورقة أو الحائط، فلا يمكن استعمال أي منها كمرآة، لأنهما يشتتن الأشعة المنعكسة.


**تغيير زاوية السقوط** اصطدم شعاع ضوئي بمرأة مستوية بزاوية مقدارها  $52.0^\circ$  بالنسبة للعمود المقام، إذا أدرت المرأة بزاوية مقدارها  $35.0^\circ$  حول النقطة التي اصطدمت عندها الشعاع بالمرأة بحيث ثابتت زاوية سقوط شعاع الضوء، وكان محور الدوران متوازياً مع الشعاع الساقط والشعاع المنعكس، ما مقدار زاوية دوران الشعاع المنعكس؟



### تحليل المسألة ورسمها

- ضع رسمًا تخطيطيًا للموقف قبل دوران المرأة.
- رسم رسمًا تخطيطيًا ملائماً زاوية الدوران على المرأة.
- رسم رسمًا تخطيطيًا ثالثاً للأشعة المنعكسة.

$$\text{المعلوم} \quad \Delta\theta_r = ? \quad \theta_i = 52.0^\circ \quad \theta_r = 35.0^\circ = \Delta\theta_{\text{مرأة}}$$



### حساب فرق الزاوية

لكي نقل زاوية السقوط، أدر في اتجاه عقارب الساعة.


$$\theta_i - \theta_r = 52.0^\circ - 35.0^\circ = 17.0^\circ$$

في اتجاه عقارب الساعة من العمود المقام الجديد

تطبيق قانون الانعكاس.

$$\theta_r = \theta_i - \Delta\theta$$

=  $17.0^\circ$  في عكس اتجاه عقارب الساعة من العمود المقام الجديد



$$\Delta\theta = 17.0^\circ$$

استخدم الرسومات التخطيطية لتساعدك في إيجاد الزاوية من خلال دوران الشعاع المنعكسة.

$$\theta_r = \theta_i - \Delta\theta$$

$$52.0^\circ + 35.0^\circ = 87.0^\circ$$

في اتجاه عقارب الساعة من الزاوية الأصلية

### تقييم الإجابة

هل القيمة واقعية؟ توضح المقارنة بين الرسم النهائي والرسم الأولى أن الزاوية التي يصفعها شعاع الضوء مع العمود المقام تقل عندما تدور المرأة في اتجاه عقارب الساعة، وبالتالي من المنطقي أن يدور أيضًا الشعاع المنعكسة في اتجاه عقارب الساعة بزاوية أكبر مرتين من زاوية دوران المرأة.

### تطبيقات

4. سقط شعاع ضوئي ليزري على مرأة مستوية بزاوية مقدارها  $38^\circ$  بالنسبة للعمود المقام، إن زادت زاوية السقوط بمقدار  $13^\circ$ . فما مقدار زاوية الانعكاس الجديدة؟

5. وضعت مراتان متساويتان إحداهما عمودية على الأخرى، فإذا سقط شعاع ضوئي على إحداهما بزاوية مقدارها  $60^\circ$  بالنسبة للعمود المقام وانعكس باتجاه المرأة الثانية. فما مقدار زاوية انعكاس الشعاع عن المرأة الثانية؟

6. تحضير إذا طلب إليك تصميم جهاز عاكس من مراتين متساويتين، بحيث يمكنه أشعة ليزر بزاوية مقدارها  $180^\circ$  بغض النظر عن زاوية السقوط. ماذا ينبغي أن تكون الزاوية بين المراتين؟

1. فسر سبب تغير انعكاس الضوء على الزجاج الخشن من انعكاس غير منتظم إلى انعكاس منتظم إذا سُكب عليه ماء.

2. كم تبلغ زاوية سقوط شعاع الضوء المنعكسة عن مرأة مستوية بزاوية مقدارها  $35^\circ$  بالنسبة للعمود المقام؟

3. افترض أن زاوية سقوط شعاع ضوئي تساوي  $42^\circ$ . فما مقدار كل مما يلي؟

a. زاوية الانعكاس

b. الزاوية التي يصفعها الشعاع الساقط مع المرأة

c. الزاوية الواقعة بين الشعاع الساقط والشعاع المنعكسة

## الأجسام والصور في المرايا المستوية

عندما تنظر إلى مرآة مستوية، فإنك تشاهد صورتك فيها. **المراية المستوية هي عبارة عن سطح مستو وأليس ينعكس عنه الضوء انكاكاً منتظماً.** ولفهم كيف تكونت صورتك التي شاهدتها في المرأة ينبغي أن تعرف مصدر أشعة الضوء وكيف انعكس. لقد استخدمت كلمة جسم في الوحدة السابقة لتشير إلى مصدر الضوء، أما في هذا القسم، فستستخدم بالطريقة نفسها ولكن بصورة محددة أكثر. **فالمصدر هو جسم الأشعة التي تعكس عن سطح المرأة.** ويمكن أن يكون الجسم مصدرًا مضيئاً مثل المصباح، أو مصدرًا مستضيءاً مثل أحدى. كما أن جميع مصادر الضوء التي سترعرعها في هذا القسم يبعث منها ضوء وينشر في جميع الاتجاهات. **وعند انعكاس أشعة الضوء عن المرأة المنسابة تكون صورة مرئية، كما في الشكل 5.**

الطاير الذي تشاهده في **الشكل 6**، عبارة عن جسم، وينعكس الضوء عن جسم الطائر انكاكاً غير منتظم. انظر إلى نقطة محددة في جسم الطائر، ماذا يحدث للضوء المنعكس عنها؟ يسقط الضوء من الطائر على المرأة وينعكس. ماذا ستشاهد مريم؟ سيصل الضوء المنعكس إلى عينيها، وسيجال الدماغ هذه المعلومات كما لو كانت هذه الأشعة سلكت مسازاً مستقيماً. وسيظهر له الضوء كما في الخطوط المتقطعة الموضحة في **الشكل**. أي أنه قادم من نقطة خلف المرأة، وهي تمثل صورة النقطة. أنت نظرت إلى نقطة واحدة على جسم الطائر، لكن مريم في **الشكل 6** سترى أشعة الضوء القادمة من جسم الطائر بالطريقة نفسها، و بذلك تكون **صورة خالية**. ويكون هذا النوع من الصور من النساء امتدادات الأشعة الضوئية المنككسة عن المرأة. وتقع الصور الخيالية دائمًا على الجانب الآخر من المرأة، وهذا يعني أن صور الأجسام الحقيقية المنشورة في المرايا المستوية هي دائمًا خالية، لأنه لا يمكن جمعها على حاجز.


## خصائص الصور في المرايا المستوية

عندما تنظر إلى نفسك في المرأة، ستظهر صورتك كأنها خلف المرأة وعلى بعد يساوي بذك من المرأة. كيف تتحقق من ذلك؟ ضع مسطرة متوازية بينك وبين المرأة، أين ستلامس المسطرة الصورة؟ وستلاحظ أيضًا أن الصورة معتلة، وأنها مقلوبة جانبياً. حجمها يساوي حجم جسمك. وهذا أساس المقوله "صورة طبق الأصل".



**الشكل 5** الضوء المنتبع من المصباح ينعكس عن جسم أحد باتجاه المرأة. وبعد هذا انكاكاً غير منتظم، وينعكس الضوء أشعة الضوء إلى عيني أحد، ما يجعل أحد يشاهد صورته. وانعكاس الضوء عن المرأة بعد انكاكاً منتظمًا.


**صف** كيف يكون الولد مصدرًا مستضيء.



**الشكل 6** ستنبهت الأشعة المنككسة عن الطائر في جميع الاتجاهات، وكما عرفت التلليل منها ينبع نحو المرأة، وتكون الصورة في مكان النساء امتدادات الأشعة الضوئية العادمة من جسم الطائر.

**الشكل 7** تضاد أشعة الضوء المنبعثة من الشمعة (يظهر شعاعان) بالمرأة. ويصل بعض هذه الأشعة إلى عيني المراقب. ترسم امتدادات الأشعة المنكسسة الرؤية (الخطوط المتقطعة) من مكان انعكاس الأشعة عن المرأة إلى مكان تجمعها. وتقع الصورة في مكان تجمع امتدادات الأشعة المنكسسة.

اشرح لماذا  $x_i = -x_0$ .



## مختبر الفيزياء

### موقع الصورة التي تعكسها المرأة

هل يمكنك تقدير موقع صورة ما من مرآة مستوية؟

### القليل من الوقت للتفكير

**مختبر الطبع الشرعي** كيف يمكنك إيجاد مسار أشعة الضوء الساقطة على سطح عاكس، مثل زجاج أو مرآة؟

**موقع الصورة وطولها** يوضح النموذج الهندسي في الشكل 7 سبب مساواة بعد الجسم من المرأة وبعد الصورة منها. ولماذا يتتساوى طول الجسم مع طول صورته. يمكننا توضيح ذلك برسم شعاعين من النقطة O يسقطان على المرأة عند التقاطتين  $P_1$  و  $P_2$  على الترتيب، وينعكسان وفق قانون الانكسار، ويلتقي امتداد انعكاسهما (الخطوط المتقطعة) خلف المرأة في النقطة التي تمثل صورة النقطة O. إذ إن الشعاع الضوئي 1 يسقط على المرأة بزاوية سقوط مقدارها  $0^\circ$  فيرتد على نفسه، أي عمودياً على سطح المرأة. أما الشعاع الضوئي 2 فيسقط على المرأة وينعكس عنها بزاوية السقوط نفسها، لذا يصنع الامتداد مع المرأة زاوية مساوية للزاوية التي يصفعها الشعاع الأصلي مع المرأة. يوضح هذا النموذج الهندسي أنَّ القطعتين المستقيمتين  $OP_1$  و  $IP_1$  متقابلين للمثلثين المتطابقين،  $\triangle OP_1P_2$  و  $\triangle IP_1P_2$ . وتمثل  $(x_i)$  بعد الجسم من المرأة، والذي يساوي طول القطعة  $OP_1$ . أما  $(x_0)$ ، تمثل بعد الصورة من المرأة وتساوي طول القطعة  $IP_1$ . وباستخدام افتراض الاصطلاحى، حيث تشير الإشارة السالبة إلى أن الصورة خالية. فإن المعادلة أدناه تكون صحيحة.

**موقع الصورة في المرأة المستوية**  
بعد الجسم من المرأة يساوي سالب بعد الصورة من المرأة. وإشارة السالب تشير إلى أن الصورة خالية.

$$x_i = -x_0$$

## تجربة مصغرة


### موقع الصورة الخيالية

هل يمكنك أن تحدد صورة خالية باستخدام كاميرا رقمية؟

يمكن إيجاد طول الصورة برسم شعاعين ضوئيين من الجسم. وكما يظهر في الشكل 7، يلتقي امتداد الشعاعين المتبعين من قاعدة الشمعة في نقطة خلف المرأة، حيث تشكل صورة القاعدة. وبحسب قانون الانكسار وتطابق المثلثات، سيكون طول الجسم ( $h_0$ ) مساوياً لطول الصورة ( $h_i$ ).

**طول الصورة في المرأة المستوية**  
يكون طول الصورة مساوياً لطول الجسم في المرأة المستوية.

$$h_i = h_0$$




**الشكل 8** عند النظر في مرآة، يكون ارتفاعك هو نفسه والمسافة التي تبعدك من المرأة هي نفسها. إلا أن هناك اختلافاً، وهو أنك تواجه الاتجاه المعاكس.

**اتجاه الصورة** تظهر في المرأة المستوية صورة للجسم في اتجاه الجسم نفسه، أي معتمدة. وإن كنت واقعاً على قدميك، فستظهر في المرأة المستوية صورة لك وأنت واقف على قدميك. وإن كنت واقعاً على يديك وأراسك للأسفل، فستظهر بهذه الصورة في المرأة.

انظر إلى خطوط الأشعة وامتداداتها المبينة في الشكل 8. فالمرأة تعكس صورة للجسم وتبعد وكأنها خلفها، مثلاً بيده الشاب وجهه لوجه مع صورته. فعندما يرفع الشاب يده اليمنى بيده الأخرى في المرأة كأنه يرفع يده اليسرى، وهذا يعني أن المرأة لا تعكس الجهة اليمنى واليسرى للجسم بصورة حقيقة. فالمرأة المبينة في الشكل 8 تعكس صورة الشخص بحيث تظهر كأنها تقابلها في الجهة المقابلة. تأمل في صورة الجبل في الشكل 1. يمكن وصفها بأنها مقلوبة رأسياً، لكنها في الواقع عبارة عن انكاس من الأمام إلى الخلف لمنظر الجبل العلوي. فلأن ماء البحيرة يحمل كأنه مرآة أفقية بدلاً من رأسية، تبدو الصورة من منظورك كأنها مقلوبة رأسياً. أقلب الشكل 8 بزاوية مقدارها  $90^\circ$  في اتجاه عكس عقارب الساعة. ستلاحظ أن جسم الولد الأصلي اتجه نحو الأسفل بينما صورته اتجهت للأعلى. بالرغم من أن الشيء الوحيد الذي تغير هو منظورك.

## القسم 1 مراجعة

9. قانون الانكسار وضح كيف يطبق قانون الانكسار على الانكسار غير المنتظم.
  10. الأسطح العاكسة صفت كلّاً مما يلي كأسطح انكسار منتظم أو غير منتظم: الورقة والفلز المصنقول وزجاج النافذة والفلز الخشن وابريق الحليب البلاستيكي وسطح الماء الراكد والزجاج الخشن.
  11. رسم تخطيطي للصورة تسير سيارة خلف سيارة أخرى على طريق أفقى، إذا كانت النافذة الخلفية في السيارة الأمامية تميل بزاوية مقدارها  $45^\circ$  على المستوى الأفقي. ارسم رسمًا تخطيطياً للأشعة بين موقع الشمس الذي يبعث منه الضوء لينعكس في عيني سائق السيارة الخلفية.
  12. التكبير الناقد اشرح كيف يساعدك الانكسار غير المنتظم للضوء عن جسم ما في رؤية ذلك الجسم من أي زاوية.
7. الفكرة الرئيسية اصطدام شعاع ضوئي بسطح مستوٍ عاكس بزاوية مقدارها  $80^\circ$  مع العمود المقام. ما مقدار الزاوية التي يصنعها الشعاع المتنكس مع سطح المرأة؟
8. خصائص الصورة ينظر القطة إلى صورته، كما هو موضح في الشكل 9. ما موقع الصورة وطولها وبنوعها؟



الشكل 9

### فيزياء في حياتك

لعلك شاهدت صورتك يوماً في ملعة فلزية، ووجدت أنها تكون مقلوبة على سطحها المنحني للداخل، بينما تكون معتملة على سطحها المنحني للخارج. لماذا يحدث ذلك؟

## خصائص المرايا الكروية

تعمل اللمعة الفلزية كمرايا كروية، وإندي جهتها منحنياً إلى الداخل والأخرى إلى الخارج. أمسك الملاعة وقربيها من وجهك ثم أبعدها عنه. وفي أثناء ذلك انظر إلى صورتك على جهتي الملاعة، قد تبدو صورتك أكبر أو أصغر أو قد تكون حتى معكوسة.

تعتمد خصائص المرايا الكروية والصور التي تكونها على شكل المرأة وموضع الجسم.

**المرايا المقعرة** يعمل السطح الداخلي للملعة الفلزية اللامعة، وهو السطح الذي يحمل الطعام. كمراة مقعرة. **المرايا المقعرة**، تلك الموضحة في الشكل 10، هي سطح عاكس منحن إلى الداخل. وحافاته منحنية باتجاه المشاهد. توضع المرايا المقعرة خلف مصابيح الإضاءة في كشافات الضوء وفي الأضواء الأمامية في السيارات. فالمرايا المقعرة تسمح بتركيز الضوء المنتبعث من المصباح في بقعة معينة. ما الذي يؤثر في سلوك المرأة المقعرة؟

تعتمد الطريقة التي تعكس بها المرأة المقعرة الضوء على كيفية انتباه المرأة. يوضح الشكل 10 رسمًا تخطيطيًا لمرأة كروية مقعرة. ويشمل على مسافات ومعلومات مهمة في فهم طريقة تكون الصور فيها. تبدو المرأة الكروية المقعرة كما لو كانت جزءًا من كرة مجوفة وسطحها الداخلي عاكس للضوء، ويوجد للمرأة المقعرة مركز التكبير (C) مشابه للمركز الهندسي لكرة نصف قطرها  $r$ . يطلق على المسافة  $2f$  في المرايا الكروية، صرف قظر التكبير. أما الخط المستقيم المتضمن القطعة CM، فيدعى محور الأساس.

وهو خط متعمد مع سطح المرأة. ويقسمها إلى نصفين. الأشعة الضوئية الساقطة بشكل موازٍ للمحور الأساسي، تنعكس وتتفاصل معه عند نقطة منتصف المسافة ما بين C و M.



### الكرة الرئيسة

يمكن للمرايا الكروية أن تكون صوراً حقيقة وصورة خيالية. كما يمكنها تكبير حجم الصور أو تصغيرها.

### الأسئلة الرئيسة


- اذكر بعض خواص المرايا المقعرة واستخداماتها.
- كيف تُستخدم الرسومات التخطيطية للأشعة لوصف الصورة التي تكونها المرايا الكروية؟
- كيف تُستخدم المرايا المحدبة ونرقيات المرايا؟
- كيف تجري الحسابات المتعلقة بخواص الصور التي تكونها المرايا الكروية؟

### مراجعة المفردات

**الشعاع ray:** خط يوضح اتجاه انتقال الموجة. ويرسم على الزاوية اليمنى من مقدمة الموجة

### مفردات جديدة

concave mirror	مرآة مقعرة
principal axis	محور أساسى
focal point	بؤرة
focal length	بعد بؤري
real image	صورة حقيقة
spherical aberration	زيغ كروي
convex mirror	مرآة محدبة
magnification	تكبير



الشكل 10 المسافة من M إلى البؤرة (F) تساوي نصف المسافة من M إلى C. وتتجمع أشعة الضوء التي تسقط بشكل موازٍ للمحور الأساسي في البؤرة بعد انعكاسها عن المرأة.

**البؤرة** ستلاحظ في كثير من الرسومات الواردة في هذا القسم نقطة يرمز إليها بالحرف F. فما هي النقطة F لكي تجيب عن هذا السؤال، فكر في ما يحدث عندما تكسس مرآة م-curved الضوء القادم من الشمس. ظرفاً إلى بعد الشمس، فإن الأشعة القادمة إلى الأرض منها تكون متوازية تقريباً. وعندما توجه المحور الأساسي لمراة م-curved نحو الشمس، تكسس كل الأشعة في نقطه صغيرة جداً، ويمكن تحديد موقع هذه النقطة عن طريق تقارب وإبعاد ورقة عن المرأة حتى تحصل على أصغر وأوضح نقطه من الضوء.

وتشمل هذه النقطة **البؤرة**، وهي النقطة التي تجتمع فيها أشعة الضوء الساقطة بموازاة المحور بعد انكسارها عن المرأة، وهذه هي النقطة F.

يبين الشكل 11 أن الأشعة الضوئية الموازية للمحور الأساسي بعد انكسارها عن المرأة تقطع المحور عند النقطة F (البؤرة). لاحظ أن المسافة من M إلى F تساوي نصف المسافة من M إلى C. أى **البعد البؤري f**) فهو المسافة بين المرأة والبؤرة. ويمكن التعبير عنه بالمعادلة  $f = \frac{r}{2}$ . ويكون موجباً في المرأة الم-curved. 2 تمثل نصف قطر نكور المرأة.

إذا وضعت مصدراً للضوء عند بؤرة مرآة م-curved فستنكس الأشعة عن المرأة بالموازي و تكون حزمة ضوئية. ويمكنك رؤية هذا التأثير في المصباح اليدوي الموضح في الشكل 11.

## الرسومات التخطيطية للمرآيا الم-curved


لقد رسمت سابقاً أشعة الضوء الساقط على مرآة مستوية لكي تتبّع مسار انكسارها. وشاهدت بعض الرسومات التخطيطية للأشعة في المرأة الم-curved كما في الشكل 10 والشكل 11. ستعلم في هذا القسم استخدامها في إيجاد موقع وطول واتجاه كل من الصور التي تكونها المرآيا الم-curved.

يبين الشكل 12 أشعة منكسسة تجتمع في النقطة 1 التي تكون عينيك. وتكون أشعة الضوء المتجمعة **صورة حقيقة** كبيرة ومقلوبة للجسم. يمكن أن ترى الصورة كأنها عائمة في الفضاء، وذلك إن جعلت الأشعة الضوئية المنكسسة التي كتبت الصورة تنسقط على عينيك كما هو مبين في الشكل 12. ينبغي أن تجعل عينيك بالاتجاه الذي يسمح لأشعة الضوء المنكسسة من الصور بالدخول إليها. فلا تستطيع النظر إلى الصورة من الخلف، وإذا وضعت ورقة أو شاشة في هذه النقطة، ستظهر الصورة على الشاشة كما في الشكل 12. وبعد هذا غير ممكن في الصورة الخيالية لأنها تكون من التقاء امتدادات الأشعة المنكسسة وليس من التقاء الأشعة المنكسسة نفسها.




الشكل 11 في حال تتبّع مسار الأشعة الضوئية من البؤرة إلى المرأة، ستنكسس عن السطح كأشعة متوازية.

الشكل 12 الرسومات التخطيطية للأشعة. لتحديد موقع الصورة المنكسسة عن مرآة كروية م-curved.




إن العين موجودة في موقع يجعل الأشعة المكونة للصورة الحقيقة تنسقط عليها ما يسمى برأبة الصورة.




الوحدة 7 • الانكسار والمرآيا

186




يتكون صورة مكبّرة لجسم يقع على بعد يتراوح بين  $2f$  و  $f$



يتكون صورة مصغّرة لجسم إن كان الجسم يقع على بعد أكبر من  $2f$  من المرأة.

**الشكل 13** يعتمد نوع الصورة المتكوّنة على بعد الجسم عن المرأة. الصورة في الحالتين الموضعتين تكون حقيقة مملاة، وتذكر أنّ العد البوّري يساوي المسافة من النند البوّري ( $F$ ) إلى مرآة ( $M$ ).


**رسم تخطيطي** كيف تتكوّن النقطة الأخرى على الصورة.  
دلالة الألوان



## الصور الحقيقية المتكوّنة في المرآيا المقعرة

يمكنك في كثير من الأحيان تبسيط الرسومات التخطيطية للأشعة الضوئية عن طريق استخدام أجسام ذات بعد واحد. مثل السهم الموضح في **الشكل 13**. تكون المرأة الكروية المقعرة صورة حقيقة ممكّنة للجسم إذا وقع على بعد ( $x_o$ ) أكبر من ضعف النند البوّري ( $F$ ). أي يكون الجسم خلف مركز تكّور المرأة. أما إذا وقع الجسم بين مركز التكّور والبؤرة كما في **الشكل 13**. يتكون له صورة حقيقة مقلوبة وحجمها أكبر من حجم الجسم نفسه. وتزداد الرسومات التخطيطية بمتّبّل مرتّب حول كيّف تكوّن المرآيا الكروية الصورة أو تصوّرها. اعتماداً على موقع الجسم بالنسبة إلى البؤرة.

**الربط بعلم الفلك** كيف يمكن قلب الصور الحقيقة المقلوبة الناتجة من مرآة مقعرة رأسياً؟ في العام 1663، طور عالم الفلك الأسكنلندي جيمس جريجوري التلسكوب الجريجوري، الموضّح في **الشكل 14**. حل هذه المشكلة. فهو يتكون من مرآتين مقعرتين كبيرة وصغيرة مرتّبّتين بحيث تكون المرأة الصغيرة خارج بؤرة المرأة الكبيرة. فعندما تسقط الأشعة المتوازية من الأجسام البعيدة على المرأة الكبيرة تتكون صورة عند البؤرة، وتعتبر هذه الصورة بمثابة جسم أما المرأة الصغيرة حيث تتعكس الأشعة المكوّنة لها عن المرأة الصغيرة وتكون صورة حقيقة معتدلة.



**الشكل 14** يكون التلسكوب الجريجوري صورة حقيقة ومنتّبة للمشاهد.

3. لتمثيل المرأة، ارسم خطأ رأسياً يمتد 12 سطراً، ويكون هذا المستوى الأفقي للمرأة.

4. ارسم الجسم في شكل سهم، وقم بتنسية O من الناحية العليا، وبالنسبة إلى المرايا المقعرة، يجب لا يزيد ارتفاع الأجزاء عند الأجسام ستة أسطر، وسيختلف مقياس رسم الجسم عن مقياس رسم المحور الأساسي.

5. ارسم الشعاع 1 (الشعاع الموازي للمحور)، فهو موازٍ للمحور الرئيس، وينعكس من المستوى الأساسي ويقطع المحور عند F.

6. ارسم الشعاع 2 (الشعاع البار في البؤرة)، فهو بير في البؤرة F وينعكس عن المستوى الأساسي بشكل سهم.

7. إذا كان الشعاعان المتتسكان 1 و 2 متبعدين أحدهما عن الآخر، فـ بمد خطى الرؤبة خلف المرأة كخطين متقطعين.

8. تفع الصورة عند نقطة تقاطع الشعاعين 1 و 2 أو خطى رؤيتهما بعد الانكسار، قم بتنسية نقطة التقاطع A، ثم ارسم الصورة في شكل سهم عمودي من المحور الرئيس إلى A.

استخدام الرسومات التخطيطية للأشعة لتحديد موقع

الصور التي تكونها المرايا الكروية

استخدم الاستراتيجيات التالية في حل مسائل المرايا الكروية.

راجع الشكل 13 والشكل 16.

1. استخدم ورقة مسطحة أو ورقة تمثل بياني، ارسم المحور الأساسي للمرأة كخط أفقي من الجانب الأيسر إلى الجانب الأيمن من الورقة.

وادرك ستة أسطر فارغة من أعلىها وستة أسطر فارغة من أسفلها.

2. ضع نقاطاً على المحور الأساسي وعنوانها بحيث تشير إلى الجسم C و F كما يلي:


a. إذا كانت المرأة مقعرة والجسم خلف مركز التكبير بعيداً من المرأة، فضع المرأة على الجانب الأيمن من الصفحة، والجسم على الجانب الأيسر من الصفحة C و F حسب مقياس الرسم.

b. وإذا كانت المرأة مقتعة والجسم بين C و F، فضع المرأة على المنتصف المسافة بين المرأة و C، والجسم بحسب مقياس الرسم.


c. في أي حالة أخرى، ضع المرأة في المنتصف الصفحة، ووضع الجسم أو F (أيضاً أبعد من المرأة) على الجانب الأيسر من الصفحة والآخر المراد قياسه.

**عيوب المرايا المقعرة** في الرسومات التخطيطية للأشعة الضوئية، استخدمت خطأ رأسياً لتمثيل مستوى المرأة، وفي الواقع، تتعكس أشعة الضوء من المرأة نفسها، كما هو موضح في الشكل 15. لاحظ أن الأشعة المتوازية القريبة من المحور الأساسي فقط هي التي تتعكس مارة في البؤرة، أما الأشعة الأخرى، ففتحجوم عند نقاط أقرب إلى المرأة. يحدث هذا العيب، المعنى **الزبعة الكروي**، بسبب عدم تجمع أشعة الضوء المنعكسة عند البؤرة، ما يجعل الصورة تبدو غير واضحة.

تتميز المرأة التي على شكل قطع مكافئ، كما في الشكل 15، بعدم وجود زبعة كروي، إلا أن صناعة مرايا كبيرة بشكل قطع مكافئ مكلفة، لذا تستخدم في التلسكوبات الحديثة مرايا كروية مغيرة إضافة إلى مرايا أو عدسات ثانوية مصممة بأسلوب خاص لتصحيح الزبعة الكروي. كما يمكن تقليل الزبعة الكروي من خلال تقليل النسبة بين قطر المرأة ونصف قطر التكبير.




الشكل 15 يحدث الزبعة الكروي للمرأة الكروية ولا يحدث لمرايا القطع المكافئ.



الشكل 16 عند وضع جسم، مثل نموذج المكعبات بين البؤرة والمرأة، يمكن له صورة خيالية.

**فكرة** في سبب ظهور الصور الأخرى في المرأة.



## الصور الخيالية المكونة في المرايا المقعرة

لقد رأيت أنه عند اقتراب جسم من البؤرة ( $F$ ) لمرأة مقعرة، تتحرك الصورة بعيداً من المرأة. أما إذا وقع الجسم في بؤرة المرأة، فتنعكس الأشعة تكوين في الالتباس، وبالتالي لا يمكن رؤية الصورة أبداً. إذاً يحدث إن قربت الجسم أكثر نحو المرأة؟

ماذا ترى عندما تقترب وجهك من مرآة مقعرة؟ تكون صورة وجهك معتدلة وخلف المرأة. وعندما يقع الجسم بين المرأة والبؤرة في المرأة المقعرة، تكون له صورة خيالية. كما هو مبين في الشكل 16.

كما عرفت في السابق، ينبغي أن ترسم شعاعين لتحديد موقع صورة إحدى النقط على جسم ما. إذ يرسم الشعاع 1 موازياً للمحور الأساسي، ومنعكساً في البؤرة. والشعاع 2 يرسم في صورة خط يمتد من نقطة على الجسم إلى المرأة، وينعكس موازياً للمحور الرئيسي. ويرى امتداده في البؤرة. انظر إلى الشكل 16 ولاحظ أن الشعاعين 1 و 2 يتشتنان عن المرأة، ولا يمكن أن تكون صورة حقيقة. في حين أن امتدادهما يلتقي خلف المرأة فيكونان صورة خيالية.

التأكد من فهم النص ووضح كيف يمكن تحديد ما إذا كانت الصورة خيالية.

## مختبر الفيزياء

**صور المرأة المقعرة** ما الظروف اللازمة لتكون صور حقيقة وخالية في المرأة المقعرة؟

### تحدي في الفيزياء


وضع جسم ارتفاعه  $h_0$  على بعد  $x_0$  من مرآة مقعرة تبعدها البؤري  $f$ .

1. ارسم مخططاً للأشعة يوضح البعد البؤري وموقع الجسم عندما تقع صورته على مسافة تساوي ضعف المسافة بين المرأة والجسم. وحدد المسافة بالستيمترات لموضع كل من الصورة وموضع الجسم والبعد البؤري.

2. ارسم مخططاً للأشعة ووضح موقع صورته على مسافة تساوي ضعف المسافة بين المرأة والمرآة البؤري. وحدد المسافة بالستيمترات لموضع كل من الصورة وموضع الجسم والبعد البؤري.

3. حدد أين يمكنك وضع جسم بحيث لا تكون له صورة.

**الشكل 17** تكوين المرايا المحدبة صوراً خيالية ومتعدلة وأصغر من الجسم دائمة.



## المرايا المحدبة

عرفت في بداية هذا القسم أن السطح الداخلي للملعقة الفلزية يعمل كمراة مغفرة. أما إذا قبّلتها فسيعمل السطح الخارجي لها **كمراة محدبة** وهي سطح عاكس منحنٍ للخارج، وحافاته تتحنى بعيداً من الملاحظ. ومن أمثلتها مرايا المراقبة في المتأخر، والمرايا الجانبية في السيارات. ماذا ترى عندما تنظر إلى الجهة الخلفية من الملعقة؟ ستري صورتك متعدلة ومصغرة.

توضح بعض صور المرايا الكروية المحدبة في **الشكل 17**. إذ تتشتت الأشعة المنعكسة عنها دائمة. ولذا ت تكون صورة خيالية فقط. وتقع البؤرة (F) ومركز التكبير (C) خلفها.

يوضح الرسم التخطيطي في **الشكل 17** طريقة تكوين الصورة في المرايا الكروية المحدبة. فيظهر في الرسم شعاعان فقط. ولكن تذكر أن هناك عدداً لا يهاباً من الأشعة المنعكسة من الجسم. فالشعاع 1 يصل إلى المرايا بشكل موازٍ للمحور الأساسي، وينعكس عنها. وپر امتداده في البؤرة خلف المرايا. أما الشعاع 2 فيسقط على المرايا وينعكس عنها، بحيث پر امتداده في البؤرة خلف المرايا. وكما يكون الشعاع 2 وامتداده خلف المرايا موازيين للمحور الأساسي. وبالتالي سيتشتت الشعاعان 1 و 2 ويلتقي امتدادهما خلف المرايا، وتكون صورة خيالية متعدلة ومصغرة.

**مجال الرؤية** قد تبدو استخدامات المرايا المحدبة قليلة لأن الصور التي تكوينها أصغر من الأجسام، إلا أن هذه الخاصية جعلت للمرايا المحدبة استخدامات عملية. فنتيجـة تكوينها صوراً مصغرة للأجسام، تتيح للملاحظ أن يشاهد مساحة كبيرة من حوله، وهي تسمى **مجال الرؤية**. كما تتمكن من رؤية الصورة من عدة زوايا، وبالتالي يكون مجال الرؤية من منظور واسع.

## تجربة مصغرة

**إيجاد البؤرة** كيف يمكنك ملاحظة البؤرة في المرايا الكروية؟

**الشكل 18** إن الصور المتكونة من مرآيا محدبة أصغر من الجسم. ما يزيد من مجال الرؤية ويفعل النطاق الممحجوب بالنسبة إلى السائق.

**شرح** لماذا قد يكون من البغيق كثابة تحذير يفيد أن الأجسام في المرآيا المحدبة الجانبية أقرب مما تبدو.



لذا تستعمل المرآيا المحدبة في المرآيا الجانبية للسيارات لتساعد في الرؤية الخلفية، كما يبيّن الشكل 18. وبالرغم من أنها توفر مجال رؤية واسعاً لكنها تصغر حجم صور الأجسام مما يجعلها تبدو أبعد مما هي عليه. لذا يوجد على المرآيا المحدبة الجانبية للسيارات تحذير يفيد أن الأجسام قد تكون أقرب مما تبدو عليه في الواقع.

## الفزياء في حياتك

**مشكلة هابل** في العام 1990، أطلقت الوكالة العالمية ناسا تلسكوب هابل الفضائي في مدار حول الأرض. وتوقع العلماء أن يقدم هابل صوراً واضحة من دون التشوّشات التي تحدث بفعل الغلاف الجوي. وبعد فترة وجبرة من إطلاقه، اكتشف العلماء أن صور هابل فيها زبغ كروي. في العام 1993، قام رواد الفضاء بتزويد جهاز صري تصحيحي يسمى COSTAR ليتمكن هابل من التقاط صور واضحة. ولعدة تزد على عقدتين، قدم هابل للعالم صوراً رائعة وساعد العلماء في إجراء اكتشافات مهمة عن الكون.

### تحديد مكان الصورة بالحسابات

يمكننا استخدام نموذج المرأة الكروية لاشتقاق معادلة رياضية بسيطة للمرأيا الكروية. ويجب أن نأخذ بعين الاعتبار التقريب الذي يفيد أن الأشعة الضوئية القريبة من المحور الرئيس والموازية له دائمًا هي تكون الصورة. والأخذ في هذا التقريب إضافة إلى قانون الانعكاس يقودنا إلى معادلة رياضية تربط بين البُعد البُؤري ( $f$ ) وموضع الجسم ( $x_0$ ) وموضع الصورة ( $x_i$ ) لمرأة كروية.

**معادلة المرأة الكروية**  
مقلوب البُعد البُؤري للمرأة الكروية يساوي حاصل جمع مقلوب بُعد الجسم ومقلوب بُعد الصورة عن المرأة.

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{x_i} + \frac{1}{x_0}$$

**القيم السالبة** عندما تكون الصورة خيالية. تكون قيمة بعد الصورة ( $x_i$ ) سالبة. ومعنى ذلك أنها تتكون خلف المرأة. وتنذر أن الصورة الخيالية تتكون من نقاط متعدّدات الأنسنة المتعكسة. وفي المرآيا المقعرة تتكون الصورة الخيالية عندما يقع الجسم بين البُؤرة والمرأة. وتكون البُؤرة أمام المرأة والبعد البُؤري موجبة. أما في المرآيا المحدبة فتكون البُؤرة خلف المرأة والبعد البُؤري سالباً.

عند استخدام هذه المعادلة في حل المسائل، تذكر أنها صحيحة بشكل تقريري، فهي لا تصحح الزبغ الكروي لأنها تستخدّم تقرير الأشعة الموازية للمحور. في الواقع إن أشعة الضوء المنبعنة من الجسم ياتجاه المرأة تتشتت. وبالتالي لا تكون جميع أشعة الضوء قريبة من المحور أو موازية له. عندما يكون قطر المرأة كبيرة مقارنة بنصف قطر تكورها لتقليل الزبغ الكروي تزودنا هذه المعادلة بصفات الصورة بدقة أكبر.

**التكبير** إن إحدى خواص المرايا الكروية الأخرى هي **التكبير** ( $m$ ). وهو نسبة طول الصورة إلى طول الجسم. ويمكن من خلال استخدام هندسة تطابق المثلثات إعادة كتامة هذه النسبة بدلالة بعد الصورة وبعد الجسم.

#### التكبير

يعرف تكبير جسم بواسطة مراة كروية بأنه حاصل قسمة طول الصورة على طول الجسم. وبساوى سالب بعد الصورة متسوياً على بعد الجسم.

$$m \equiv \frac{h_i}{h_0} = -\frac{x_i}{x_0}$$

وتدلنا إشارة مقدار التكبير فيما إذا كانت الصورة معتدلة أو مقلوبة. ففي حالة الصور الخيالية تكون قيمة  $x_i$  سالبة أي إن التكبير  $m$  موجباً، وتكون معتدلة دائماً ما يعني أن الطول موجب.

أما بالنسبة إلى الصور الحقيقية يكون بعد الصورة موجباً وبالتالي يكون التكبير سالباً. ويدلنا ذلك على أن الصورة تكون مقلوبة بالنسبة إلى الجسم. كما تدلنا الإشارة السالبة لمقدار طول الصورة على أنها مقلوبة. عندما يكون الجسم خلف مركز التكبير  $C$ . فإنّ القيمة المطلقة لتكبير الصورة الحقيقية تكون أقل من 1. ويعني ذلك أنّ الصورة أصغر من الجسم. أما إذا وقع الجسم بين مركز التكبير  $C$  والبؤرة  $F$  فإنّ القيمة المطلقة لتكبير تكون أكبر من 1. ويعني ذلك أنّ الصورة أكبر من الجسم.

#### بالفيزياء

#### ربط الرياضيات


جمع الكسور وطرحها عند استخدام معادلة المرأة لحل المسائل. عليك أولاً أن تعيد كتابة المعادلة رياضياً بحيث تجعل الكسر الذي يحوي المقدار الذي تريد حسابه على الطرف الأيسر من المعادلة والكسور الأخرى على الطرف الآخرين. وبعد ذلك تحسب مقدار الكسررين الموجوددين على اليمين. من خلال توحيد المقامات.

الفيزياء	الرياضيات
$\frac{1}{f} = \frac{1}{x_i} + \frac{1}{x_0}$	$\frac{1}{x} = \frac{1}{y} + \frac{1}{z}$
$\frac{1}{x_i} = \frac{1}{f} - \frac{1}{x_0}$	$\frac{1}{y} = \frac{1}{x} - \frac{1}{z}$
$\frac{1}{x_i} = \left(\frac{1}{f}\right)\left(\frac{x_0}{x_0}\right) - \left(\frac{1}{x_0}\right)\left(\frac{f}{f}\right)$	$\frac{1}{y} = \left(\frac{1}{x}\right)\left(\frac{z}{z}\right) - \left(\frac{1}{z}\right)\left(\frac{x}{x}\right)$
$\frac{1}{x_i} = \frac{x_0 - f}{fx_0}$	$\frac{1}{y} = \frac{z - x}{xz}$
$x_i = \frac{fx_0}{x_0 - f}$	$y = \frac{xz}{z - x}$
باتباع هذه الطريقة، يمكن استئناف العلاقات الرياضية التالية لحساب كل من بعد الصورة وبعد الجسم والبعد البؤري:	
$x_i = \frac{fx_0}{x_0 - f}$	$x_0 = \frac{fx_i}{x_i - f}$
	$f = \frac{x_i x_0}{x_i - x_0}$

تكوين الصور الحقيقية باستخدام مرآة م-curved لديك مرآة م-curved نصف قطر تكورها 20.0 cm. وضع جسم طوله 2.0 cm على بعد 30.0 cm منها. فما حلول الصورة؟ وما يُعدُّها من المرأة؟

### تحليل المسألة ورسمها

- ارسم رسمًا تخطيطيًّا للجسم والمرأة.
- ارسم شعاعين رئيسين لتحديد بعد الصورة في الرسم التخطيطي



المجهول	المعلوم
$x_i = ?$	$h_o = 2.0 \text{ cm}$
$h_i = ?$	$x_o = 30.0 \text{ cm}$
	$r = 20.0 \text{ cm}$

### حساب المجهول

بساوي البعد البؤري نصف نصف قطر التكبير.

$$f = \frac{r}{2}$$

$$\begin{aligned} \text{عُوْضٌ يَسْتَخْدِمُ} \\ x_o = 30.0 \text{ cm} \end{aligned} \quad \begin{aligned} &= \frac{20.0 \text{ cm}}{2} \\ &= 10.0 \text{ cm} \end{aligned}$$

استخدم معادلة المرآب الكروية. وحل لإيجاد بعد الصورة.

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{x_i} + \frac{1}{x_o}$$

$$x_i = \frac{fx_o}{x_o - f}$$

$$\begin{aligned} f = 10.0 \text{ cm}, \quad \text{عُوْضٌ يَسْتَخْدِمُ} \\ x_o = 30.0 \text{ cm} \end{aligned} \quad \begin{aligned} &= \frac{(10.0 \text{ cm})(30.0 \text{ cm})}{30.0 \text{ cm} - 10.0 \text{ cm}} \\ &= 15.0 \text{ cm} \end{aligned}$$

(صورة حقيقية أمام المرأة)

استخدام معادلة التكبير لحساب طول الصورة:

$$m \equiv \frac{h_i}{h_o} = \frac{-x_i}{x_o}$$

$$h_i = \frac{-x_i h_o}{x_o}$$

$$\begin{aligned} x_i = 15.0 \text{ cm}, \quad h_o = 2.0 \text{ cm}, \quad \text{عُوْضٌ يَسْتَخْدِمُ} \\ x_o = 30.0 \text{ cm} \end{aligned} \quad \begin{aligned} &= -\frac{(15.0 \text{ cm})(2.0 \text{ cm})}{30.0 \text{ cm}} \\ &= -1.0 \text{ cm} \end{aligned}$$

(صورة مصفرة ومقلوبة)

### تقييم الإجابة


- هل الوحدات صحيحة؟ كل المقادير بالستيometer.
- هل الإشارات منطقية؟ يتوافق البعد الموجب والارتفاع السالب مع الرسم.

### تطبيق

- حل المثال 2 باستخدام الرسم التخطيطي للأشعة. ووفق مقاييس رسم محدد.
- ضع جسمًا على بعد 36.0 cm أمام مرآة م-curved يبعد عنها البؤري 16.0 cm. ما بعد الصورة؟
- ضع جسمًا طوله 3.0 cm على بعد 20.0 cm من مرآة م-curved نصف قطرها 16.0 cm. أوجد طول الصورة وبعدها.
- لديك مرآة م-curved يبعد عنها البؤري 7.0 cm. إذا وضعت جسمًا طوله 2.4 cm على بعد 16.0 cm منها. فما طول الصورة؟
- تحفيز وضع جسم أمام مرآة م-curved يبعد عنها البؤري 10.0 cm. ف تكونت له صورة مقلوبة على بعد 16.0 cm من المرأة طولها 3.0 cm. فما طول الجسم؟ وما يُعدُّ عن المرأة؟

الصورة في مرآة المحدبة لحاجة مستودع يتم مراقبته من خلال مرآة محدبة بعدها البؤري  $-0.50 \text{ m}$ . فإذا وجدت رافعة شوكية طولها  $2.0 \text{ m}$  على بعد  $5.0 \text{ m}$  من المرأة، فكم تبعد صورتها عن المرأة، وما طولها؟

### ١ تحليل المسألة ورسمها



- ارسم رسماً تخطيطياً للمرأة والجسم.
- ارسم شعاعين رئيسيين لتحديد موقع الصورة في الرسم التخطيطي.

المجهول	المعلوم
$x_i = ?$	$h_0 = 2.0 \text{ m}$
$h_i = ?$	$x_0 = 5.0 \text{ m}$
	$f = -0.50 \text{ m}$

### ٢ حساب المجهول

استخدم المعادلة التي تربط بين البعد بين البؤري وبعد الجسم لإيجاد بعد الصورة.

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{x_i} + \frac{1}{x_0}$$

$$x_i = \frac{fx_0}{x_0 - f}$$

$$= \frac{(-0.50 \text{ m})(5.0 \text{ m})}{5.0 \text{ m} - (-0.50 \text{ m})}$$

(صورة خالية خلف المرأة)

▶ عَوْضٌ بِاستِخْدَامِ

استخدم المعادلة التي تربط بين طول الجسم وبعد الجسم والصورة لإيجاد طول الصورة.

$$m = \frac{h_i}{h_0} = \frac{-x_i}{x_0}$$

$$h_i = \frac{-x_i h_0}{x_0}$$

$$= \frac{-(-0.45 \text{ m})(2.0 \text{ m})}{5.0 \text{ m}}$$

(صورة مصفرة معندة)

### تقييم الإجابة

- هل الوحدات صحيحة؟ كل المقادير بالمتر.
- هل الإشارات منطقية؟ يشير البعد السالب إلى أن الصورة خالية، ويدل الطول الموجب على أن الصورة معندة. ويتوافق هذا مع الرسم التخطيطي.

## تطبيق

18. وضع جسم طوله  $20.0 \text{ cm}$  أمام مرآة محدبة بعدها البؤري  $-15.0 \text{ cm}$ . أوجد بعد الصورة باستخدام رسم تخطيطي بمقاييس رسم، وبمعادلة المرأة الرياضية.

19. مرآة محدبة بعدها البؤري  $-13.0 \text{ cm}$ . وضع أمامها مصابحاً قطره  $6.0 \text{ cm}$  على بعد  $60.0 \text{ cm}$  منها. فما بعد الصورة المنكوبة له وما قطرها؟

20. وضعت كرة قطرها  $7.6 \text{ cm}$  على بعد  $22.0 \text{ cm}$  من مرآة محدبة نصف قطر نكورها  $60.0 \text{ cm}$ . فما بعد الصورة المنكوبة للكرة وما قطرها؟

21. تتفاوت فتاة طولها  $18 \text{ m}$  على بعد  $2.4 \text{ m}$  من مرآة مراقبة في أحد المتاجر، وتبدو صورتها بطول  $0.36 \text{ m}$ .

- أوجد بعد الصورة؟
- أوجد البعد البؤري للمرأة؟

22. تحضير تحتاج إلى مرآة محدبة لتكوين صورة حجمها يساوي ثلاثة أرباع الجسم على بعد  $24 \text{ cm}$  خلف المرأة.

- أوجد بعد الجسم؟
- أوجد البعد البؤري المطلوب لذلك؟

## الجدول 1 نظام الاشارات وخصائص الصور في المرأة

الصورة	$m$	$x_i$	$x_0$	$f$	نوع المرأة
خيالية معكوسة جانبيا مساوية للجسم	موجبة 1 تساوي	$ x_i  = x_0$	$x_0 > 0$	$\infty$	مستوية
حقيقية مصفرة معكوسة (مقلوبة)	سالبة أقل من 1	$r > x_i > f$	$x_0 > r$		
حقيقية مكثرة معكوسة (معكوسة)	سالبة أكبر من 1	$x_i > r$	$r > x_0 > f$	+	مقعرة
مكثرة خيالية معتدلة	موجبة أكبر من 1	$ x_i  > x_0$ (سالب)	$f > x_0 > 0$		
خيالية مصفرة معتدلة	موجبة أقل من 1	$ f  >  x_i  > 0$ (سالب)	$x_0 > 0$	-	محدبة

## مقارنة المرايا

بماذا تختلف المرايا بعضها عن بعض؟ يلخص الجدول 1 خصائص الصور المكونة في مرآة لأجسام تقع على المحور الأساسي لها. لاحظ أن الصور الخيالية تتكون خلف المرأة دائمًا وأن يبعدها سالب دائمًا. وعندما تكون القيمة المطلقة للتکبير بين صفر واحد، تكون صورة الجسم مصغرّة. وتعني القيمة السالبة للتکبير أن الصورة مقلوبة بالنسبة إلى الجسم.

لاحظ أن كلًّا من المرأة المستوية والمرأة المحدبة يكون صوراً خيالية فقط، بينما تكون المرأة المقعرة صورة حقيقة للجسم عندما يقع على بعد أكبر من البعد البؤري. كما أنها تكون صورة خيالية للجسم عندما يقع على بعد أقل من البعد البؤري. وتعطى المرأة المستوية صوراً متساوية للأشياء، في حين تعطي المرايا المحدبة صوراً مصغرة. ما يجعل مجال الرؤية واسعاً فيها. وتعطي المرايا المقعرة صورة مكثرة للجسم عندما يقع ضمن نطاق البعد البؤري.

تكون المرأة المقعرة صورة مكثرة ومعتدلة للجسم عندما يقع بين البعد البؤري ونصف قطر التکكور. أما إذا وقع الجسم خلف نصف قطر التکكور فتتكون له صورة مصغرة ومقلوبة.

## القسم 2 مراجعة

27. الرسم التخطيطي للأشعة وضع جسم طوله 4.0 cm على بعد 14.0 cm من مرآة محدبة يبعدها البؤري 12.0 cm. ارسم مخططاً للأشعة بمقاييس رسم يوضح نسب الصورة وطولها. ثمتحقق من إجابتك باستخدام معادلات المرأة والتکبير.
28. نصف قطر التکكور وضع جسم طوله 6.0 cm أمام مرآة محدبة على بعد 16.4 cm فتتكون له صورة طولها 2.8 cm. أوجد نصف قطر تکكور المرأة؟
29. البعد البؤري استخدمت مرآة محدبة لتكون صورة طولها ثلثا طول الجسم وعلى بعد 12 cm خلف المرأة. أوجد البعد البؤري للمرأة؟
30. **التکبير الناقد** هل يمكن الزين الكروي أقل بالنسبة إلى مرآة إذا كان ارتفاعها أقل من نصف قطر تکكورها أم إذا كان ارتفاعها أكبر من نصف قطر تکكورها؟ فتّر إجابتك.
23. **الكلمة الرئيسية** إذا كنت تعرف البعد البؤري لمرآة مقعرة، فأين ينبغي لك وضع الجسم حتى تكون صورة مكثرة ومعتدلة؟ وهل تكون هذه الصورة حقيقة أم خيالية؟
24. التکبير وضع جسم طوله 20.0 cm أمام مرآة مقعرة يبعدها البؤري 9.0 cm. ما مقدار تکبير الصورة؟
25. موقع الجسم ينتج من وضع جسم أمام مرآة مقعرة يبعدها البؤري 12.0 cm وصورة حقيقة يبعد 22.3 cm عن المرأة. ما بعد الجسم؟
26. بعد الصورة وطولها وضع جسم طوله 3.0 cm على بعد 22.0 cm أمام مرآة مقعرة يبعدها البؤري 12.0 cm. أوجد بعد الصورة وطولها عن طريق رسم تخطيطي ووفق مقياس رسم. ثمتحقق من إجابتك باستخدام المعادلات الرياضية للمرأيا والتکبير.

## نظام الأرض البعيدة

### البحث عن كواكب خارج النظام الشمسي

بحث العلماء طرلاً عن أنظمة شمسية غير نظامنا. تخيل أنك تنظر إلى إضاءة شف ضوء كالموجود في الملعب وتحاول أن تتحقق من شكل بعوضة صغيرة بداخلها. إن هذه الشكلة دسها يواجهها علماء الفلك بعد البحث عن كواكب خارج النظام الشمسي، وتسمى كواكب خارجية.

#### من الصعب العثور عليها

من أحد الأسباب التي يجعل العثور على كوكب خارج النظام الشمسي مُحيراً هو أنها بعيدة جداً.

حيث تبلغ المسافة إلى أقرب نجم يجاور الشمس نحو 4.3 سنوات ضوئية. وفي حال كان الكوكب خارج النظام الشمسي يشبه الأرض، فإن قطره يساوي واحداً من مائة فقط من قطر النجم الذي يدور حوله. وبعتبر اكتشاف الضوء المتم نسبياً الذي ينعكس مباشرةً من كوكب خارج النظام الشمسي أمراً في غاية الصعوبة حتى بواسطة الأجهزة الحديثة.

**اكتشاف الكواكب خارج النظام الشمسي** إحدى الطرق التي يمكن لعلماء الفلك من خلالها العثور على كواكب خارج النظام الشمسي بمراقبة سطوة الضوء المنبعث من النجوم. قد يعمض ضوء النجم قليلاً عندما تمر كوكب خارج النظام الشمسي أمامه، ويفيس مقياس الضوء الذي يسمى فوتوميتر التغيرات التي تحدث في سطوة الضوء. يمكن رسم هذه التغيرات في مثلث بياني، مثل ذلك الموضح في الشكل 1.

**بعثة كيلر** تستخدمناساً مقياس ضوء لمسح منطقة من مجرتنا بحثاً عن كواكب خارج النظام الشمسي. والمرأة الأساسية المستعملة في مقياس الضوء هنا هي كروية وتنطلب تصحيح الزينة الكروية.

#### منطقة صالحة للاستيطان


تبحث بعثة كيلر بشكل خاص عن الكواكب الموجودة في المناطق الصالحة للعيش في النجوم.

يوضح الشكل 2 المنطقة الصالحة للاستيطان من نظامنا الشمسي، ومن المرجح وجود كوكب خارج النظام الشمسي توجد عليه مياه سائلة في "البقعة المناسبة" حول النجم، وربما يكون هذا الكوكب، مثل الأرض، موطنًا للكائنات الحية.

الشكل 2 في المخططة الصالحة للعيش تكون الصالحة للعيش تكون الطروف مناسبة لوجود الماء.



#### متحسن انتقال الخروج



الشكل 1 يمثل هذا الرسم سطوة الضوء المنبعث من النجم. ويوضح المحسن الرسم بالخط المقطع اعتماد ضوء النجم، ما قد يعني أن كوكباً من أمام النجم

#### المزيد من التعمق <<

**البحث** قم بزيارة موقع ويب بعثة كيلر التابعة لناسا للبحث عن كوكب اكتُشف حديثاً خارج النظام الشمسي. لخُصّ خُصائص ذلك الكوكب ولخُصّ الخصائص التي قد تختَّاج إليها للكائنات الحية لتعيش على هذا الكوكب.

### الدالة الرئيسية

تعكس كل الأسطح الضوء، إلا أن الأسطح الملساء تتميز بإنجها للصورة.

#### القسم 1 المرايا المستوية

- الدالة الرئيسية** زاوية سقوط شعاع ضوئي تساوي زاوية انعكاسه.
- وفقاً لقانون الانعكاس، فإن الزاوية التي يصنعاها الشعاع الساقط مع العمود المقام على السطح العاكس عند نقطة السقوط، تساوي الزاوية التي يصنعاها الشعاع المنعكس مع العمود المقام نفسه.
- $\theta_r = \theta_i$
- ينطبق قانون الانعكاس على كل من الأسطح الملساء والخشنة. يوجد على السطح الخشن أعمدة مقامة غير متوازية؛ وبالتالي، لا تتعكس الأشعة الساقطة المتوازية بشكل متوازن. فالسطح الخشن ينبع انعكاساً غير منتظم. يوجد على السطح الأملس أعمدة مقامة متوازية؛ وبالتالي، تعكس الأشعة الساقطة المتوازية بشكل متوازن. فالسطح الأملس ينبع انعكاساً منتظم. ينبع عن الانعكاس المنتظم تكون صور ظهر كأنها خلف مرايا مستوية.
- دائماً ما تكون الصورة المنكوبة في مرآة مستوية صورة خالية ولها حجم الجسم نفسه والاتجاه نفسه وعلى بعد المسافة نفسها التي يبعدها الجسم عن المرآة.

$$x_i = -x_o \quad h_i = h_o$$

#### الفردات

- انعكاس منتظم  
specular reflection
- انعكاس غير منتظم  
diffuse reflection
- مرآة مستوية  
plane mirror
- جسم  
object
- صورة  
image
- صورة خالية  
virtual image

#### القسم 2 المرايا الكروية

- الدالة الرئيسية** يمكن للمرايا الكروية أن تكون صوراً حقيقية وصورة خالية كما يمكنها تكبير حجم الصور أو تصغيرها.
- تتحدد المرأة الكروية المقعرة شكل كرة موجفة لها المركز الهندسي نفسه (c) ونصف قطر التكبير (r) كنصف قطر الكرة. إن البؤرة (F) للمرآة الكروية المقعرة هو النقطة التي تجتمع فيها أشعة الضوء الساقطة بموازاة المحور بعد انعكاسها عن المرأة. تُستخدم المرايا المقعرة في المصابيح اليدوية والكتشافات والتلسكوبات.
- يمكن تحديد موقع الصورة التي تكونت بواسطة مرآة كروية عن طريق رسم شعاعين بدأ من نقطة على الجسم إلى المرأة. ويكون تقاطع الشعاعين المنعكسيين أو امتدادهما هو موقع صورة نقطة الجسم. تتحدد المرأة المقعرة صورة حقيقية معكوسة عندما يكون موضع الجسم أكبر من البعد البؤري. تتحدد المرأة المقعرة صورة خالية متعدلة عندما يكون موضع الجسم أصغر من البعد البؤري. تكون المرأة المحدبة دائماً صورة افتراضية متعدلة وأصغر مقارنة بالجسم.
- ونظراً إلى أنها تكون صوراً أصغر من الأجسام، تبدو الصور التي تكونها المرايا المحدبة أبعد وتحيط مجالاً واسعاً للرؤية، ويمكن الاستفادة من هذا في مرآيا الرؤية الخلفية ومرايا المراقبة. يمكن استخدام نوعي المرايا بالتوافق لتكوين صور بالحجم والاتجاه والموضع المرغوب فيه. من أكثر استخدامات توظيف المرايا شيوعاً استخدامه في التلسكوبات.
- معادلة المرأة تربط بين بعد الصورة وبعد الجسم وبعد البؤري للمرآة الكروية.

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{x_i} + \frac{1}{x_o}$$

معادلة التكبير الخطى في المرايا الكروية تربط بين بعد الصورة وبعد الجسم وبعد البؤري كل منها.

$$m \equiv \frac{h_i}{h_o} = \frac{-x_i}{x_o}$$

#### الفردات

- مرآة مقعرة  
concave mirror
- محور أساسي  
principal axis
- بؤرة  
focal point
- بعد بؤري  
focal length
- صورة حقيقة  
real image
- زيغ كروي  
spherical aberration
- مرآة محدبة  
convex mirror
- تكبير  
magnification

## القسم 1 المرايا المستوية

إتقان المفاهيم

41. سقط شعاع ضوئي على مرآة بزاوية مقدارها 53° العتمود المقام. ما مقدار زاوية الانكسار؟ ما مقدار الزاوية الواقعه بين الشعاع الساقط والشعاع المنعكس؟

42. ارسم رسماً تخطيطياً للأشعة لمراية مستوية، لكي توضح أنه لكي تتمكن من رؤية نفسك كاملاً فيها من رأسك إلى قدميك، يتبقى أن تكون المرأة بنصف طولك ومثبطة بحيث يكون طرفها العلوي موازياً لرأسك.


43. إذا كان لديك مرآة مستوية صغيرة وتريد تثبيتها على حائط لكي تشاهد ركبتيك، فلأين يتبقى أن تضع المرآة؟

44. صورة في مرآة سعيد في التقاط صورة لصورته في مرآة مستوية. كما في الشكل 20. إذا كانت الكاميرا على بعد 1.2 m أمام المرأة، فقل ألي بعد يجب أن يرتكز عدسة الكاميرا لالتقاط الصورة؟



الشكل 20

- 45.** سقط شعاع من الضوء على مرآة بزاوية مقدارها  $60^\circ$  ودورت المرأة بعد ذلك بزاوية مقدارها  $18^\circ$ . كما في الشكل ما مقدار الزاوية التي يصفعها الشعاع المتعكس مع المرآة؟



لشکل 21


إتقان حل المسائل

38. سقط شعاع ضوئي على مرآة وكوّن معها زاوية مقدارها  $36^\circ$ . ما مقدار الزاوية بين الشعاع الساقط والشعاع المنعكس؟

39. سقط شعاع من الضوء على المرآة بزاوية قدرها  $38^\circ$  العكوس المقام. ما مقدار الزاوية التي يصنعها الشعاع المنعكس مع العمود المقام؟


40. في الشكل 19 مرتين مستوىين متلاقيتين بزاوية مقدارها  $90^\circ$ . فإذا سقط شعاع ضوئي على إدراهما بزاوية مقدارها  $30^\circ$  أجب على ما يلي:

  - ما الزاوية التي يعكس عندها شعاع الضوء من المرأة الأخرى؟
  - المرايا في الشكل 19 تعمل كالعاكس: وهو أداء عكس الأشعة الضوئية الساقطة عليها باتجاه معاكس ومواز لاتجاه الأشعة الساقطة. ارسم رسمًا تخطيطيًّا لكليتين في الشكل، وأرسم الأشعة المنكسة للتوضيح أن نظام المرايا هذا يحمل كالعاكس.



١٩ | ١٥ شعبان

60. صُفِّ الصورة التي تُنْظَهِرُ لِلْجَسْمِ فِي الشَّكْلِ 22 عَلَى أَنْهَا: حقيقة أم خيالية، مقلوبة أم معتملة، مصغرة أم كبيرة.



الشكل 22

61. مُسَأَّلَةٌ مَعْكُوسَةٌ اَكْتُبْ سَأَلَةً فِيزيَائِيَّةً تَتَضَمَّنْ أَجْسَامًا مِنْ وَاقِعِ الْحَيَاةِ. وَعَلَى أَنْ تَكُونَ الْمَعَادِلَةُ جَزْءًا مِنْ الْحَلِّ الْمُطَلُوبِ لَهَا:  $\frac{1}{x_0} + \frac{1}{x_i} = \frac{1}{0.40\text{ m}}$ .

62. مَهْمَةُ التَّرْتِيبِ فِي مَا يَلِي أَطْوَالُ أَجْسَامٍ وَأَطْوَالُ صُورِهَا فِي مَرَايَا. اَعْتَدْ عَلَى مَقْدَارِ التَّكْبِيرِ، وَرَتِّبْهَا بِحَسْبِ طُولِهَا مِنَ الْأَكْبَرِ إِلَى الْأَصْغَرِ.

- A. الجسم 0.5 cm. الصورة 1.0 cm.
- B. الجسم 0.5 cm. الصورة 2.0 cm.
- C. الجسم 1.0 cm. الصورة 2.0 cm.
- D. الجسم 7.0 cm. الصورة 5.0 cm.
- E. الجسم 2.0 cm. الصورة 3.0 cm.

63. مَرَأَةُ الأَسْنَانِ يَسْتَخْدِمُ طَبِيبُ الأَسْنَانِ مَرَأَةً صَغِيرَةً بِلَعْنِ نَصْفِ قَطْرِ تَكْوِرِهَا 40 mm لِمُشَاهِدَةِ التَّسْوِيسِ فِي أَسْنَانِ الْمَرِيضِ. إِذَا كَانَتِ الْمَرَأَةُ تَنْعَقُ عَلَى بَعْدِ 16 mm مِنَ الأَسْنَانِ، تَكْبِيرُ الصُّورَةِ؟

64. يُضَعُ جَسْمٌ طَوْلُهُ 24 mm عَلَى نَعْدِ 12.0 cm مِنْ مَرَأَةٍ مَفْقَرَةٍ. إِذَا سَقَطَ ضَوْءُ الشَّمْسِ عَلَى الْمَرَأَةِ وَتَنَوَّتْ صُورَةُ عَلَى بَعْدِ 3.0 cm مِنَ الْمَرَأَةِ، اَرْسِمْ رَسْمًا خَطِيطِيًّا لِلْأَشْعَةِ تَوْضِعُ مِنْ خَلَالِهِ مَوْقِعَ الصُّورَةِ. اَسْتَخْدِمْ مَعَادِلَةَ الْمَرَأَةِ لِحَسْبِ بَعْدِ الصُّورَةِ. وَمَا طَولُ الصُّورَةِ؟

65. يُضَعُ جَسْمٌ طَوْلُهُ 3.0 cm عَلَى بَعْدِ 22.4 cm مِنْ مَرَأَةٍ مَفْقَرَةٍ. إِذَا كَانَ نَصْفُ قَطْرِ تَكْوِرِهَا يَسْاوِي 34.0 cm، فَمَا بَعْدُ الصُّورَةِ. وَمَا طَولُهَا؟

66. الْكَرَاتُ الْفَلَزِيَّةُ الْمَصْقُولَةُ الْبَشِّيَّةُ عَلَى الْأَعْمَدَةِ عَلَى أَطْرَافِ الْحَدَائِقِ تَعْمَلُ عَمَلَ الْمَرَايَا الْمَحْدِيدَةِ. إِذَا كَانَ هَنَالِكَ طَاطَرٌ طَوْلُهُ 12 cm عَلَى شَجَرَةٍ تَبَعُدُ 1.5 m مِنْ إِحْدَى هَذِهِ الْكَرَاتِ قَطْرُهَا 40.0 cm وَتَنَوَّتْ لَهُ صُورَةُ عَلَيْهَا. فَمَا بَعْدُ الصُّورَةِ، وَمَا طَولُهَا؟

46. مَرَأَتَانِ مُسْتَوَيَّاتِانِ، الْرَّأْوِيَّةُ بَيْنَهُمَا مَقْدَارُهَا 45°. إِذَا سَقَطَ شَعَاعٌ ضَوْئِيٌّ عَلَى إِحْدَاهُمَا وَكَوَنَ زَوْدِهَا 30° مِنْ الْمَقْمَمِ، وَانْعَكَسَ بِاتِّجَاهِ الْمَرَأَةِ الثَّانِيَةِ. مَا مَقْدَارُ زَوْدِهَا انْعَكَسَهُ عَنِ الْمَرَأَةِ الثَّانِيَةِ؟

## القسم 2 المرايا الكروية

### إتقان المفاهيم

47. إِذَا تَكَوَّنَتْ صُورَةٌ خَيَالِيَّةٌ لِجَسْمٍ فِي مَرَأَةٍ مَفْقَرَةٍ، أَيْنَ مِنَ الْمُمْكِنِ أَنْ يَقْعُدْ هَذَا الْجَسْمُ؟

48. مَا الْعِيبُ الْمُوْجَوْدُ فِي الْمَرَايَا الْكَرْوِيَّةِ الْمَفْقَرَةِ، وَمَا سَبَبُ ذَلِكِ الْعِيبِ؟

49. مَا الْمَعَادِلَةُ الَّتِي تَرْبِطُ بَيْنَ الْبَعْدِ الْبُؤْرِيِّ وَبَعْدِ الْجَسْمِ وَبَعْدِ الصُّورَةِ؟

50. مَا الْعَلَاقَةُ بَيْنَ نَصْفِ قَطْرِ التَّكْوِرِ فِي مَرَأَةٍ مَفْقَرَةٍ وَالْبُؤْرِيِّ فِيهَا؟

51. إِذَا كَنْتَ تَعْرِفُ بَعْدَ الصُّورَةِ وَبَعْدَ الْجَسْمِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْمَرَأَةِ الْكَرْوِيَّةِ، فَكَيْفَ يُمْكِنُ تَحْدِيدُ تَكْبِيرِ الْمَرَأَةِ؟

52. لِمَاذَا تُسْتَخْدِمُ الْمَرَايَا الْمَحْدِيدَةُ كَمَرَايَا لِلْرَّوْيَةِ الْخَلْفِيَّةِ؟

53. لِمَاذَا لَا يُمْكِنُ تَكْوينُ صُورَةً حَقِيقِيَّةً فِي الْمَرَأَةِ الْمَحْدِيدَةِ؟

### إتقان حل المسائل

54. مَدِينَةُ الْأَلْعَابِ وَقَدْ خَالَدَ أَمَامَ مَرَأَةً مَحْدِيدَةً فِي مَدِينَةِ الْأَلْعَابِ وَلَاحَظَ تَكَوُنَ صُورَةَ لَهُ طَوْلَهَا 0.60 m، فَإِذَا كَانَ حَجْمُ الصُّورَةِ إِلَى حَجْمِ الْجَسْمِ يَسْاوِي  $\frac{1}{3}$ . فَكَمْ يَبْلُغُ طَولُ خَالِدِ؟

55. إِذَا وَضَعَتْ جَسِينَا عَلَى بَعْدِ 30.0 cm مِنْ مَرَأَةٍ مَفْقَرَةٍ يَعْدُهَا الْبُؤْرِيِّ 15.0 cm، وَكَانَ طَوْلُ الْجَسْمِ 1.8 cm، اَسْتَخْدِمْ مَعَادِلَةَ الْمَرَأَةِ لِإِيجَادِ بَعْدِ الصُّورَةِ وَطَولِهَا.

56. يَبْلُغُ الْبَعْدُ الْبُؤْرِيِّ لِمَرَأَةٍ مَفْقَرَةٍ 10.0 cm، كَمْ يَسْاوِي نَصْفُ قَطْرِ تَكْوِرِهَا؟

57. مَرَأَةُ الرَّوْيَةِ الْخَلْفِيَّةِ أَوْجَدَ مَقْدَارَ الْبَعْدِ الَّتِي تَظْهِرُ فِيهِ صُورَةً سِيَارَةً فِي مَرَأَةٍ مَحْدِيدَةٍ لِسِيَارَةٍ أُخْرَى أَمَامَهَا يَعْدُهَا الْبُؤْرِيِّ 26.0 m، وَكَانَ الْبَعْدُ مَا بَيْنَ السِّيَارَةِ الْخَلْفِيَّةِ وَمَرَأَةِ السِّيَارَةِ الْأَمَامِيَّةِ 10.0 m.

58. صُورَةُ النَّجْمِ إِذَا جَمَعَ الضَّوْءُ الْمُبَثَّعُ عَنْ نَجْمٍ بِوَاسِطَةِ مَرَأَةٍ مَفْقَرَةٍ، مَا الْمَسَافَةُ الَّتِي تَبَعُدُهَا صُورَةُ النَّجْمِ عَنِ الْمَرَأَةِ إِذَا كَانَ نَصْفُ قَطْرِ تَكْوِرِهَا يَسْاوِي 150 cm؟

59. تَظْهِرُ صُورَةٌ خَيَالِيَّةٌ عَلَى بَعْدِ 9 cm مِنْ مَرَأَةٍ مَحْدِيدَةٍ، إِذَا كَانَ الْجَسْمُ يَقْعُدْ عَلَى بَعْدِ 18 cm مِنْهَا، كَمْ تَبْلُغُ نَسْبَةُ تَكْبِيرِ الصُّورَةِ؟

74. وضع كيف يمكنك استخدام مرآة كروية (محدية أو مقرفة) في الحصول على صورة حقيقة.

75. مرآيا الرؤبة الخلفية يكتب على مرآيا الرؤبة الخلفية الخارجية في السيارات غالبا التحذير التالي "الأجسام في المرآة أقرب مما تبدو عليه". ما نوع هذه المرآيا؟ وكم يستفيد منها السائق؟

76. ما صفات الصورة التي تظهر في المرأة المحدية المبينة في الشكل 25.



الشكل 25

### مراجعة عامة

77. طرح مسألة تكمل هذه المسألة بحيث تكون الصورة الناتجة خالية: "وضع جسم على مسافة ... من مرآة ...."

78. وضع جسم على مسافة 4.4 cm أمام مرآة مقرفة نصف قطرها 24.0 cm. أوجد بعد الصورة باستخدام معادلة المرأة.


79. سقط شعاع ضوء على مرآة مستوية وصنع زاوية مقدارها 28° مع العمود المقاوم، إذا تحرك مصدر الضوء بحيث زادت الزاوية بمقدار 34°. فما مقدار زاوية الانكسار الجديدة؟

80. مرآة مقرفة نصف قطر تكُورها 26.0 cm. وضع جسم طوله 2.4 cm على بعد 30.0 cm منها. ما بعد الصورة؟ وكم طولها؟

81. إذا أردت استخدام مرآة محدية لتكون صورة لجسم، بحيث يكون طولها نصف طول الجسم وعلى بعد 36 cm خلف المرأة، ما البعد البؤري المطلوب في المرأة؟

82. كم يبلغ نصف قطر تكُور مرآة مقرفة تكون صورة لجسم كبيرة بمقدار 13.2 على بعد 20.0 cm منها؟

77. أوجد بعد وطول صورة الجسم الموضح في الشكل 23.



الشكل 23

83. مرآة الصانع يفحص الصانع ساعة يبلغ قطرها 3.0 cm عن طريق وضعها على مسافة 8.0 cm أمام مرآة مقرفة بجدها البؤري 12.0 cm. أين تقع صورة الساعة؟ كم يبلغ قطر الصورة؟

### تطبيق المفاهيم

69. **الفكرة الرئيسية** يشتت الطريق الجاف الضوء بشكل أكبر من الطريق المبلل. اعتمادا على الشكل 24، فسر سبب ظهور الطريق المبلل أكثر سوادا من الطريق الجافة بالنسبة إلى ساق السيارة.



اسفلت رطب



اسفلت جاف


70. صفحات الكتاب لماذا يستحسن أن تكون صفحات الكتاب خشنة وليس ملساء أو مصوفة؟

71. حدد مكان الصورة التي تظهر في المرأة المقرفة وصفاتها عندما يقع الجسم عند مركز تكُورها.

72. إذا وقع الجسم خلف مركز تكُور إحدى المرآيا الكروية المقرفة، حدد مكان الصورة وصفاتها.


73. التلسكوب إذا أردت طلب مرآة مقرفة كبيرة من أجل تلسكوب عالي الجودة، فهل تطلب مرآة كروية أم مرآة قطع مكافئ؟ فسر إجابتك.

90. يتحرك الجسم في الشكل 27 من الموضع 1 إلى الموضع 2. انسخ الرسم التخطيطي على دفترك، وأكمل رسم الأشعة لتوضح كيف تغير الصورة.




الشكل 27

- 91 حل واستنتاج يقع الجسم الموجود في الشكل 28 على مسافة 22 cm من مرآة مقعرة. فما البعد البؤري للمرآة؟



الشكل 28

92. طبق المفاهيم تدحرج الكرة الموجودة في الشكل 29 ببطء صوب المرأة المققرة الموجودة عن اليدين. صيف كيفية تغير حجم صورة الكرة أثناء تدحرجها.




الشكل 29

83. وضعت كرة على مسافة 22 cm أمام مرآة كروية وكانت صورة خيالية. إذا استبدلت المرأة الكروية بمرآة مستوية. ستطهر الصورة أقرب إلى المرأة مسافة 12 cm. ما نوع المرأة الكروية المستخدمة؟

84. خدعة بصورية يستخدم المخادع البصري مرآة مقعرة بعدها البؤري 8.0 m لإظهار جسم مخفى يصل طوله إلى 18.0 m ويقع على بعد 3.0 m جمهوره. أوجد طول صورة الجسم وبعدها باستخدام الرسم التخطيطي للأشعة.

85. انسخ الشكل 26 على ورقة. استخدم مخططات الأشعة لتكوين صورة للجسم في المرأة لإيجاد ارتفاع الصورة وموضعها.



الشكل 26

86. وضع جسم طوله 4.0 cm على مسافة 12.0 cm من مرآة محدبة. إذا كان طول صورة الجسم 2.0 cm على مسافة 26.0 cm فكم يساوي البعد البؤري للمرآة؟ ارسم رسماً تخطيطياً للأشعة للإجابة عن السؤال. استخدم معادلة المرأة وعادلة التكبير للتحقق من الإجابة.

87. مرأة المراقبة يستخدم محل تجاري مرآيا لمراقبة الممتلكات داخله. إذا كان نصف قطر تكور كل منها 3.8 m.  
a. أين تقع صورة الزبون الذي يقف على مسافة 6.5 m أمام المرأة؟

- b. كم يبلغ طول صورة الزبون الذي يصل طوله إلى 1.7 m

88. مرأة المعاينة يريد المهندس صنع مرآة تكون صورة مختلفة للجسم مكثرة 7.5 مرة إذا تم ثبيتها على بعد 14.0 mm من طرف الآلة.

- a. ما نوع المرأة التي يمكنها القيام بذلك؟

- b. أوجد نصف قطر تكورها؟

89. تتفق فتاة طولها 1.6 m على مسافة 3.2 m من مرآة محدبة. ما البعد البؤري للمرأة إذا كان طول صورة الفتاة 0.28 m

٩٨. تكسس المرايا الضوء بسبب طبقة الطلاء الفلزية الموجودة

عليها. ابحث عن أحد من التالي واكتب تقريرًا عنه:

a. الأنواع المختلفة لطبقات الطلاء المستخدمة ومزايا وعيوب كل منها

b. صقل الألمنيوم بصورة دقيقة حتى يصل إلى درجة عالية جدًا من النعومة. وهذا ينفي في عدم حاجة الزجاج في تصنيع المرايا.

٩٣. حل واستنتاج إن النظام المتككون من مرتدين والموضّح

في الشكل ١٤ هو نفسه المطبق في تلسكوب جريجوري. إذا كان نصف قطر نكورة المرأة الكبيرة المقصورة يساوي  $l$  وبعدها  $f$ . فنفع المرأة الصغيرة على مسافة  $X$  بحيث إن  $X < f$ .


c. لماذا تكون المرأة الثانية مقصورة؟

٩٤. تأخذ ملعقة التقديم الكبيرة شكلاً كرويًّا وتكون عاكسة من وجهها الخارجي والداخلي على حد سواء. إذا أمسكت الملعقة على مسافة 3 cm ونظرت إلى وجهك في الجزء الذي تحمل به الطعام، فستكون صورتك على مسافة 9 cm خلف الملعقة. إذا قلبت الملعقة، ففي أي مكان ستقع صورتك؟

٩٥. إن الصورة التي تظهر في المرأة الأساسية في تلسكوب كاسيجررين. كما هو موضح في الشكل ٣٠، هي للجسم الموجود في المرأة الثانية. إذا كان البعد البؤري للمرأة الأساسية المقصورة 1.0 m والبعد البؤري للمرأة الثانية المحدبة -0.50 m. تقع المرأة الثانية على مسافة 0.25 m من بؤرة المرأة الأساسية.

a. ما بعد الجسم؟ وأين تقع الصورة؟

b. ما تكبير المرأة المحدبة؟ هل تكسس الصورة؟



الشكل ٣٠

٩٦. حل واستنتاج يستعمل في بعض التلسكوبات

ترتيب بصري يسمى "كاسيجررين" كالمبين في الشكل ٣٠. إذ يستخدم في هذا التلسكوب مرآة محدبة ثانية توضع بين المرأة الأساسية وبؤرتها. وكما تعرف فالمرأة المحدبة تكون صورًا خالية فقط، إلا أنها في هذا التلسكوب تكون صورًا حقيقية. فسر ذلك.

### الكتابة في الفيزياء

٩٧. ابحث عن طريقة تُستخدم في صقل وتلميع وفحص المرايا المستخدمة في التلسكوبات العاكسة. كما يمكنك الكتابة عن الطريقة التي يستخدمها هواة علم الفلك في صياغة التلسكوبات باليد. واكتب تقريرًا في ذلك واعرضه على زملائك في الصف.

7. وضع جسم على بعد 21 cm أمام مرآة م-curved بعدها البؤري يساوي 14 cm. فما بعد صورته؟


A. 8.4 cm      C. 242 cm      B. 42 cm      D. 28.4 cm

8. اصطدام شعاع ضوئي بمراية مستوية بزاوية قدرها 23° مع العمود المقاوم. كم تكون زاوية انكساره عن المراية؟

A. 67°      C. 23°      B. 46°      D. 134°

9. انظر إلى الشكل أدناه، ولاحظ كيف أن امتدادات الأشعة لا تنتهي في البؤرة بشكل دقيق. أين تحدث هذه المشكلة؟

A. لجميع المرابيب الكروية.  
B. لجميع مرابيب القطع المكافئ.  
C. المرابيب الكروية المعيبة فقط.  
D. مرابيب القطع المكافئ المعيبة فقط.



### أسئلة ذات إجابات مفتوحة

10. يوجد جسم طوله 5.0 cm على بعد 20.0 cm من مرآة محدبة بعدها البؤري 14.0 cm. ارسم مخطط الأشعة بمقاييس رسم مناسب لتبيين موقع صورة الجسم وطولها.

### الاختيار من متعدد

1. أين يقع جسم إن كانت الصورة المتكوّنة له في مرآة م-curved أصغر من الجسم؟

A. عند بؤرة المرأة  
B. بين المرأة والبؤرة  
C. بين البؤرة ومركز تكبير المرأة  
D. أبعد من مركز تكبير المرأة

2. تكون مرآة م-curved بعدها البؤري 16.0 cm بعد 38.6 cm من المرأة. فما المسافة التي يبعدها الجسم من أمام المرأة؟

C. 22.6 cm      A. 2.4 cm  
D. 27.3 cm      B. 11.3 cm

3. استخدمت مرآة محدبة لتكون صورة لجسم حجمها ثلاثة أرباع حجمه وعلى بعد 8.4 cm خلف المرأة. كم يبلغ البعد البؤري للمرأة؟

C. -6.3 cm      A. -34 cm  
D. -4.8 cm      B. -11 cm

4. تكون مرآة م-curved صورة مقلوبة لجسم طولها 8.5 cm. وتقع على بعد 34.5 cm أمام المرأة. إذا كان البعد البؤري للمرأة 24.0 cm. فكم يبلغ طول الجسم؟

C. 14 cm      A. 2.3 cm  
D. 19 cm      B. 3.5 cm

5. وضع كوب على بعد 17 cm من مرآة م-curved، فظهرت صورة الكوب على بعد 34 cm أمام المرأة. فما مقدار تكبير واتجاه صورة الكوب؟

A. 2.0. مقلوبة  
B. 0.5. مقلوبة  
C. 2.0. معتدلة  
D. 0.5. معتدلة

6. كم يبلغ البعد البؤري لمرآة م-curved تقوم بتكبير الجسم الواقع على بعد 30 cm منها بمعامل +3.2؟

C. 44 cm      A. 23 cm  
D. 46 cm      B. 32 cm

# الانكسار والعدسات

**الفكرة الرئيسية** تعمل العدسات على انكسار الضوء وتكون صور.

## الأقسام

1 انكسار الضوء

2 العدسات المحدبة والم-curved


3 تطبيقات العدسات

## التجربة الاستهلالية

### شكل الماصة المكسورة

كيف تصف شكل انكسار ماصة المشروبات  
الموضوعة في كوب من الماء؟





Chapter Sourced from: 8. Refraction and Lenses, Chapter 18, from Glencoe Physics: Principles & Problems ©2017

الوحدة 8 • الانكسار والعدسات 205

# انكسار الضوء

القسم 1

هل سبق لك أن لاحظت قوس المطر في السماء عندما تسقط  
الشمس بعد هطول الأمطار؟ يعد قوس المطر مثلاً لتفاعل الضوء  
مع الأوساط الشفافة. ما الشروط التي يجب توافرها حتى يظهر  
قوس المطر للعيان؟ هل حاولت يوماًاقتراب من قوس المطر كي  
تنمسه؟

## الفيزياء في حياتك

### الضوء والحدود الفاصلة بين وسطين

ماذا يحدث للضوء عندما يمر عبر النافذة؟ عندما يسقط الضوء على وسط شفاف أو شبه شفاف، تعكس بعض أشعة الضوء من سطح الوسط ويمر ببعضها الآخر عبر الوسط. تذكر أنه عندما يعبر الضوء حداً فاصلًا بين وسطين، فإنه ينحرف عن مساره. هل سبق ونظرت إلى قاع بركة السباحة عبر الماء وظنت أن الماء يبدو ضحلاً أكثر مما هو عليه في الحقيقة؟ هل سبق ونظرت إلى كوب من الماء يحتوي على ماصة أو ملعقة تبدو كأنها مكسورة عند السطح؟ تحدث هاتان الظاهرتان الغريبتان بسبب انحراف الضوء عند الحدود الفاصلة بين الوسطين. يُعرف انحراف الضوء عند انتقاله من وسط ما إلى وسط آخر بالانكسار.

**الانكسار** لاحظ أشعة الضوء في الشكل 1. حيث تسقط هذه الأشعة من الهواء على ثلاثة أوساط مختلفة هي: الماء والزجاج والألماس. إذا كانت زاوية سقوطها على الأوساط الثلاثة هي نفسها، ما الذي تلاحظه على أشعة الضوء بعد مرورها الحد الفاصل في كل من الأوساط الثلاثة؟ لعلك لاحظت أن أشعة الضوء تنحرف عند مرورها عبر الحدود الفاصلة.

ما وجه الاختلاف الذي تلاحظه بين الأوساط الثلاثة الموضحة؟ تنحرف أشعة الضوء عند انتقالها من الهواء إلى الألماس بدرجة أكبر منها عند انتقالها من الهواء إلى الماء أو إلى الزجاج. تعتمد هذه الظاهرة على خصائص الأوساط التي تنتقل منها إليها أشعة الضوء.

تنتقل أشعة الضوء في الشكل 1 من الهواء وتدخل وسطاً آخر بزاوية نفسها. في رأيك، ما العلاقة بين زاوية سقوط الضوء عند مروره عبر الحد الفاصل بين وسطين ومقدار الانكسار الذي يحدث له؟



### العكرة الرئيسة

يعتمد مقدار الانكسار عند الحد على معامل انكسار الوسطين وزاوية السقوط.

### الأسئلة الرئيسة

- ما قانون سبل لأنكسار؟
- ما المقصود بمعامل الانكسار؟
- كيف يحدث الانكسار الداخلي الكلي؟
- كيف يؤدي الانكسار إلى ظواهر بصرية متعددة؟

### مراجعة المفردات

الانكسار **refraction**: تغير اتجاه الموجات عند الحد الفاصل بين وسطين مختلفين

### مفردات جديدة

معامل الانكسار

index of refraction


زاوية حرجة critical angle


انعكاس داخلي كلي

total internal reflection

dispersion تحلل الضوء

الشكل 1 ينكسر الضوء عند مروره عبر حد فاصل بين وسطين. ويعتمد مقدار الانكسار على خصائص الأوساط. (الزوايا غير مرسومة بقياس رسم)





**الشكل 2** عند انتقال الضوء من الهواء إلى الزجاج، ينكسر مقترباً من العمود المقام على السطح الأول للزجاج، ثم عند نفاذة من الزجاج إلى الهواء مرة أخرى ينكسر متبعداً عن العمود المقام على السطح الثاني للزجاج.

**الفيزياء في حياتك**  
الجلوس في الهواء: هل سبق لك وأن شاهدت شخصاً يجلس في الهواء؟ في الواقع إنه يجلس فوق كتلة شفافة معامل انكسارها يساوي معامل انكسار الهواء. هل تستطيعي الآن تفسير كيف يمشي شخص حافي القدمين على سطح الماء؟

درس كل من رينيه ديكارت وويلبرورد سنل الانكسار للمرة الأولى في القرن السادس عشر من خلال إسقاط حزمة ضيقة من الضوء على وسط شفاف، مثل الزجاج كما يبيّن الشكل 2. وفاساً زاوية السقوط وزاوية الانكسار، إذ إن زاوية السقوط ( $\theta_1$ ) هي الزاوية المحصورة بين الشعاع الساقط وعمود الانكسار. أما زاوية الانكسار ( $\theta_2$ ) فهي الزاوية المحصورة بين الشعاع المنكسر وعمود الانكسار.

**معامل الانكسار** اكتشفت سنل أنه عندما ينتقل الضوء من الهواء إلى وسط شفاف آخر فإن ثمة علاقة بين جيب (sin) زاويتي السقوط في الهواء والانكسار في الوسط الثاني، إذ يحدد **معامل الانكسار** ( $n$ ) تلك العلاقة. أما معامل الانكسار للوسط فتحدده خصائص ذلك الوسط، والجدول 1 يبيّن قيم  $n$  لعدد من الأوساط الشفافة. يأجراته العديد من التجارب توصل سنل إلى قانون الانكسار الذي عرف باسمه، والذي ينطبق عند نفاذ الضوء عبر الحد الفاصل بين وسطين مختلفين.

## قانون سنل للانكسار

قانون سنل للانكسار  
حاصل ضرب معامل انكسار الوسط الأول في جيب زاوية السقوط يساوي حاصل ضرب معامل انكسار الوسط الثاني في جيب زاوية الانكسار.


$$n_1 \sin \theta_1 = n_2 \sin \theta_2$$

استخدم **الشكل 2** والجدول 1 لتوضيح مدى تحقق قانون سنل عند انتقال الضوء عبر قطعة زجاج ذات سطوح متوازية، مثل لوح الزجاج في النافذة. إذ ينكسر الضوء مرتين، الأولى عند دخوله الزجاج والثانية عند خروجه منه. عندما ينتقل الضوء من الهواء إلى الزجاج، فإنه ينعكس من وسط معامل انكساره قليل ( $n = 1$ ) إلى وسط معامل انكساره أكبر ( $n = 1.52$ ). وينحرف الضوء نحو العمود المقام. عند انتقال الضوء من الزجاج إلى الهواء، فإنه ينعكس من وسط معامل انكساره أكبر (1.52) إلى وسط معامل انكساره  $n$  أقل (1.00). وينحرف الضوء بعيداً من العمود المقام. تحدد قيمة  $n$  النسبة ما إذا كان الضوء سينحرف مقترباً من العمود المقام أم مبتعداً عنه. لاحظ اتجاه الشعاع عند خروجه من الزجاج، إنه في الاتجاه نفسه كما كان قبل سقوطه على الزجاج. وذلك لأنَّ الحدين يفصلان بين الوسطين عينهما.

الجدول 1	
معاملات انكسار الضوء الأصفر ( $\lambda = 589 \text{ nm}$ ) في الفراغ	
$n$	الوسط
1.00	الفراغ
1.0003*	هواء
1.33	الماء
1.36	الإيثانول
1.52	الزجاج المصقول
1.54	الكورتن
1.62	الزجاج الصواني
2.42	اللياس

\*تضمن القيمة المحددة للهواء أرقاماً معنوية إضافية لتبيّنها عن القيمة المحددة للفراغ. استخدم قيمة  $n$  بمقدار 1.00 في حل المسائل.

نقطة حزمه من الضوء على لوح من الزجاج المقصوق بزاوية  $30.0^\circ$ .  
فما زاوية انكسار شعاع الضوء؟



### **١- تحليل المسألة ورسم مخطط لها**

- ارسم مخططاً للحد الفاصل بين الهواء والزجاج المصقول.
  - ارسم شعاع الضوء وضع التسميات  $\theta_1$  و  $\theta_2$  و  $n_1$  و  $n_2$ .

<b>المجهول:</b>	$\theta_2 = ?$	<b>المعلوم:</b>	$\theta_1 = 30.0^\circ$
			$n_1 = 1.00$
			$n_2 = 1.52$

حساب زاوية الانكسار

استخدم قانون سبل لإيجاد جيب زاوية الانكسار.

$$\begin{aligned}
 n_1 \sin \theta_1 &= n_2 \sin \theta_2 \\
 \sin \theta_2 &= \left( \frac{n_1}{n_2} \right) \sin \theta_1 \\
 \theta_2 &= \sin^{-1} \left( \left( \frac{n_1}{n_2} \right) \sin \theta_1 \right) \\
 &= \sin^{-1} \left( \frac{1.00}{1.52} \right) \sin 30.0^\circ \\
 &= 19.2^\circ
 \end{aligned}$$

$$n_1 = 1.00, n_2 = 1.52, \theta_1 = 30.0^\circ$$

تقييم الاجابة 3

هل هذه الإجابة معقولة؟ تنتقل حزمة الضوء إلى وسط ذي  $n$  أعلى، يجب أن تكون  $\theta_2$  أقل من  $\theta_1$ .

طبيق

- ٤.** غمرت كتلة من مادة شفافة في الماء. فانتقل الضوء إليها من الماء بزاوية سقوط تساوي  $31^\circ$ . ثم نفذ داخلها بزاوية انكسار تساوي  $27^\circ$ . ما معامل انكسار تلك المادة؟

**٥.** تحفيز ينتقل الضوء من الهواء إلى وسط آخر بزاوية سقوط في الهواء تساوي  $45.0^\circ$  وزاوية انكسار في الوسط الآخر  $27.70^\circ$ . ما الوسط الآخر؟

**٦.** ينتقل حزمة لبز من الهواء إلى الإيثانول بزاوية سقوط  $37.0^\circ$ . كم تبلغ زاوية الانكسار؟

**٧.** عندما ينتقل الضوء من الهواء إلى الماء فإنه يتضمن داخل الماء بزاوية انكسار مقدارها  $25.0^\circ$  بالنسبة إلى العمود المقام. جد زاوية سقوطه في الهواء.

**٨.** ينتقل الضوء من الهواء إلى واجهة من الألناس بزاوية  $45.0^\circ$ . كم تبلغ زاوية الانكسار؟


الخطاب

**القمر** ينبع بحسب المضار الضوء يظهر القمر بألوان أحمر أشأء ظاهرة خسوف القمر، كما هو موضح في الشكل 3. ويحدث خسوف القمر عندما تنجذب الأرض ضوء الشمس عن القمر، وتغطي لهذا. من المتوقع أن يكون القمر مظلما تماماً بسبب وقوفه في منطقة الظل. إلا أنه حينما ينتقل الضوء بين وسطي الغراغ والغلاف الجوي للأرض فإنه ينكسر منحرفا نحو الأرض، أي باتجاه القمر. وحيث إن الغلاف الجوي للأرض يشتت الأطوال الموجية القصيرة للضوء وهي الأزرق والأخضر. فإن الضوء الأحمر هو الذي ينعدم منحرفا نحو القمر. فيظهر القمر في حالة الخسوف باللون الأحمر.



**الشكل 3** بيده القمر أحمر أثناء خسوف القمر بسبب الانكسار.

## معامل الانكسار



**الشكل 4** يختلف كل مقدمة موجة السطح الناصل منقلة من الهواء إلى الزجاج بزاوية ما. تقل سرعة جزء من مقدمة الموجة وينكسر الشعاع، وحيث إن سرعة الموجة تقل وبقى التردد ثابتاً، لكي تكون العلاقة  $\frac{v}{f} = \lambda$  صحيحة، يجب أن يقل الطول الموجي.  
استدل أي الوسطين ذو معامل انكسار أعلى؟

نصف معامل الانكسار لوسط ما مقدار الانحراف في مسار الضوء عند دخوله هذا الوسط. لكن هل من دلالة أخرى لمعامل الانكسار؟ عند النظر إلى الضوء على أنه موجات، نجد هناك علاقة بين انتشار الضوء في الوسط ومعامل انكساره. لقد أدرج قانون سهل قبل وضع النموذج الموجي، لكن بعد تطوير النموذج الموجي الذي يفسر سلوك الضوء يمكن العلماء من تفسير انتقال الضوء في الوسط بسرعة أقل من انتقاله في الفراغ نتيجة تفاعلاته مع ذرات الوسط.

تذكر أن سرعة انتقال الضوء في الفراغ  $\frac{c}{f} = \lambda$ . ويمكن كتابتها كما يلي  $\frac{v}{f} = \lambda$ . حيث يمثل  $v$  سرعة الضوء في وسط ويمثل  $\lambda$  الطول الموجي في ذلك الوسط. إن التردد  $f$  هو عدد ذبذبات الموجة في الثانية الواحدة، ولا يتغير مقداره عند الحد الفاصل بين الوسطين. ولأن  $f$  يبقى كما هو  $\frac{v}{f} = \lambda$ . يقل الطول الموجي حينما تقل سرعة الضوء أثناء مروره عبر السطح الفاصل بين الوسطين. ولأن سرعة الضوء في الوسط أقل من سرعة الضوء في الفراغ، فإن طوله الموجي في أي وسط يكون أقصر منه في الفراغ.

**النموذج الموجي** ما النتائج المترتبة على هذا التغير في الطول الموجي؟ للإجابة عن السؤال انظر إلى **الشكل 4** الذي يوضح حزمة من الضوء مكونة من مقدمات الموجات المتوازية المستقيمة. وتمثل كل مقدمة موجة قيمة الموجة حيث تكون عمودية على اتجاه انتقال الحرزمة التي تسقط على السطح بزاوية  $61^\circ$ . انظر إلى المثلث  $\triangle PQR$  بما أن مقدمات الموجات عمودية على اتجاه الحرزمة، فإن الزاوية  $\angle PQR$  زاوية قائمة. والزاوية  $\angle QRP$  تساوي  $61^\circ$ . وبالتالي،  $\sin \theta_1 = \frac{\overline{PQ}}{\overline{PR}}$  متساوياً على  $\overline{PR}$ .

$$\sin \theta_1 = \frac{\overline{PQ}}{\overline{PR}}$$

يمكن ربط زاوية الانكسار  $(\theta_2)$  بطريقة مشابهة بالمثلث  $\triangle PSR$ ، كما يلي:

$$\sin \theta_2 = \frac{\overline{RS}}{\overline{PR}}$$

وبحساب نسبة جيب الزاويتين، تُلفى  $\overline{PR}$  وتصبح المعادلة على النحو التالي:

$$\frac{\sin \theta_2}{\sin \theta_1} = \frac{\overline{RS}}{\overline{PQ}}$$

في **الشكل 4** يمثل  $\overline{PQ}$  ثلاثة أمثال الطول الموجي للضوء في الهواء، ويمكن كتابة ذلك بالصورة  $\overline{PQ} = 3\lambda_1$ . وبطريقة مماثلة،  $\overline{RS} = 3\lambda_2$ . بالتبعية عن هاتين القيمتين في المعادلة السابقة وإلغاء العامل المشترك 3. تنتج معادلة تربط زاويتي السقوط والانكسار بالطول الموجي للضوء في كل من الوسطين.

$$\frac{\sin \theta_2}{\sin \theta_1} = \frac{3\lambda_2}{3\lambda_1} = \frac{\lambda_2}{\lambda_1}$$

باستخدام المعادلة  $\frac{v}{f} = \lambda$  وإلغاء العامل المشترك  $f$ . لأن التردد يبقى ثابتاً، يمكن إعادة كتابة المعادلة بالصورة:

$$\frac{\sin \theta_2}{\sin \theta_1} = \frac{v_2}{v_1}$$

## مخبر الفيزياء

**كيف ينكس الضوء؟**  
هل يكون معامل انكسار الوسط ثابتاً؟

يمكن كتابة قانون ستل على أنه النسبة بين جibi زاويتي السقوط والانكسار.

$$\frac{\sin \theta_2}{\sin \theta_1} = \frac{n_1}{n_2}$$

و بالتعويض، ينتج من المعادلين السابقتين المعادلة التالية:

$$\frac{n_1}{n_2} = \frac{v_2}{v_1}$$

في الفراغ،  $n = 1.00$  و  $c = 3 \times 10^8 \text{ m/s}$ . إذا كان أحد الوسطين فراغاً، فسيتم تبسيط المعادلة إلى معادلة تربط معامل الانكسار بسرعة الضوء في الوسط.

#### معامل الانكسار

معامل انكسار الوسط يساوي سرعة الضوء في الفراغ مقسوماً على سرعة الضوء في الوسط.

$$n = \frac{c}{v}$$

يمكن استخدام هذا التعريف لمعامل الانكسار في إيجاد الطول الموجي للضوء في الوسط. وبعث عن سرعة الضوء في الوسط الذي معامل انكساره  $n$ . بالمعادلة

$\frac{c}{n} = v$ . والطول الموجي للضوء في الفراغ  $\lambda_0 = \frac{c}{f}$ . وبحل المعادلة  $v = \lambda_0 f$  بال نسبة إلى التردد وتعويض المعادلين  $v = \frac{c}{n}$  و  $f = \frac{c}{\lambda_0}$  فيها، نجد أن:

$$\lambda = \frac{(c/n)}{(c/\lambda_0)} = \frac{\lambda_0}{n}$$

لاحظ أنه، كما ذكرنا سابقاً، يكون الطول الموجي للضوء في وسط ما أصغر منه في الفراغ.


✓ التأكد من فهم النص صفت العلاقة بين معامل الانكسار وسرعة الضوء في الوسط.

## الانعكاس الكلي الداخلي


تذكر أنه عندما يسقط الضوء على سطح شفاف، فإن بعض أشعة الضوء ينخدأ منه وينعكس بعضاها الآخر، عندما ينتقل الضوء من وسط معامل انكساره  $n$  أكبر إلى وسط معامل انكساره  $n$  أقل، تكون زاوية الانكسار أكبر من زاوية السقوط، كما هو مبين في الشكل 5. يؤدي هذا إلى حدوث ظاهرة شديدة للاشتباخ، حيث إنه كلما زادت زاوية السقوط، زادت زاوية الانكسار. عند زاوية السقوط مبنية تعرف باسم الزاوية الحرجة ( $\theta_c$ ). ينعكس شعاع الضوء منطبقاً على السطح الفاصل بين الوسطين.

يحدث **الانعكاس الكلي الداخلي** عندما يسقط الضوء من وسط معامل انكساره كبير، على وسط معامل انكساره أقل على الحد الفاصل بينهما بزاوية أكبر من الزاوية الحرجة. ينعكس الضوء كل مرة أخرى داخل الوسط الذي معامل انكساره أكبر. ويوضح هذا في الرسم التخطيطي السفلي في الشكل 5. للتوصيل إلى العلاقة الرياضية للزاوية الحرجة لأي وسط شفاف، يمكنك استخدام قانون ستل والتعويض عن  $\theta_1 = \theta_c = 90.0^\circ$  و  $\sin \theta_2 = 1$ .


$$\sin \theta_c = \frac{n_2}{n_1}$$



ينكسر الضوء جزئياً وينعكس جزئياً عندما تكون زاوية السقوط أقل من الزاوية الحرجة.



عندما يسقط الشعاع بزاوية سقوط نساوية الزاوية الحرجة فإنه ينحدر في الوسط الثاني منطبقاً على السطح الفاصل بين الوسطين.



ينتج من زاوية السقوط الأكبر من الزاوية الحرجة انعكاس كلي داخلي، وذلك وفقاً لقانون الانعكاس.

الشكل 5 يحمد انعكاس الضوء المنتقل بين وسطين وانعكاسه على زاوية السقوط  $\theta_c$ .


ينتج من الانعكاس الكلي الداخلي بعض الآثار التي تدعى للتأمل. افترض أثك تسبح في بركة ماء وتنظر إلى سطح الماء. قد ترى انعكاس صورة ممعكسة جانبياً لجسم آخر تحت الماء أيضاً وقد ترى أيضاً انعكاس قاع البركة نفسه. حيث يعمل سطح الماء عمل السطح العاكس للمرآة.

## السراب


في يوم صيف حار، قد ترى ظاهرة السراب الموضح في الشكل 6. لعلك لاحظت وأنت تركب السيارة على أحد الطرق. ما يبدو كأنه انعكاس في بركة ماء لصورة سيارة قادمة نحوك، إلا أنه كلما اقتربت من هذه البركة، فلاشت واختفت. فالسراب يحدث نتيجة تسخين حرارة الشمس للطريق، حيث تغير سعة الضوء، ثم، يتغير عامل انكسار الوسيط الغازى تقريباً طفيفاً باختلاف درجة الحرارة. إن الطريق الساخنة تُسخّن الهواء الملامس لها وتحت طبقة حرارية من الهواء تؤدي إلى انحراف الضوء المنتقل من السيارة إلى أعلى تدريجياً، حيث يجعل هذا الضوء يبدو قادماً من انعكاس في بركة ماء.

يوضح الشكل 6 طرفة حدوث هذه الظاهرة، فعندما ينتقل الضوء القادم من الأجسام البعيدة مقترباً من سطح الطريق، يقل عامل انكسار الهواء مع ارتفاع درجة الحرارة، إلا أنّ تغير درجة الحرارة يحدث تدريجياً. تذكر أنّ مقدمات موجات الضوء تتكون من موجات هيجنز، ويتطبق ذلك على ظاهرة السراب. نجد أن موجات هيجنز القريبة من الأرض تنتقل على نحو أسرع من نظيراتها الأعلى. وينتج من ذلك انحراف مقدمات الموجات إلى أعلى تدريجياً.

## السراب



مقدمة الطبع | (الطبعة الأولى) © محفوظة حقوق النشر © McGraw-Hill Education



## الفيزياء في حياتك

**الألياف البصرية** يستخدم الانعكاس الداخلي الكلي في الاتصالات عبر الألياف البصرية. إذ يسقط الضوء المنتقل عبر الألياف الشفافة على السطح الداخلي للبصري دائماً بزاوية أكبر من الزاوية الحرجية. ينعكس الضوء انعكاساً داخلياً كلياً، ولا يخترق أي منه السطح. وتنقل النبضات الضوئية في كيلات الألياف البصرية كبيانات أكبر من المعلومات عبر مسافات أطول مقارنة بوسائل الاتصالات الأخرى. يطلق على المادة الخارجية من الألياف اسم **الغلاف**.


**الشكل 6** إن موجات الضوء المنعكسة عن جسم السيارة نحو الطريق تنكسر عندما يكون الهواء القريب من سطح الطريق أكثر سخونة من الهواء الأعلى منه.

**طريق** هل تنتقل موجات الضوء على نحو أسرع بالقرب من سطح الطريق أم بالقرب من قبة الشاشة؟

## تحلل الضوء الأبيض

ربما تكون قد رأيت الظاهرة الموضحة في الشكل 7 حيث يمر الضوء الأبيض عبر المنشور. وإذا أمعنت النظر في الطيف الذي كنته الضوء المار عبر المنشور، فستلاحظ أن الضوء البنفسجي ينكس بدرجة أكبر من الضوء الأحمر. ويحدث هذا لأن سرعة الضوء البنفسجي عبر الزجاج أقل من سرعة الضوء الأحمر، حيث أن تردد الضوء البنفسجي أعلى من تردد الضوء الأحمر مما يجعله يتفاعل مع ذرات الزجاج على نحو مختلف، مما يجعل معامل انكسار الضوء البنفسجي في الزجاج أكبر قليلاً من معامل انكسار الضوء الأحمر، وبطريق على تحلل الضوء الأبيض إلى طيف الألوان اسم **تحلل الضوء**.

تحتَّد سرعة الضوء في الوسط من خلال التفاعلات بين الضوء والذرات المكونة للوسط، وتختلف سرعة الضوء ومعامل انكسار الوسط الصلب أو السائل باختلاف الأطوال الموجية للضوء. كما تختلف سرعة الضوء ومعامل الانكسار اختلافاً طفيفاً باختلاف درجة حرارة الوسط الغازي. ويرجع هذا إلى تأثيرات درجة الحرارة في طاقة الجسيمات على المستوى الذري.




الشكل 7 يحدث التحلل عبر المنشور بسبب اختلاف معامل الانكسار باختلاف الطول الموجي للضوء.

**أقواس المطر** لا يغتَّ المنشور الوسيلة الوحيدة لتحلل الضوء، إذ يعرف قوس المطر بأنه الطيف الذي يتكون عند تحلل ضوء الشمس بواسطة قطرات الماء في الغلاف الجوي، حيث ينكس ضوء الشمس الساقط على قطرات الماء، وبما أن كل لون له طول موجي مختلف، فإنه ينكس بزاوية مختلفة قليلاً، كما هو موضح في الشكل 8، وينتج عن ذلك تحلل الضوء، و يحدث انكسار داخلي كلي لبعض الضوء عند السطح الخلوي ل قطرات الماء، وعند خروجه من قطرة الماء، ينكس الضوء مرة أخرى و يتحلل على الرغم من أن كل قطرة تنتج طيفاً كاملاً. سيرى المراقب الذي يقف بين الشمس والمطر طوقاً موجياً معييناً فقط للضوء من كل قطرة. ويعتمد الطول الموجي المرئي على الموضع النسبي لكل من الشمس و قطرة الماء والمراقب، كما هو موضح في الشكل .8

## تجربة مصغرة

### عمل قوس المطر شخصياً

ما الشروط الازمة لعمل قوس المطر؟



الشكل 8 يتحلل الضوء المنبعث من الشمس بواسطة قطرات الماء لنكون أقواس المطر. ونظرًا إلى وجود العديد من قطرات الماء في مواقع مختلفة في السماء، يصبح الطيف مرتباً بالكامل.

**فقر** هل يمكن أن يقترب قوس المطر بدرجة كافية للاماسنة.

**الشكل 9** يمكن أن يتسبب الضوء المنعكس داخل قطرات المطر بظهور قوس مطر ثانوي.



## مختبر الفيزياء


### طيف يشتمل جميع الاحتمالات

**مختبر الطبع الشرعي** كيف يمكن أن يساعد طيف ضوئي ذي كثافة زجاج مكسور في موقع حادث سير في تحديد السيارة المشتبه فيها؟

قوس المطر من الدرجة الثانية وأحياناً يمكن رؤية قوس مطر ثان ياهث مثل ذلك المبين في الشكل 9. يظهر قوس المطر الثاني خارج الأول. ويكون باهثاً وألوانه معكوسه مقارنة بالقوس الأول. و يحدث هذا الأثر بسبب أشعة الضوء المنعكسة مررتين داخل قطرات الماء. من النادر جداً أن يظهر قوس مطر ثالث خارج الثاني. ويكون باهثاً أكثر من القوس الثاني. ما توقعاتك حول عدد مرات انعكاس الضوء في قطرات الماء؟ وكيف سيكون ترتيب ظهور الألوان في قوس المطر الثالث؟

## القسم 1 مراجعة

8. زاوية الانكسار نفذت حزمة ضوء من الماء إلى البولي إيثيلين معامل انكساره  $n_1 = 1.50$ . إذا كانت  $57.5^\circ$ ، فما زاوية الانكسار في البولي إيثيلين؟
9. سرعة الضوء كم تبلغ سرعة الضوء في مادة الكلوروفورم  $n_2 = 1.51$ ؟
10. الزاوية الحرجة هل توجد زاوية حرجة للضوء المنتقل من الزجاج إلى الماء؟ أم من الماء إلى الزجاج؟ اشرح إجابتك.
11. الانعكاس الكلي الداخلي إذا كنت مستخدماً الكوارتز والزجاج المصقول لصناعة ألياف بصريّة، فأياً منها ستختار لعمل طبقة الفلافل؟ ولماذا؟
12. غروب الشمس لماذا يمكنك أن ترى صورة الشمس فوق خط الأفق في حين تكون الشمس قد غربت فعلاً؟
13. سرعة الضوء هل يمكن أن يكون معامل الانكسار أقل من 1؟ يدل هذا بالنسبة إلى سرعة الضوء في ذلك الوسط؟
14. **التفكير النقدي** في أي اتجاه يجب أن تنظر لتتمكن من رؤية قوس المطر في ساعة مطيرة في وقت متأخر من الظهر؟ فسر إجابتك.



لعلك سمعت أن بإمكانك إشعال النار باستخدام عدسة مكبرة.  
تُجمع العدسة المكبرة الضوء كله في نقطة واحدة. هل يمكنك  
إشعال النار باستخدام أي نوع من العدسات. أم يجب أن تتميز تلك  
العدسة بخصائص معينة؟

## الفيزياء في حياتك

### أنواع العدسات

يُعد انكسار الضوء الذي ينبع منه قوس المطر، والخشوف الأحمر للقمر، ظاهرة طبيعية جميلة. وهنالك قواعد كثيرة لهذا الانكسار في حياتنا. ففي العام 1303م كتب الفيزيائي الفرنسي بريغارد أوف جوردون عن استخدام العدسات لتصحيح النظر. وفي العام 1610 استخدم جاليليو عدستين لصنع تلسكوب اكتشف بواسطته أقمار كوكب المشتري، ومنذ زمن جاليليو استُخدمت العدسات في العديد من الأجهزة، مثل الميكروسكوبات وألات التصوير، وتُعد العدسات أكثر الأدوات فائدة.


**إن العدسة** هي خلعة من مادة شفافة، مثل الزجاج أو البلاستيك. تُستخدم في تجميع الضوء أو تفريقه وتكوين الصور. يمكن أن يكون أي سطح من سطحي العدسة منحنياً أو مستوياً. تسمى العدسة التي يكون سطحها أكثر سمكاً مما عند أطرافها **بالعدسة المحدبة**، توضح الصورة اليمنى في الشكل 11. وتسمى العدسة المقعرة **بالعدسة الممتوجة**. لأنها تكون محاطة بمادة ذات معامل انكسار أقل من معامل انكسار مادة العدسة نفسها. لذا تعمل هذه العدسة على كسر الأشعة الضوئية المتوازية والتي تكون موازية لمحور العدسة الأساسي. بحيث تتجمع الأشعة الممتوجة في نقطة واحدة. تسمى العدسة التي يكون سطحها أدق وأرق مما عند أطرافها **بالعدسة المقعرة**. وتسمى العدسة المقعرة مادة العدسة نفسها. لأنها تكون محاطة بمادة ذات معامل انكسار أقل من معامل انكسار مادة العدسة نفسها. لذا تتم على كسر أشعة الضوء المتوازية بحيث تترافق.

عند مرور الضوء من خلال عدسة، يحدث الانكسار عند كل من سطحي العدسة. ويمكنك عينها توقع مسار الأشعة المارة خلال العدسات باستخدام قانون ستل والهندسة. لتبسيط مثل هذه المسائل، افترض أن الانكسار يحدث بشكل كامل في مستوى. يسمى بالمستوى الأساسي، ويتر في مركز العدسة وطرفيها. ويسمى هذا التقارب **بنوّذ العدسة الرقيقة**، والذي ينطبق على كل العدسات التي ستدرسها في هذه الوحدة.

العدسة المقعرة



العدسة المحدبة



الشكل 11 كسر العدسة المحدبة الضوء بحيث تُجّمع الأشعة بعد مرورها من خلال العدسة.  
تنتفّق أشعة الضوء المارة من خلال عدسة مقعرة.



### ال فكرة الرئيسية

يمكن استخدام العدسات لتكوين صور  
مكبرة أو مصغرة للأجسام.

### الأسئلة الرئيسة

- كيف تنتَّون الصور الحقيقية والخيالية  
باستخدام عدسات مقعرة ومحدبة؟
- كيف يمكن تعين موقع الصور التي  
تُكوّن بواسطة العدسات، وتحديد  
صفاتها باستخدام طریقتين، مخطط  
الأشعة والطريقة الرياضية؟
- كيف يمكن التقليل من زوغان اللوني؟



### مراجعة المفردات

**الشفافية:** *transparent*: إحدى  
خصائص الوسط التي تسمح للوسط  
بمرور الضوء من خلاله، وعكس جزء منه  
ما يتيح رؤية الأجسام من خلاله بوضوح.

### مفردات جديدة

<b>lens</b>	عدسة
<b>convex lens</b>	عدسة محدبة
<b>concave lens</b>	عدسة مقعرة
معادلة العدسة الرقيقة	
<b>thin lens equation</b>	زوغان لوني
<b>chromatic aberration</b>	
<b>achromatic lens</b>	عدسة لا لونية

الشكل 12 ينکون للجسم صورة حقيقة مصفرة ومحکوسة عندما تكون المسافة بين الجسم والعدسة أكبر من مثلي البعد المؤري للعدسة.



## العدسات المحدبة

إذا كنت تعرف موقع الجسم ونوع العدسة المستخدمة وقوتها، يمكنك معرفة موقع الصورة. بعد مخطط الأشعة أداة تمثل بمقيد. باستخدام مخطط الأشعة، يمكنك تحديد بعض الأشعة المهمة التي توضح مدى تأثير العدسة في الضوء المار من خلالها. يمكنك استخدام شعاعين لتحديد موقع الصورة. في الشكل 12، بالنسبة إلى العدسات المحدبة، عندما تكون المسافة بين الجسم والعدسة أكبر من البعد المؤري، ينكسر الشعاع 1 والذي يكون موازياً للمحور الأساسي، مازاً بالنقطة ( $F$ ) والتي تسمى بؤرة العدسة بعد مروره من خلال العدسة الموضحة. في حين ينكسر موازياً للمحور الأساسي الشعاع 2 الذي يمر بالنقطة ( $F$ ) الموجدة في ناحية الجسم أثناء طريقه إلى العدسة.

تتضمن مخططات الأشعة للعدسات المحدبة أجساماً موضوعة على أبعاد مختلفة من العدسة. في مخططات الأشعة هذه، يمثل  $x_o$  بعد الجسم من العدسة ويمثل  $x_i$  بعد الصورة من العدسة. يستخدم نمودج العدسة الرقيقة في كل مخططات الأشعة الواردة في هذه الوحدة. في هذا النموذج، ينكسر الضوء في المستوى الأساسي المار من مركز العدسة بدلاً من الانكسار على الحدين الفاصلين بين الهواء وسطح العدسة.

## تجربة مصغرة


**تأثيرات تفطية العدسة**  
ما تأثير تفطية جزء من العدسة في الصورة الناتجة؟

في الشكل 12، تخرج الأشعة من جسم يقع بعيداً من عدسة محدبة. وستحتاج إلى استخدام شعاعين فقط لتحديد موقع صورة نقطة على الجسم، بحيث يكون الشعاع 1 موازياً للمحور الأساسي، وينكسر مازاً بالنقطة ( $F$ ) والتي تسمى بؤرة العدسة بعد مروره من خلال العدسة. في حين يمر الشعاع 2 بالنقطة ( $F$ ) في أثناء طريقه إلى العدسة، ويكون مساره بعد الانكسار موازياً للمحور الأساسي. بحيث يتقطع الشعاعان عند نقطة ما بعد ( $F$ ) فيجدان موقع الصورة أما الأشعة المنتبطة على المحور الأساسي فإنها تنفذ دون أن تنكسر لأنها تستقر ممدوحة على سطح العدسة. وتتقاطع الأشعة المختارة من نقاط أخرى على الجسم عند نقاط مماثلة لتكوين الصورة بشكل كامل. لاحظ أن الصورة تكون حقيقة ومعكروسة ومضفرة مقارنة بالجسم الأصلي.

أما إذا تم وضع الجسم على بعد يساوي مثلي البعد المؤري من العدسة عند النقطة  $2F$ . فإن الصورة المنكوبة في المخطط الشعاعي ستكون عند النقطة  $2F$  من الجهة الأخرى للعدسة. وسيكون لصورة الجسم البعد نفسه من العدسة بسبب التمايز. أي إن الصورة تكون حقيقة وملوقة ومساوية للجسم، وتقع على مسافة تساوي  $2F$ . لذا، يمكنك استنتاج أنه إذا كان بعد الجسم عن العدسة أكبر من مثلي البعد المؤري للعدسة، ستكون الصورة مصفرة.

### العدسة المحدبة

**الشكل 13** عندما يكون البعد بين الجسم والعدسة أقل من مثلي البعد البؤري ولكن أكبر من الثلث البؤري، تكون صورة حقيقة مكثرة ومعكوسة للجسم.



**2f > x\_o > f** يمكنك استخدام الشكل 13 لتحديد موقع صورة جسم يقع بين  $f$  و  $2f$  وبئري من خلال عدسة محدبة. حيث يشبه مخطط الأشعة للجسم الذي يقع على مسافة أكبر من مثلي البعد البؤري مع تبادل الصورة والجسم. ففي هذه الحالة، تكون الصورة حقيقة ومعكوسة. لذا تستنتج أنه عند وضع جسم بين  $f$  و  $2f$ ، تكون الصورة مكثرة.

أما عند وضع جسم على نقطة بؤرة عدسة محدبة  $F$ . فلا يمكن رسم مخطط أشعة للصورة، حيث ستنظر الأشعة المكسرة في هيئة أشعة متوازية ولن ظهر صورة.

**f > x\_o > 0** يوضح الشكل 14 طريقة تكون صورة خالية باستخدام عدسة محدبة. إذ يقع الجسم بين العدسة وبؤرتها. بحيث يقترب الشعاع 1 من العدسة موازياً للمحور الأساسي وينكسر مازاً بالبؤرة  $F$ . في حين يمر الشعاع 2 من أعلى الجسم في اتجاه كما لو كان صادراً من البؤرة  $F$  الموجودة في جانب العدسة الذي يوجد فيه الجسم. فوضَّح الخط المتقطع الواصل بين  $F$  والجسم طريقة رسم الشعاع 2 بحيث يخرج الشعاع 2 من العدسة موازياً للمحور الأساسي. ويتباعد الشعاعان 1 و 2 عند خروجهما من العدسة. يبدو الانكسار للملاحظ وكأنه يأتي من نقطة على جانب العدسة نفسه الذي يوجد فيه الجسم. وت تكون صورة خالية ومتعدلة ومكثرة للجسم. ولا يمكن ظهور صورة حقيقة له. يمكن تحديد موقع الصورة الخيالية من خلال رسم الامتداد الخلفي للشعاعين المنكسرتين لنطرين مكان تقاطعهما الظاهري حيث يكون موقع الصورة في جانب العدسة نفسها الذي يوجد فيه الجسم. وتكون الصورة متعدلة ومكثرة. لاحظ أن الصورة الحقيقة قد تكونت بفعل الضوء المار من خلال العدسة. ولكن ما زال بإمكانك تحديد موقع الصورة من خلال رسم الأشعة التي لا تمر فعلًا من خلال العدسة.

## مختبر الفيزياء

### الصور المكونة من العدسة المحدبة


ما خصائص الصور المكونة باستخدام عدسة محدبة؟

### العدسات المحدبة والبعد


**البؤري** هل ينتهي البعد البؤري بنتيجة موقعة الصورة بالنسبة إلى العدسة المحدبة؟

**الشكل 14** تكون للجسم صورة خالية مكثرة عندما تكون المسافة بين الجسم والعدسة أقل من البعد البؤري.

**تصنيف** تصنف الصورة إلى خالية أو حقيقة بناء على جانب العدسة الذي تقع فيه.



الشكل 15 ي تكون للجسم الموضع على مسافة من عدسة مقعرة صورة خيالية ومصفرة.



## العدسات المقعرة

تفرق العدسة المقعرة كل الأشعة. يوضح الشكل 15 كيف تكون هذه العدسة صورة خيالية للجسم. حيث يصل الشعاع 1 إلى العدسة موازياً للمحور الأساسي. ينكسر الشعاع ويخرج من العدسة بحيث يمر امتداده في البؤرة الموجودة في جانب العدسة المواجه للجسم. يصل الشعاع 2 إلى العدسة كما لو أنه سيمر من خلال البؤرة في الجانب الآخر من العدسة. ثم ينكسر ويخرج من العدسة موازياً للمحور الأساسي.

تقاطع الامتدادات الخلفية للشعاعين 1 و 2 في جانب العدسة نفسه الذي يوجد فيه الجسم. وأن الأشعة تخرج من العدسة شكل متباعد. فإنها تكون صورة خيالية. ويكون موقع الصورة عند النقطة التي يظهر عندها بأن الأشعة تخرج من العدسة متبااعدة منها. فت تكون صورة معتدلة ومصفرة للجسم. وهذا صحيح بغض النظر عن مدى بعد الجسم من العدسة، كما يكون البعد البؤري للعدسة المقعرة سالباً.

**التأكيد من فهم النص** اذكر سبب تكون العدسة المقعرة صورة خيالية دائمًا.

## تجربة مصفرة

### العدسات المائية

كيف يعمل السطح المنحنى للماء كعدسة؟

### معادلة العدسات الرقيقة

تتضمن المسائل التي ستحلها في هذا القسم عدسات رقيقة فقط. وبناء على نموذج العدسة الرقيقة، والتبسيطات المستخدمة في حل مسائل البرايا الكروية، تم تطوير معادلتين للعدسات، فبالنسبة إلى العدسات، تقع الصورة الخيالية في جانب العدسة الذي يوجد فيه الجسم، أي إن بعد الجسم يكون سالباً. لاحظ أن العدسة المقعرة تكون صوراً خيالية فقط، في حين تكون العدسة المحدبة صوراً حقيقية وأخرى خيالية.

**معادلة العدسة الرقيقة تربط معادلة العدسة الرقيقة** بين كل من البعد البؤري للعدسة الكروية الرقيقة وبعد الجسم وبعد الصورة.

**معادلة العدسة الرقيقة**  
يساوي مقلوب البعد البؤري للعدسة الرقيقة حاصل جمع مقلوب بعد الصورة ومقلوب بعد الجسم من العدسة.

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{x_i} + \frac{1}{x_o}$$

## الجدول 2

نظام الإشارات وصفات الصور في العدسة الرقيقة المقفردة

الصورة	$m$	$x_i$	$x_o$	$f$	نوع العدسة
حقيقية صغراء معكوسه (مقلوبة)	سالبة $-1 < m < 0$	$2f > x_i > f$	$x_o > 2f$		
حقيقية مكرونة معكوسه (مقلوبة)	سالبة أكبر من 1	$x_i > 2f$	$2f > x_o > f$	+	محدية
مكرونة خيالية معتدلة	موجبة أكبر من 1	$ x_i  > x_o$ (قيمة سالبة)	$f > x_o > 0$		
صغراء خيالية معتدلة	موجبة بين 0 و +1	$ f  >  x_i  > 0$ (قيمة سالبة)	$x_o > 0$	-	مقعرة

عند حل مسائل العدسات المقعرة باستخدام معادلة العدسة الرقيقة، يجب أن تذكر أنّ تعديل إشارات البعد البؤري للعدسة المقعرة يختلف عن اصطلاح إشارات البعد البؤري للعدسة المحدية. وذلك لأنّ العدسة المقعرة عدسة مفرقة. إذا كانت البؤرة للعدسة المقعرة على بُعد  $24 \text{ cm}$  من العدسة، فإذا يجب أن تستخدم القيمة  $f = -24 \text{ cm}$  في معادلة العدسة الرقيقة. لأنّ جميع صور العدسة المقعرة تكون صوّراً خيالية. وبالتالي، إذا كانت المسافة بين الصورة والعدسة تساوي  $20 \text{ cm}$ . فإن عليك استخدام  $x = -20 \text{ cm}$ . وستكون قيمة بُعد الجسم موجبة دائمًا.

**التكبير** يُعد التكبير إحدى خصائص العدسات الرقيقة التي تقيس مدى كبر أو صغر الصورة مقارنة بالجسم الأصلي. ويمكن أيضًا استخدام معادلة التكبير للمرابا الكروية مع العدسات الرقيقة. بحيث تُستخدم في تحديد طول الصورة المتكوّنة واتجاهها عند استخدام عدسة رقيقة.

**التكبير** يُعرف التكبير باستخدام عدسة كروية. بأنه نسبة طول الصورة إلى طول الجسم. وبساوي سالب بُعد الصورة مقسوماً على بُعد الجسم من العدسة.

$$m \equiv \frac{h_i}{h_o} = -\frac{x_i}{x_o}$$

يعطي التكبير معلومات عن مدى كبر صورة الجسم واتجاهها مقارنة بالجسم. عندما تكون القيمة المطلقة للتکبير تقع ما بين صفر وواحد، تكون الصورة أصغر من الجسم. في حين تكون الصورة أكبر من الجسم عندما تكون القيمة المطلقة للتکبير أكبر من واحد. إضافةً إلى ذلك، تشير قيمة التكبير السالبة إلى أنّ الصورة معكوسه مقارنة بالجسم.

**استخدام معادلتي العدسات** من المهم استخدام نظام إشارات مناسب عند استخدام هاتين المادتين. وبين الجدول 2 مقارنة بين بُعد الصورة والتکبير ونوع الصورة المتكوّنة باستخدام عدسات محدية أو مقعرة مفردة عند وضع جسم في مواقع مختلفة ( $x_o$ ) بالنسبة إلى العدسة. ففي العدسات المحدية، يؤثر بُعد الجسم من بؤرة العدسة في نوع الصورة المتكوّنة.

لاحظ وجه التشابه بين هذا الجدول وجدول المرابا. فكما هو مبيّن في جدول المرابا.

تُمثل المسافة من المستوى الأساسي للعدسة والبؤرة، البُعد البؤري ( $f$ ). ويعتمد البُعد البؤري على شكل العدسة ومعامل انكسار مادتها. ويمكن أن تكون الأبعاد البؤرية وأبعاد الصور سالبة.

الصورة المتكثنة بواسطة العدسة المحدبة تم وضع جسم على بعد 8.0 cm من عدسة محدبة بعدها البؤري 32.0 cm. أين تكون الصورة؟


a. إذا كان طول الجسم يساوي 3.0 cm، فما طول الصورة؟

b. ما اتجاه الصورة؟

### تحليل المسألة ورسمها

- مثل الحالـة، وحدد موقع كل من الجسم والعدسـة.

- ارسم الشعاعين الأساسيين.



المتحول المعلوم

$$x_i = ? \quad x_o = 32.0 \text{ cm}$$

$$h_i = ? \quad h_o = 3.0 \text{ cm}$$

$$f = 8.0 \text{ cm}$$

### حساب موضع وارتفاع الصورة

a. استخدم معادلة العدسة الرقيقة لإيجاد  $x_i$ .

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{x_i} + \frac{1}{x_o}$$

$$x_i = \frac{fx_o}{x_o - f}$$

$$= \frac{(8.0 \text{ cm})(32.0 \text{ cm})}{32.0 \text{ cm} - 8.0 \text{ cm}}$$

**f = 8.0 cm, x\_o = 32.0 cm**

► بالتعويض عن  $x_o$  في الجانب المحاكس للجسم

b. استخدم معادلة التكبير، وخلل لإيجاد طول الصورة

$$m \equiv \frac{h_i}{h_o} = -\frac{x_i}{x_o}$$

$$h_i = -\frac{x_i h_o}{x_o}$$

$$= -\frac{(11 \text{ cm})(3.0 \text{ cm})}{32.0 \text{ cm}}$$

► (طول الصورة يساوي 1.0 cm)

c. تدل الإشارة السالبة للارتفاع في الجزء b على أن الصورة مقلوبة.

### تقييم الإجابة

• هل الوحدات صحيحة؟ الأبعاد كلها بوحدة المستيمتر cm.

• هل تعني الوحدات أي شيء؟ إن بعد الصورة موجب (الصورة حقيقية). أما طولها فمتساوٍ (أي إن الصورة مقلوبة مقارنة بالجسم). مما يدل على أن العدسة محدبة.

### تطبيقات

18. جسم طوله 2.0 cm ويبعد 25 cm من عدسة محدبة بعدها البؤري 5.0 cm. احسب طول الصورة. وبعدها، ثم حدد اتجاه الصورة.

19. استخدم مخطط أشعة بمقاييس رسم معين لإيجاد بعد الصورة لجسم يقع على بعد 30 cm إلى يسار عدسة محدبة بعدها البؤري 10 cm.

20. تحفيز تستخدم عدسة مكبرة بعدها البؤري 30 cm في فحص جسم طوله 1 cm. استخدم مخطط أشعة لتحديد بعد الصورة وطولها عندما تكون العدسة المكبرة على بعد 10 cm من الجسم.

15. يبلغ طول جسم 2.25 cm ويقع على بعد 8.5 cm إلى يسار عدسة محدبة بعدها البؤري 5.5 cm. أوجد بعد الصورة وطولها.

16. تكون لجسم يقع بالقرب من عدسة محدبة صورة حقيقية مكروسة طولها 1.8 cm. وتبعد من العدسة مسافة مقدارها 10.4 cm. فإذا كان بعد البؤري للعدسة يساوي 6.8 cm، فما بعد الجسم؟ وما طوله؟


17. وضع جسم إلى يسار عدسة محدبة بعدها البؤري 25 mm. ف تكون له صورة حجمها متساوٍ لحجم الجسم. فما بعد كل من الصورة والجسم؟

## عيوب العدسات الكروية

صه ضلچم ده لحده شده بیه ده همه و مسیب الهمه طبقه لکته سه پر غمه  
طلیعیه ده لحده طبقه په این ب طبقه وه هلهجه طبقه جشنگه بمه و لکته  
به خیه ب تینه سیه هنگه داه لحده طبقه په این طبقه خیه هنگه ده ط لاه  
و هلهجه بیه خه ولاه و ته طلیعیه بشنه خیه هنگه ده لحده طبقه فه په  
ده هنگهه طلیع




**شكل 16** جلطه ظجه طلاء لحضة  
خطء خطء خطء خطء خطء



## القسم 2 مراجعة

28. نوع الصورة استخدم مخطط الأشعة في الشكل 20 لنجد ما إذا كانت صورة الجسم 1 ستكون مصغرة أم مكببة، مكوبة أم معندة، حقيقة أم خالية. وأفعل الشيء نفسه مع الجسم 2.



الشكل 20

29. بعد الصورة وطولها وضع جسم ارتفاعه 6.0 cm على مسافة 5.0 cm من عدسة محدبة يبعدها البؤري 4.0 cm. ارسم مخطط أشعة لتحديد بعد الصورة وارتفاعها. ثم تأكّد من النتائج باستخدام معادلة العدسة الرقيقة ومعادلة التكبير.

30. العدسة المفرقة يبلغ ارتفاع عبوة ملح طعام 6.5 cm ينبع إليها باستخدام عدسة مفرقة يبعدها البؤري 5.0 cm.


a. إذا كان بعد عبوة الملح من العدسة 6.0 cm. فما بعد الصورة من العدسة؟ هل الصورة خالية أم حقيقة؟

b. ما مقدار التكبير؟ هل الصورة أصغر أم أكبر من العبوة الأصلية؟

c. إذا أبعدت عبوة الملح من العدسة بمسافة 4 cm. فما مقدار بعد الصورة من العدسة؟ وما مقدار التكبير؟ هل أصبحت الصورة حالياً أصغر أم أكبر من العبوة الأصلية؟

31. الزيغ اللوني إذا سمحت لضوء أبيض أن يمر من خلال عدسة محدبة إلى شاشة، وضبطت المسافة بين الشاشة والعدسة لتتجه اللون الأحمر، فهل يجب تقرير الشاشة من العدسة أم بإعادتها لتجه الضوء الأزرق؟

32. التكبير الناقد ت تكون عدسة هوائية موضوعة في خزان ماء من زجاجي ساعة. انظر الشكل 21 إلى دفترك. وارسم تأثير هذه العدسة في أشعة الضوء المتوازية الساقطة على العدسة.



الشكل 21

21. المكرة الرهيبة شُتُّتِم العدسات المكببة عادةً لتكون صور مكبوتة للأجسام، ولكنها أيضًا يمكن أن تكون صورًا مصغرة للأجسام، وضـ ذلك.


22. أنواع العدسات يوضح الشكل 18 أربع عدسات رقيقة مختلفة. أي من هذه العدسات:

- a. محدبة؟
- b. مقعرة؟



الشكل 18

23. بعد الصورة وطولها ارسم مخطط الأشعة في الشكل 19 واستخدمه في تحديد بعد الصورة وطولها. استخدم معادلة العدسة الرقيقة ومعادلة التكبير للتحقق من إجابتك.



الشكل 19

24. بعد الصورة وطولها تم وضع جسم على بعد 1.5 m من عدسة محدبة يبعدها البؤري 1.0 m. استخدم معادلة العدسة الرقيقة لإيجاد بعد الصورة من العدسة. وإذا كان طول الجسم 2.0 m. فكم يبلغ طول الصورة؟ هل الصورة حقيقة أم خالية؟ وهل الصورة مكببة أم معندة؟

25. ما المقصود بـ مصطلح العدسة المفرقة والعدسة الشجاعية؟ ما نوع العدسة الذي يشير إليه كل مصطلح؟

26. تستخدـم الحسابات الواردة في هذا الفصل التقرير إلى العدسة الرقيقة. ماذا يعني ذلك؟ لماذا يستخدم التقرير إلى العدسة الرقيقة؟

27. الزيغ اللوني للعدسات البسيطة كلها زين لوني. فسر ذلك. لماذا لا ترى هذا الأثر عندما تنظر من خلال المجهر (الميكروسكوب)؟

### الفيزياء في حياتك

استخدم الباحرة ذات يوم النظارات المقرّبة، وهي عبارة عن تلسكوبات صغيرة يدوية، لرؤية الأجسام البعيدة. تعتمد نظارات المقرّبة وغيرها من التلسكوبات العديدة الأخرى على العدسات لتكبير صور الأجسام البعيدة.


## العدسات في العين

تطبيق المفاهيم التي تعلّمتها عن انكسار الضوء عبر العدسات على كل الأجهزة البصرية فقريباً. وعند العين البشرية أحد الأجهزة البصرية المميزة. كما هو موضح في الشكل 22، إن العين عبارة عن عاء كروي تغطيه بملأه سائل. ينتقل الضوء المنبعث من جسم ما أو المنعكس منه إلى العين عبر القرنية والحدقة. وتمر الضوء بعد ذلك عبر العدسة ويتوجّه على الشبكية التي تقع في مؤخرة العين. وتحتاج الخلايا المتخصصة في الشبكية هذا الضوء، ثم ترسل معلومات عن الصورة إلى الدماغ عبر العصب البصري.

**◀ الرابط بعلم الأحياء** قد تعتقد أن عدسة العين هي المسؤولة عن تركيز الضوء على الشبكية وذلك نسبة إلى اسمها، ولكن في الحقيقة، تركّز القرنية الضوء الداخل إلى العين، لأنّه يوجد فارق كبير بين معامل الانكسار عند الحد الفاصل بين الهواء والقرنية. أما العدسة فهي المسؤولة عن تحسين التركيز الذي يسمح لك برؤية الأجسام البعيدة والتربيبة بوضوح.

### ✓ التأكيد من فهم النص صفحه وظيفة كل من القرنية والعدسة في العين.

تجدر الإشارة إلى أن العدسة تستخدم عملية تُعرف باسم التكيف. تتمكن العضلات المحاطة بالعدسة من الانقباض أو الارتفاع مما يؤدي إلى تغيير شكل عدسة. ويؤدي هذا في المقابل، إلى تغيير البعد البؤري لعدسة العين. وفي العين السليمة، عندما تسترخي العضلات، تتركز صورة الأجسام البعيدة على الشبكية. وعندما تتنقبض العضلات، يقصّر البعد البؤري، مما يتيح تركيز صور الأجسام القريبة على الشبكية.



الشكل 22 تتمثّل القرنية والعدسة في العين على انكسار الضوء المنعكس من كل الأجسام التي تراها.

**للحصّ** لماذا يحدث معظم الانكسار عند حد القرنية بدلاً من حد العدسة.



## النَّكْرَة الرَّئِيسَة

باستخدام العدسات برى الناس أجساماً لم يكونوا ليرواها بغير ذلك.

## الأسئلة الرئيسيّة

- كيف تركز العين الضوء لتكون صورة؟
- ماذا يقصد بقصر النظر وطول النظر، وكيف تتمكن عدسات النظارة من تصحيح هذه العيوب؟
- ما خصائص الأنظمة البصرية في بعض الأجهزة البصرية المعروفة؟

## مراجعة المفردات

معامل الانكسار

index of refraction

## مفردات جديدة

قصر النظر nearsightedness

طول النظر farsightedness


**الشكل 23** تبدو الأجسام البعيدة ضبابية بالنسبة إلى الشخص الذي يعاني قصر النظر، أما بالنسبة إلى من يعاني طول نظر، ف تكون الأجسام القريبة ضبابية.

**اشرح** كيف يمكن عمل العدسات الثانية البؤرية.




## الفيزياء في حياتك

العدسات اللاصقة تقدم العدسات اللاصقة النتيجة نفسها التي تقدمها النظارات. وتوضع هذه العدسات الصغيرة والرقية على القرنية مباشرةً، حيث تحافظ طبقة رقيقة من الدمعة الموجودة بين القرنية والعدسة على بقاء العدسة في مكانها. يحدث معظم الانكسار عند الحد الفاصل بين الهواء والعدسة حيث يكون الفرق في معامل الانكسار كبيراً.



**قصر النظر** لا تكون أعين معظم الأشخاص صوراً واضحة على الشبكية، بل تكون الصور، بدلاً من ذلك، أمام الشبكية أو خلفها. مما يتطلب استعمال العدسات الخارجية، التي تتمثل في النظارات أو العدسات اللاصقة، لكي تضبط البعد البؤري وتحتل الصور إلى الشبكية، يوضح الشكل 23 حالة **قصر النظر**، والذي يُعرف أيضًا بالحرس (myopia)، حيث يكون البعد البؤري للعدسة فصيراً جدًا لدرجة أنه لا يمكن من تركيز الضوء على الشبكية، وبالتالي لا تكون الصور أمام الشبكية. وكما هو موضح في الشكل 23، فإن العدسات المقعرة تصحح هذه الحالة من خلال تفريغ الضوء، ما يؤدي إلى زيادة بعد الصور من العدسة وتكون الصور على الشبكية.

**طول النظر** وبين الشكل 23 أن **طول النظر**، المعروف أيضًا بطول البصر (hyperopia)، هو الحالة التي يكون فيها البعد البؤري للعدسة أكبر مما هو للعين السليمة، وبالتالي لا تكون الصور على الشبكية. وكما تؤدي زيادة صلابة عدسات العين لدى الأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم 45 عامًا إلى نتيجة مماثلة أيضًا، حيث لا تستطيع عضلاتهم تقصير البعد البؤري بدرجة كافية لتركيز صور الأجسام الغريبة على الشبكية. وفي كل من حالتي عيب الإبصار، تستخدم عدسات محدبة لتصحيح العين، إذ تكون صورًا خالية أيّد عن العين من الأجسام، كما هو موضح في الشكل 23، حيث تمثل الصور عندئذ الأجسام بالنسبة إلى عدسة العين فتتكون على الشبكية مما يؤدي إلى تصحيح العيب.



## تحدي في الفيزياء

عندما يدخل الضوء إلى العين، يواجه الحد الفاصل بين الهواء والقرنية. إذا دخل شعاع ضوء الحد الفاصل بين الهواء وقرنية الشخص بزاوية قدرها  $30.0^\circ$  بالنسبة إلى العمود المقام، وكان معامل انكسار القرنية 1.4. تقدّرنا:

- استخدم قانون سيلن لحساب زاوية الانكسار.
- كم ستكون زاوية الانكسار لنفس زاوية السقوط إذا كان الشخص يسبح تحت الماء مفتوح العينين؟
- هل يكون الانكسار أكبر في الهواء أم في الماء؟ هل هذا يعني أن الأجسام تحت الماء يبدو أقرب مما إذا كانت في الهواء أم أبعد؟
- إذا كنت تريد أن تكون زاوية انكسار شعاع الضوء في الماء مماثلة لها في الهواء، فكم ينبغي أن تكون زاوية السقوط الجديدة؟

## التلسكوب الكاسر

يستخدم التلسكوب الفلكي الكاسر العدسات لأظهار الأجرام بعيدة أكبر مما تراه العين. وبينن الشكل 24 نظام تلسكوب كيلر، إذ يأتي الضوء المنبعث من النجوم والأجرام الفلكية الأخرى من مكان بعيد جداً لذا يمكن اعتبار الأشعة القادمة متوازية. تدخل هذه الأشعة العدسة الشبيهة بالمحدبة، وتتجمع كصورة حقيقة عند بؤرة العدسة الشبيهة. وتكون الصورة معكوسة مقارنة بالجسم. وبالتالي تُصبح الصورة هي الجسم بالنسبة إلى العدسة العينية المحدبة.

لاحظ أن العدسة العينية تكون في موقع بحيث تقع بؤرة العدسة الشبيهة بين العدسة العينية وبؤرتها. ما يعني أن الصورة المرئية تكون خالية ومتعدلة وأكبر من الصورة الأولى. فيما أن الصورة الأولى معكوسه. ستبقى الصورة النهائية معكوسه. الجدير بالذكر أن الصورة المعكوسة تكون مقبولة لمشاهدة الأجسام الفلكية.

غالباً ما تكون العدسة العينية المحدبة في التلسكوب عدسة لالونية. لأن العدسة الاللونية عبارة عن مجموعة من العدسات التي تؤدي وظيفة العدسة الواحدة. فتقلل الألوان المحيطة. وتتخلص من الزبغ اللوني الذي يتشكل مع الصور.

**التأكد من فهم النص** وَضَع طريقة عمل التلسكوب الكاسر.




الشكل 24 ينبع الضوء القادم من الأجسام البعيدة بواسطة العدسة الشبيهة والعدسة العينية في التلسكوب الكاسر.

**فِيَمَا** لماذا تُعد الصورة المعكوسة مقبولة لمشاهدة الأجسام الفلكية؟

## الكاميرات

يوضح الشكل 25 النظام البصري المستخدم في الكاميرا العاكسة ذات العدسة الواحدة. عندما يدخل الضوء الكاميرا من خلال فتحة العدسة، فإنه يمر عبر عدسة لالونية. يكسر نظام العدسة الضوء تماماً كما تفعل العدسة المحدبة المفردة. مكوّناً صورة معكوسة على المرآة العاكسة. تعكس الصورة إلى أعلى نحو المنشور الذي يعكس الضوء ويعيد توجيهه نحو عين المصور. عندما يلتقط الشخص الذي يحمل الكاميرا صورة، فإنه يضغط على زر تحرير الغالق الذي يرفع المرآة لفترة قصيرة. كما هو موضح في الشكل 25. بدلاً من انحراف الضوء إلى أعلى نحو المنشور، ينتقل في مسار مستقيم لتكون صورة على المستشعر. يلتقط مستشعر الصورة، الذي يكون في الغالب جهازاً مزدوج الشحنة (CCD). صورة ثنائية الأبعاد تتتطابق مع الصورة المتكوّنة عليه. تتجمع معلومات الصورة على هيئة شحنة كهربائية تناسب مع الجهاز المزدوج الشحنة على هيئة شحنة بعد ذلك الشحنة شدة الضوء. يعالج الجهاز المزدوج الشحنة بعد ذلك الشحنة وينقل المعلومات إلى جهاز التخزين.



الشكل 25 يمكن ضبط عدسة الكاميرا لتركيز الصورة على مستشعر الصورة، عند إغلاق الغالق. تحول المرآة مسار الصورة نحو عين المشاهد.

**استدلّ** لماذا تحتاج إلى فتح الغالق لمدة أكبر عند التقاط صورة في ضوء خافت؟

## الميكروسكوب (المجهر)

كما هو الحال في التلسكوب، يحتوي المجهر على عدسات محدبتين إحداهما شبيهة والآخرى عبئية، وُتستخدم المجاهر لتكوين صور للأجسام الصغيرة، ويمكن أن تكون الصور أكبر مثات المرات من الأجسام التي توضع في المجهر.


إنّ عدسات المجهر ذات الأبعاد البؤرية صغيرة نسبياً يمثّل المجلد المركب.

ولمشاهدة جسم بالمجهر المركب، يوضع بين بعد البؤري ومثلي بعد البؤري من العدسة الشبيهة، فتتكون صورة حقيقة معكوسه وأكبر من الجسم، وكما في التلسكوب، تصبح هذه الصورة بمثابة الجسم بالنسبة إلى العدسة العبئية، بحيث تقع هذه الصورة بين العدسة العبئية وبؤرتها، فت تكون صورة خيالية معتدلة وأكبر من الصورة الناتجة من العدسة الشبيهة، وبالتالي، يرى المشاهد صورة معكوسة وأكبر من الجسم الأصلي.

## المنظار

هل سبق لك استخدام المنظار لمشاهدة حدث رياضي أو لمشاهدة الطيور؟ يكون المنظار صورة مُكِبَّرة ثلاثة الأبعاد للأجسام البعيدة مثل التلسكوب، وبين **الشكل 27** تصميماً لمنظار، حيث يُشهي كل جانب من جانبيه تلسكوباً صغيراً. يدخل الضوء من العدسة الشبيهة المحدبة فت تكون صورة معكوسة، ثم ينتقل الضوء بعد ذلك عبر منشورين يستخدمان الانعكاس الكلي الداخلي لقلب الصورة مرة أخرى بحيث يرى المشاهد صورة معتدلة للجسم. يعمل المنشوران أيضًا على إطالة مسار الضوء وتوجيهه نحو العدسة العبئية للمنظار، تماماً مثلما تتحرك المسافة الفاصلة بين عينيك، إحساس العمق والأبعاد الثلاثية، يوفر المنشوران مسافة فاصلة أكبر بين العدستين الشبيهتين، الأمر الذي يؤدي إلى تحسين الرؤية الثلاثية للأبعاد للجسم البعيد من المنظار.


الشكل 26 تكوّن العدسة الشبيهة والعدسة العبئية في هذا المجهر المركب صورة معكوسة وأكبر مقارنة بالجسم.



الشكل 27 يُعمل المنظار بطريقة مماثلة للتلسكوب الكاسر.

## القسم 3 مراجعة

33. **الدُّرْكَةُ الرَّبِيعِيَّةُ** أي نوع من العدسات، المحدبة أم المقعرة، يجب أن يستخدمها الشخص الذي يعاني من قصر النظر؟ وأي نوع منها يستخدمه الشخص الذي يعاني من طول النظر؟ انظر **الشكل 28**. اشرح.



الشكل 28


34. الانكسار أشرح سبب أنّ القرنية هي عنصر تجميع الأشعة الأساسية في العين.

35. الكاميرا إذا وُجِّهَتُ الكاميرا نحو شجرة تقع على بعد 2 m منك، وأردت أن توجهها نحو شجرة أخرى أبعد من ذلك، هل ينبغي أن تقترب العدسة من المستشعر أم تبعدها عنه؟

36. **التكبير الناقِد** عند استخدام أكبر مقدار تكبير في المجهر تكون الصور معتمة أكثر منها في حال التكبير أقل، فما الأسباب المحتملة لجعل الصورة مظلمة؟ ماذا يمكن أن تتعلّم للحصول على صورة أوضح؟

# هل ترى ما أرى؟

عدسات الجاذبية



لمزيد من التعمق

**البحث** يعُد اد奸اء الضوء بفعل الماذبة  
واحداً من تبؤات نظرية التنسية العامة.  
أعد بحثاً عن باقي تبؤات النظرية. كيف  
يمكن اختبار هذه التنبؤات؟

**الدَّرْكَةُ الرَّئِيْسَةُ** تَعْمَلُ العَدَسَاتُ عَلَى انْكَسَارِ الضَّوءِ وَتَكْوِينِ صُورٍ.

### القسم 1 انكسار الضوء

- الدَّرْكَةُ الرَّئِيْسَةُ** يعتمد مقدار الانكسار عند الحد الفاصل بين وسطين على معامل انكسار الوسطين وزاوية السقوط.
- ينكسر شعاع الضوء عندما من وسط ما ذي معامل انكسار ( $n_1$ ) إلى وسط آخر ذي معامل انكسار مختلف ( $n_2$ ). يوصي الانكسار وفق قانون ستل للانكسار.
$$n_1 \sin \theta_1 = n_2 \sin \theta_2$$
  - سرعة الضوء في الوسط أقل من سرعة الضوء في الفراغ. النسبة بين سرعة الضوء في الفراغ ( $c$ ) وسرعة الضوء في وسط ما ( $v$ ) تساوي معامل الانكسار ( $n$ ) لذلك الوسط.
  - عندما ينتقل الضوء من وسط لوسط آخر معامل انكساره أقل وزياوية سقوط أكبر من زاوية الحرجة  $C$ . فإن الضوء ينعكس انعكاساً كلباً داخلياً في الوسط نفسه الذي هو فيه. ولا ينفذ إلى الوسط الآخر.
  - تحدد الظواهر البصرية مثل السراب وأقواس المطر نتيجة تشتت الضوء الأبيض المكتسر. درجة الحرارة في  $n$  وتحدد أقواس المطر نتيجة تشتت الضوء الأبيض المكتسر.

#### المفردات

معامل الانكسار  
index of refraction

زاوية الحرجة critical angle

انعكاس الكلي الداخلي total internal reflection

تشتت الضوء dispersion

### القسم 2 العدسات المحدبة والم-curva

- الدَّرْكَةُ الرَّئِيْسَةُ** يمكن استخدام العدسات في تكبير الصور وتضليلها.
- تكون العدسة المحدبة المفردة صورة حقيقة من خلال تجميع أشعة الضوء عندما يكون الجسم أبعد من بؤرة العدسة. و تكون العدسة المحدبة المفردة صورة خالية عندما يقع الجسم بين العدسة والبؤرة. تكون العدسة المقعرة المفردة صورة خالية مصغرة ومعتملة دائماً من خلال تفريغ أشعة الضوء.
  - تستخدم الرسم التخطيطية للأشعة لتحديد موضع الصورة التي كونتها العدسة وصفات الصورة. توضح معادلة العدسة الرقيقة العلاقة بين البؤر (f) وبعد الصورة ( $x_0$ ) وبعد الجسم ( $x_i$ ).  

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{x_i} + \frac{1}{x_0}$$

يحدد تكبير الصورة ( $m$ ) بالعدسة بواسطة معادلة التكبير.
  - تحدد كل العدسات الرقيقة زيفاً لونياً. يستخدم للحد من الزيف اللوني مجموعة من العدسات ذات معاملات انكسار مختلفة.

#### المفردات

عدسة lens

عدسة محدبة convex lens

عدسة مقعرة concave lens

معادلة العدسة الرقيقة thin lens equation

زيف لوني chromatic aberration

عدسة لalonine

عدسة ملونة achromatic lens

### القسم 3 تطبيقات العدسات

- الدَّرْكَةُ الرَّئِيْسَةُ** باستخدام العدسات يرى الناس أجساماً لم يكونوا ليرواها بغير ذلك.
- اختلاف معامل انكسار الهواء والترندين المسؤول الأساسية عن تكبير الضوء في العين.
  - إن قصر النظر هو عدم القدرة على رؤية الأجسام البعيدة بوضوح. تصحح العدسة المقعرة قصر النظر.
  - إن طول النظر هو عدم القدرة على رؤية الأجسام القريبة بوضوح. تصحح العدسة المحدبة طول النظر.
  - تستخدم الأجهزة البصرية مجموعات من العدسات للحصول على صور واضحة للأجسام الصغيرة أو البعيدة.

#### المفردات


قصر النظر nearsightedness

طول النظر farsightedness

## القسم 1 انكسار الضوء

### إتقان المفاهيم


47. ينتقل شعاع ضوء من الهواء إلى سائل، كما هو موضح في الشكل 30. حيث يسقط شعاع الضوء على السائل بزاوية  $30.0^\circ$ . وينكسر بزاوية تساوي  $22.0^\circ$ . باستخدام قانون سنلن، احسب معامل الانكسار للسائل. قارن معامل الانكسار الذي حسبته بمعاملات الانكسار الموجودة في الجدول 1. ماذا يمكن أن يكون نوع السائل؟



الشكل 30

48. حوض السمك  $n = 1.500$ ، في صنع حوض سمك. فإذا انكس ضوء عن سمة موجودة في الماء وسطط على لوح البلاستيك بزاوية سقوط  $35.0^\circ$ . فما مقدار الزاوية التي سيخرج فيها؟

49. أضواء حوض السباحة يقع مصدر ضوء على عمق  $2.0\text{ m}$  من سطح حوض سباحة، وبعيد  $1.5\text{ m}$  من طرف حوض السباحة. كما هو موضح في الشكل 31، وكان الحوض مملوءاً بالماء إلى قمته. ما مقدار زاوية خروج الضوء من الماء عندما يصل إلى طرف حوض السباحة؟ هل سيبدو الحوض أكثر أو أقل مما هو عليه في الواقع عند النظر إليه من هذه الزاوية؟



الشكل 31 (غير مرسوم بمباني رسم)

50. يساوي معامل انكسار الزجاج المصفول للضوء البنفسجي  $1.51$  وللضوء الأحمر  $1.53$ . ما سرعة الضوء البنفسجي في الزجاج المصفول؟ وما سرعة الضوء الأحمر في الزجاج المصفول؟


51. تبلغ الزاوية الحرجة لأحد أنواع الزجاج في الهواء  $41.0^\circ$ . ما مقدار الزاوية الحرجة، إذا كان الزجاج مغموراً في الماء؟

37. قارن بين زاوية السقوط وزاوية الانكسار عندما ينتقل شعاع الضوء من الهواء إلى الزجاج بزاوية لا تساوي صفراء؟

38. قارن بين زاوية السقوط وزاوية الانكسار عندما ينتقل شعاع الضوء من الزجاج إلى الهواء بزاوية لا تساوي صفراء؟

39. في ما يتعلق بالانكسار، ما المقصود بالزاوية الحرجة؟

40. ترتيب بكل الشكل 29 شعاعاً ضوئياً ينتقل من الهواء إلى عدة أوساط. ربّ الأوساط طبقاً لمعامل الانكسار من الأكبر إلى الأصغر.



الشكل 29

41. على الرغم من انكسار الضوء القادم من الشمس أثناء مروره عبر الغلاف الجوي إلى الأرض، فإن الضوء لا يتحلل إلى طيفه. وضح لماذا لا يحدث ذلك؟

42. أشرح لماذا يظهر القمر باللون الأحمر أثناء الخسوف؟

### إتقان حل المسائل

43. ارجع إلى الجدول 1. واستخدم معامل انكسار الألماس لحساب سرعة الضوء خلال ألماس.

44. ينتقل الضوء من الزجاج الصواني إلى الإيثانول. تساوي زاوية الانكسار في الإيثانول  $25.0^\circ$ . ما زاوية السقوط في الزجاج؟

45. ارجع إلى الجدول 1. وأوجد الزاوية الحرجة للألماس في الهواء.

46. يسقط شعاع ضوئي على زجاج مسطح لأحد جوانب حوض سمك مملوء بالماء، بزاوية قدرها  $40.0^\circ$  بالنسبة إلى العمود المعام. علماً أن معامل انكسار الزجاج،  $n = 1.50$ .

a. ما زاوية انكسار الشعاع الضوئي في الزجاج؟

b. ما زاوية انكسار الشعاع الضوئي في الماء؟

59. اذكر سبب استخدام الالات البصرية الدقيقة للعدسات الالوانية.

60. حدد موقع الصورة المتكوّنة باستخدام عدسة محدبة، وصف صفاتها عندما يوضع الجسم على مسافة أكبر من  $2F$ .

61. لعرض مشهد مقصور باستخدام جهاز عرض سينمائي على شاشة، يوضع الفيلم بين  $F$  و  $2F$  لعدسة مجمعة، ويُتّج هذا الترتيب صورة مقلوّبة. لماذا يظهر المشهد المقصور معتملاً عند عرض الفيلم؟

### إنقان حل المسائل

62. البُعد البؤري لعدسة محدبة  $17\text{ cm}$ . وُضفت شعاع على بعد  $34\text{ cm}$  أمام العدسة. ارسم مخطط أشعة لتحديد موقع الصورة.

63. وضع كوب على طاولة على بعد  $72.5\text{ cm}$  من عدسة مجمعة بعدها البؤري  $25.5\text{ cm}$ . كم ستُبعد صورة الكوب المتكوّنة من العدسة؟

64. تستخدّم جهازاً مزوّداً بعدها محدبة لتكوين صورة حجمها يساوي  $0.75$  من حجم أحد الرسوم. إذا وضعت الجهاز على بعد  $24\text{ cm}$  من العدسة للحصول على هذه النتيجة. فما البُعد البؤري للعدسة؟

65. وُضعت قطعة من الحلوى طولها  $2.4\text{ cm}$  على بعد  $14.0\text{ cm}$  من عدسة محدبة يساوي بعدها البؤري  $2.4\text{ cm}$ . وطول قطعة الحلوى يساوي  $6.0\text{ cm}$ .

a. ارسم مخطط أشعة لتحديد بعد الصورة وطولها واتجاهها.  
b. حل المسألة رياضياً.

66. وُضفت زجاجة طلاء أظافر طولها  $8.0\text{ cm}$  على بعد  $15.0\text{ cm}$  من العدسة مجّمعة على بعد  $5.0\text{ cm}$ . نَكَّوت صورة حقيقية على بعد  $10.0\text{ cm}$  من العدسة.

a. ما البُعد البؤري للعدسة?  
b. إذا استبدلّت العدسة، ووضع مكانها عدسة أخرى بعدها البؤري مثلي البُعد البؤري للعدسة المستبدلة. فما موقع الصورة وطولها واتجاهها؟

67. لعدسة مفرقة بعد بؤري  $15.0\text{ cm}$ . وُضفت قطعةألعاب على بعد  $5.0\text{ cm}$  من العدسة ف تكونت صورة طولها  $2.0\text{ cm}$ .

a. ما طول قطعة الألعاب وما بعدها?  
b. استبدلّت العدسة المفرقة. ووضع مكانها عدسة مجّمعة لها البُعد البؤري نفسه. ما موقع الصورة وطولها واتجاهها؟ وهل هذه الصورة حقيقية أم خيالية؟

68. مسألة معكوسة اكتب مسألة فيزيائية باستخدام أجسام في الحياة اليومية بحيث تكون المعادلة التالية جزءاً من حل المسألة:  $\frac{1}{x_i} + \frac{1}{x_o} = \frac{1}{0.06\text{ m}} + \frac{1}{0.04\text{ m}}$ .


52. معامل انكسار الماس لضوء أحمر طوله الموجي  $656\text{ nm}$ . يساوي  $2.410$  في حين يساوي  $2.450$  لضوء أزرق طوله الموجي  $434\text{ nm}$ . افترض دخول ضوء أبيض إلى الماس بزاوية مقدارها  $30.0^\circ$ . أوجد زاوية انكسار الضوءين الأحمر والأزرق.

53. زاوية سقوط شعاع ضوئي في الماء تساوي  $55.0^\circ$ . ما زاوية انكساره في الهواء؟

54. يدخل الشعاع الموضح في الشكل 32 في مششور زجاجي متlapping الأضلاع ومعامل انكسار مادته  $1.5$ .

a. باستخدام قانون ستل لانكسار. أوجد الزاوية  $\theta_2$  مقربة إلى أقرب درجة.


b. باستخدام مبادئ الهندسة. حدد قيمة  $\theta_1$ .  
c. أوجد  $\theta_2$ .



الشكل 32

55. سرعة الضوء في البلاستيك الشفاف  $1.90 \times 10^8\text{ m/s}$ . يسقط شعاع ضوئي على البلاستيك بزاوية تساوي  $22.0^\circ$ . ما مقدار زاوية انكسار الشعاع؟

56. يدخل شعاع ضوئي في قطعة من الزجاج المصنوع كما هو موضح في الشكل 33. استخدم مخطط أشعة مناسبًا لتبين مسار الشعاع حتى يخرج الزجاج.



الشكل 33

## القسم 2 العدسات المحدبة والمقعرة

### إنقان المتأهّيم

57. كيف تختلف أشكال العدسات المحدبة والمقرّبة فيما بينها؟

58. ما العامل الذي يحدد موقع بؤرة العدسة. غير تقوس سطح العدسة؟

## القسم 3 تطبيقات العدسات

## إتقان المفاهيم

**69. الفكرة الرئيسية** صيغ طريقة تركيز العين للضوء.

**70.** ما الحالة التي يصبح فيها البعد البؤري لعدسة العين قصيراً جداً لدرجة لا تتمكن معها من تجميع الضوء على الشبكية؟

**71.** ما نوع الصورة المتكوّنة عن استخدام العدسة الشبيهة في التلسكوب الكاسر؟ كيف عرفت ذلك؟

**72.** تزيد المناشير الرجالية في المنظار من المسافة بين العدسات الشبيهتين. لماذا يُعَد ذلك مُفيدةً؟

**73.** ما الغرض من المرأة العاكسة في الكاميرا؟

**80.** أي من الوسطين A أو B، في الشكل 34 له معامل انكسار أكبر؟ وضح ذلك.



الشكل 34

**81.** كيف تتحسّن سرعة الضوء عند ازدياد معامل الانكسار؟

**82.** السراب الأسطوري وفقط للأسطورة، أبخر إريك الأحمر من أيسلندا واكتشف جزيرة جرينلاند بعد رؤيتها للجزيرة في هيئة السراب. اشرح كيف يمكن أن يحدث السراب.

**83.** الزجاج الأمامي المتشقّق عندما تنظر من خلال زجاج متشقّق، فـأنت تشاهد خطأً قضي اللون على طول امتداد الشق، حيث يكون الزجاج متفصلاً عنده. كما أن هناك هواء موجود في الشق. بدل هذا الخط القضي إلى أن الضوء ينعكس عن الشق. ارسم مخطط أشعة لنفسك سبب حدوث ذلك. وما هي الظاهرة التي يمثلها؟

**84.** أقواس المطر لماذا لا يمكنك رؤية قوس المطر في السماء جنوباً إذا كنت في نصف الكرة الأرضية الشمالي؟ وإلى أي اتجاه عليك النظر لرؤية أقواس المطر إذا كنت في نصف الكرة الجنوبي؟

## إتقان حل المسائل

**74.** عدسات الكاميرا توصّف عدسات الكاميرا بدلالة بعدها البؤري. العدسة 50.0 mm تكون بعدها البؤري 50.0 mm. a. تُرْكِّز كاميرا مزودة بعدها البؤري 50.0 mm على جسم يبعد 3.0 m ما موقع الصورة؟ b. تُرْكِّز عدسة بعدها البؤري 1000.0 mm على جسم يبعد 125 m ما موقع الصورة؟

**75.** النظارات القراءة كتاب بوضوح، يجب أن يكون على بعد 25 cm فإذا كان هناك فناة مصابة بخلل النظر، وتحتاج إلى أن يكون الكتاب على بعد 45 cm من عينيها لقراءته بوضوح. فما البعد البؤري اللازم لعدستي نظارة الفتاة؟

**76.** الكاميرا تُستخدم عدسة كاميرا بعدها البؤري 35 mm لتصوير جسم بعيد. كم تبعد الصورة الحقيقية للجسم من العدسة؟ فسر ذلك.

**77.** آلة النسخ يساوي البعد البؤري للعدسة المحدبة الخاصة بالآلة نسخ 25.0 cm فإذا وضعت ورقة على بعد 40.0 cm من العدسة لنسخها:

- a. كم يجب أن يكون البعد بين ورق النسخ والعدسة؟
- b. ما مقدار تكبير نسخة النسخ؟

**78.** الميكروскоп (المجهر) وُضعت شريحة من خلايا بصل على بعدين 12 mm من عدسة شبيهة لمجهر. فإذا كان البعد البؤري للعدسة الشبيهة 10.0 mm

a. ما بعده الصورة المتكوّنة عن العدسة؟


b. ما مقدار تكبير هذه الصورة؟

c. ت تكون الصورة الحقيقية على بعدين 10.0 mm تحت العدسة العينية. فإذا كان البعد البؤري للعدسة العينية يساوي 20.0 mm. فما موقع الصورة النهائية؟

d. ما مقدار التكبير النهائي لهذا النظام المركب؟


لقانون سبل الانكسار.  $n_1 \sin \theta_1 = n_2 \sin \theta_2$ . واذكر  
الافتراضات اللازمه.

**99.** من غير الممكن الرؤية من خلال الجوانب المجاورة لقولاب مربعة من زجاج معامل انكساره ساوي 1.5. حيث يؤثر الجانب المجاور للجانب الذي يتنظر من خلاله المرافق كأنه مرآة. يوضح **الشكل 35** الحالة المحددة لجانب جاوار لا يؤثر كأنه مرآة. استخدم مرفقك بالهندسة والروايا الحرجية لتثبت أن هيئة هذا الشعاع غير قابلة للتحقيق عندما يكون  $n = 1.5$  = الزجاج



الشكل 35

**100. العمق الظاهري** تعكس أشعة الشمس من قاع حوض سلك وتنتشر في جميع الاتجاهات. **الشكل 36** يوضح شعاعين من هذه الأشعة المنكسسة من نقطة في قاع الحوض ينتقلان إلى السطح. فتكسر أشعة الضوء في الهواء كما هو موضح. يُعد امتداد الخط الأحمر المتقطع إلى الخلف، من شعاع الضوء المنكسر. خط النظر الذي ينقطط مع الشعاع الرأسي عند الموقع الذي سير في المرافق صورة قاع الحوض. أوجد زاوية انكسار الشعاع في الهواء. عند أي عمق سيبدو قاع الحوض إذا نظرت في الماء؟ أوجد ناتج قسمة العمق الظاهري على العمق الحقيقي وقارن الناتج بمعامل الانكسار.



الشكل 36

**85.** يكسر المنشر الضوء الأزرق بزاوية أكبر من الضوء الأحمر. فتسر ذلك.

**86.** هل يزيد أم يقل قياس الزاوية الحرجية كلما ازداد معامل انكسار الوسط الذي ينتقل خلاله الشعاع؟

**87.** لماذا يُعد الزيء اللوني عيناً بالنسبة إلى العدسات. ولا بعد كذلك بالنسبة إلى المرايا؟

**88.** أي زوج من الأوساط التالية له زاوية خرج أقل؟  
الهواء والماء أم الهواء والزجاج المصفول؟

**89.** افترض أن **الشكل 13** أعيد رسمه باستخدام عدسة لها البعد البؤري نفسه ولكن لها قطر أكبر. فتسر سبب عدم تغير موقع الصورة. هل ستتأثر الصورة بأي طريقة؟

**90.** يستخدم أحد السياحين عدسة مكرونة أثناء الغوص تحت الماء حتى تساعد على مشاهدة جسم صغير في قاع حوض سباحة. واكتشف أن العدسة المكرونة لا تكفي الجسم جيداً كما يجب. اشرح لماذا لا تعمل العدسة المكرونة في الماء كما كانت تعمل في الهواء.

**91.** عند التعرض لضوء الشمس الساطع يكون بؤبؤ العينين أصفر مما يكون عليه عند التعرض للضوء الحارق. اشرح لماذا تستطيع عيناك تجميع الضوء بشكل أفضل في الضوء الساطع.

**92.** **المناظير** تكون العدسات الشبيهة في المنشآت صوراً حقيقة وعندلة للأجسام مقارنة بالأجسام الأصلية. أين تقع الصور بالنسبة إلى العدسات العينية؟

### مراجعة عامة

**93.** وضع جسم طوله 3.0 cm على بعد 20 cm أمام عدسة مجتمعة. فنَكِّوْت صورة حقيقة على بعد 10 cm من العدسة. ما مقدار البعد البؤري للعدسة؟

**94.** تبلغ الزاوية الحرجية لضوء ينتقل من قالب من الزجاج المصفول إلى وسط آخر 45.0°. ما معامل انكسار الوسط الذي ينتقل إليه الضوء؟

**95.** أوجد سرعة الضوء في حجر ثلاثي أكسيد الأنتيمون، إذا كان معامل انكساره يساوي 2.35.

**96.** علم الفلك كم عدد الدفانق الإضافية التي سيسفر عنها الضوء عند انتقاله من الش sis إلى الأرض إذا أملأ الفضاء بينهما بالماء بدلاً من الفراغ؟ علماً بأن بعد الشمس من الأرض يساوي 1.5 × 108 km.


**97.** شباك الصراف في البنك يستخدم لوح سميك من البلاستيك سمكه  $n = 1.5$  و 25 mm في شباك الصراف الآلي في البنك. فعندما يسقط شعاع ضوئي على اللوح بزاوية ثناوية 45°. سيخرج الشعاع من اللوح بزاوية تساوي 45° ولكن من موقع آخر. استخدم مخطط لأشعة لإيجاد التعدد بين الشعاع الذي يخرج والشعاع الذي كان سيخرج في حالة عدم وجود البلاستيك.

**98.** استنتج المعادلة  $\frac{\sin \theta_1}{\sin \theta_2} = n$  من الصيغة العامة

- 109.** تختلف عملية التكثيف في العين، وهي التي تتباهى فيها العضلات المحيطة بالعدسة في العين أو تنسحب حتى تُمكِّن العين من رؤية الأجسام القريبة أو البعيدة من كافٍ إلى آخر. ابحث في هذه الظاهرة في حيوانات مختلفة، وأعد تقريراً للنصف توضح من خلاله كيفية التكثيف في عيون هذه الحيوانات لرؤية الأشياء.

### مراجعة تراكمية

- 110.** إذا أستطعت تحفيظ كلنها  $2.0 \text{ kg}$  وفيها طبقات رصاص صغيرة من ارتفاع  $1.5 \text{ m}$  كما هو موضح في الشكل 37. يمكنك افتراض أن نصف حلقة الوضع يستحوذ إلى طاقة حرارية في طبقات الرصاص. وسيتحول النصف الآخر إلى طاقة حرارية في الأرض. كم مرة قد يعين عليك إسقاط الحقيقة لرفع حرارتها بمقدار  $10^\circ\text{C}$



الشكل 37

- 111.** تطلق سيارة بوقها عندما تقترب من أحد الأشخاص عند عبوره ممر المشاة. ما الذي سيسمعه هذا الشخص عندما توقف السيارة لتنسم له بغيره الشارع؟

- 112.** افترض أنك تستطيع أن تقف على سطح الشمس وتزن نفسك. وافترض أيضاً أنك تستطيع فياس الاستضاءة على يدك من طيف الشمس المرئي الناتج في هذا الموقع. ثم تخيل أنك تنتقل إلى موقع أبعد من مركز الشمس مما كنت تقف عليه بمقدار 1000 مرة.

- a.** ما وجه المقارنة بين قوة الجاذبية المؤثرة فيك من الشمس وما كانت عليه على السطح؟  
**b.** ما وجه المقارنة بين الاستضاءة على يدك من الشمس في الموضع الجديد وما كانت عليه عندما كنت تقف على سطحها؟ (لتبسيط افترض أن الشمس مصدر نقطي في كلا الموقعيين)

- c.** قارن تأثير المسافة في كل من قوة الجاذبية والاستضاءة.  
**113.** مرأة التجميل يبلغ طول أنف عميل يجرّب كريماً للوجه  $3.00 \text{ cm}$ . ويقع على بعد  $6.00 \text{ cm}$  أمام مرآة مغيرة بعدها البؤري يساوي  $14.0 \text{ cm}$ . أوجد موقع صورة أنف العميل وطوله باستخدام:

- a.** مخلوط أشعة حيث المقادير متناسبة  
**b.** معادلة المرأة والتكبير

- 101.** ما بعد البؤري لقرنية عينيك عندما تقرأ كتاباً يبعد من القرنية بمقدار  $35.0 \text{ cm}$  علينا بأن المسافة من كل قرنية إلى الشبكية تساوي  $19 \text{ mm}$ .

### التفكير الناقد

- 102.** إدراك العلاقات المكانية ينتقل الضوء الأبيض خلال هواء معامل انكساره ( $n = 1.00$ ) ويدخل في لوح زجاجي بزاوية سقوط  $45^\circ$  باصبع. فإذا كان معامل انكسار الزجاج الصواني الكثيف  $n = 1.7708$  لضوء أزرق طوله الموجي  $\lambda = 435.8 \text{ nm}$  و  $n = 1.7273$  لضوء أحمر طوله الموجي  $\lambda = 643.8 \text{ nm}$ . ما الاختلاف في زوايا الانكسار للضوءين الأحمر والأزرق؟

- 103.** قارن وقابل أوجد الزاوية الحرجة لضوء ينتقل من جليد معامل انكساره ( $n = 1.31$ ) إلى الهواء. في المناطق الشديدة البرودة، هل تكون خلطات الألياف الضوئية المصمومة من الجليد أفضل من تلك المصمومة من الزجاج لانتقال الضوء داخل السلك؟ وضح ذلك.

- 104.** طرح مسألة "يُنْتَجُ اللىزِيرُ ضوءاً طوله الموجي 453 nm ...". أكمل هذه المسألة بحيث يجب حلها باستخدام قانون سنل.

- 105.** إدراك السبب والنتيجة استخدم زميلاً عدسة محدبة في إجراء تجربة لتكون صورة لها  $i = 25 \text{ cm}$  وأنت تشخص عدسة مغيرة بعدها البؤري  $i = 4.0 \text{ cm}$ . وضفت العدسة المغيرة بين العدسة المحدبة  $-15 \text{ cm}$  والصورة الأصلية على بعد  $10 \text{ cm}$  من الصورة. دهشت عندما رأيت صورة حقيقة أكبر من الجسم على الحائط. وقد قبل لك إن الصورة الممكّنة عند استخدام العدسة المحدبة أصبحت الآن بيئة الجسم للعدسة المغيرة، ونتيجة وجودها على الجانب المقابل للعدسة المغيرة، فهي تُخَدَّجَةً حيالياً. استخدم هذه الدلالات لإيجاد موقع الصورة الجديدة وطولها. ولتوّقع ما إذا كانت العدسة المغيرة قد غيرت اتجاه الصورة الأصلية أم لا.

- 106.** عَرَفْ بشكُلِّ عملي اذْكُر اسْمَ الظاهرَةِ الَّتِي تُسبِّبُ طَيْفَ الْأَلوَانِ قُوسَ الْمَطْرَأِ وَأَشْرُقَ كَمِيَّةَ حَدُوثِهَا.


- 107.** ستستخدم عدسة في عرض صورة جسم على شاشة. افترض أنك غطّيَتَ النصف الأيمن من العدسة. ماذا سيحدث للصورة؟

### الكتابة في الفيزياء

- 108.** ابحث في نظام العدسة المستخدم في الآلات البصرية. مثل جهاز عرض الشفافيات أو آلات التصوير الخاصة أو التلسكوب. ثم حضر عرضاً تصوّرياً للنصف توضح من خلاله كيفية تكوين هذه الآلات للصور.

7. ما بعد الصورة في الحالة الموضحة في الشكل التالي؟

- |            |            |
|------------|------------|
| 0.167 m .C | -6.00 m .A |
| 0.833 m .D | -1.20 m .B |



8. ما الزاوية الحرجة للانكسار الكلي الداخلي عندما ينتقل الضوء من الزجاج ( $n = 1.52$ ) إلى الماء ( $n = 1.33$ )؟

- |          |          |
|----------|----------|
| 48.8° .C | 29.0° .A |
| 61.0° .D | 41.2° .B |

9. ماذا يحدث للصورة المنكوبة باستخدام عدسة محدبة عند تقاطع نصف العدسة؟

- A. يختفي نصف الصورة.
- B. تصبح الصورة معتمة.
- C. تصبح الصورة ضبابية.
- D. تصبح الصورة مقلوبة.

### أسئلة ذات إجابات مفتوحة

10. إذا كانت الزاوية الحرجة للانكسار الكلي الداخلي عند الحد الفاصل بين الماء والهواء 24.4°. ما زاوية الانكسار في الهواء إذا سقط ضوء على الحد الفاصل بزاوية 20.0°؟

11. جسم يبعد عن عدسة بمقدار 6.98 cm ذكرى له صورة على بعد 2.95 cm من العدسة وعلى الجانب نفسه من العدسة. ما نوع العدسة؟ وضح إجابتك.

### الاختيار من متعدد

1. يوجّه شعاع مصباح بدوي نحو بركة سباحة في الظلام بزاوية 46° بالنسبة إلى العمود البقائم على سطح الماء. ما زاوية انكسار الشعاع في الماء؟ (معامل انكسار الماء هو 1.33).

- |        |        |
|--------|--------|
| 33° .C | 18° .A |
| 44° .D | 30° .B |

2. تبلغ سرعة الضوء في الماء  $8 \text{ m/s}$ . ما معامل انكسار الماء؟


- |         |           |
|---------|-----------|
| 1.24 .C | 0.0422 .A |
| 2.42 .D | 0.413 .B  |

3. أي من الظواهر التالية لا ترتبط بتكون أقواس المطر؟

- A. الحيوان .C. الانكسار
- B. تحلل الضوء الأبيض .D. الانكسار

4. بلقطت أحمد صورة لعلي، كما هو موضح في الشكل أدناه. مستخدماً كاميرا تحتوي على عدسة محدبة ذات بعد بؤري مقداره 0.0470 m. حدد موقع صورة علي.

- |            |            |
|------------|------------|
| 4.82 cm .C | 1.86 cm .A |
| 20.7 cm .D | 4.70 cm .B |



5. ما مقدار تكبير الجسم الذي يبلغ بعده 4.15 m أمام الكاميرا التي يصل موضع الصورة فيها إلى 5.0 cm؟

- |         |           |
|---------|-----------|
| 0.83 .C | -0.83 .A  |
| 1.22 .D | -0.012 .B |

6. أي من التالية لا تؤثر في تكوين السراب؟

- A. تسخين الهواء بالقرب من الأرض .B. مويجات هيجنز
- C. الانكسار .D. الانكسار